

Avellano	Antracnosis, Colletotrichum gloeosporioides					Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Autorizado solo contra Sphaceloma coryli. Aplicar durante BBCH 19-79.
	Alternaria spp.					
	Cladosporiosis, Cladosporium spp.					
	Colletotrichum spp.					
	Fusariosis, Fusarium spp.					
Avellano	Monilia, Monilinia spp.					
	Oídio del avellano, Phyllactinia guttata	2 l/ha	2	7 días	150 - 2000 l/ha	Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 19-79.
Berenjena	Alternaria spp.					
	Leveillula spp.	1,5 l/ha	3	7 días	400 - 1000 l/ha	Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 14-89.
	Alternaria spp.					
Brécol	Erysiphe spp.					
	Mancha anular de la col, Neopseudocercospora brassicae	1,5 l/ha	2	7 días	200 - 1000 l/ha	Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 12-91.
Brotos tiernos, incluidas las especies de Brassica	Cercosporiosis, Cercospora spp.					
	Cladosporiosis, Cladosporium spp.					
	Colletotrichum spp.					
	Estemfilosis, Stemphylium spp.	1,5 l/ha	1	--	200 - 800 l/ha	Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 19-49.
Calabacín	Oídio de las cucurbitáceas, Podosphaera xanthii					
	Oídio, Golovinomyces cichoracearum					Aplicar durante BBCH 14-89.
	Oidium spp.	1,5 l/ha	3	7 días	400 - 1000 l/ha	Eficaz contra Sphaerotheca fuliginea. Aplicar durante BBCH 14-89.
	Oidium spp.					Eficaz contra Sphaerotheca fuliginea. Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 14-89.
	Chancro gomoso del tallo de las cucurbitáceas, Stagonosporopsis cucurbitacearum					
Calabaza	Oídio de las cucurbitáceas, Podosphaera xanthii					
	Oídio, Golovinomyces cichoracearum	1,5 l/ha	3	7 días	400 - 1000 l/ha	Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 14-89.
Caqui	Mycosphaerella spp.	2 l/ha	2	7 días	150 - 2000 l/ha	Eficaz contra Mycosphaerella nawae. Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 55-85.
	Gnomoniopsis spp.					Eficaz contra Gnomoniopsis castanae. Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 19-79.
	Socarrina, mancha foliar del castaño, Mycosphaerella maculiformis	2 l/ha	2	7 días	150 - 2000 l/ha	Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 19-79.

 GOBIERNO DE ESPAÑA		 MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN		ES-01394		REYVYONA		SECRETARIA GENERAL DE RECURSOS AGRARIOS Y SEGURIDAD ALIMENTARIA		DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD DE LA PRODUCCIÓN AGROALIMENTARIA Y BIENESTAR ANIMAL	
Coliflor	Alternaria spp.										
	Erysiphe spp.										
Coliflor	Mancha anular de la col, Neopseudocercospora brassicae	1,5 l/ha	2	7 días	200 - 1000 l/ha	Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 12-91.					
Espárrago	Botrytis spp.										
	Estemfilosis, mancha foliar de la alfalfa, Stemphylium botryosum										
Espárrago	Estemfilosis, mancha negra, Stemphylium vesicarium										
	Roya del espárrago, Puccinia asparagi	1,5 l/ha	3	14 días	200 - 800 l/ha	Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 51-75.					
Espinaca	Cercosporiosis, Cercospora spp.										
	Cladosporiosis, Cladosporium spp.										
Espinaca	Colletotrichum spp.										
	Estemfilosis, Stemphylium spp.	1,5 l/ha	1	--	200 - 800 l/ha	Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 10-49.					
Guisante para grano	Rabia del guisante, Ascochyta pisi										
	Roya del guisante, Uromyces pisi	0,8 - 1,3 l/ha	2	10 días	100 - 400 l/ha	Guisante verde sin vaina. (Uso menor por Jerarquía de cultivos). Aplicar durante BBCH 50-72.					
Guisante proteaginoso /forrajero	Rabia del guisante, Ascochyta pisi										
	Roya del guisante, Uromyces pisi	0,8 - 1,3 l/ha	2	10 días	100 - 400 l/ha	Guisante verde sin vaina. (Uso menor por Jerarquía de cultivos). Aplicar durante BBCH 50-72.					
Guisante verde	Rabia del guisante, Ascochyta pisi										
	Roya del guisante, Uromyces pisi	0,8 - 1,3 l/ha	2	10 días	100 - 400 l/ha	Guisante verde sin vaina. (Uso menor por Jerarquía de cultivos). Aplicar durante BBCH 50-72.					
Hierbas aromáticas y flores comestibles	Cercosporiosis, Cercospora spp.										
	Cladosporiosis, Cladosporium spp.										
	Colletotrichum spp.										
	Estemfilosis, Stemphylium spp.	1,5 l/ha	1	--	200 - 800 l/ha	Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 10-49.					
Judía forrajera	Rabia del haba, Ascochyta fabae										
	Roya del haba, Uromyces viciae-fabae	0,8 - 1,3 l/ha	2	10 días	100 - 400 l/ha	(Uso menor por Jerarquía de cultivos). Aplicar durante BBCH 50-72.					
Judía para grano	Rabia del haba, Ascochyta fabae										
	Roya del haba, Uromyces viciae-fabae	0,8 - 1,3 l/ha	2	10 días	100 - 400 l/ha	(Uso menor por Jerarquía de cultivos). Aplicar durante BBCH 50-72.					
Judía verde	Rabia del haba, Ascochyta fabae										
	Roya del haba, Uromyces viciae-fabae	0,8 - 1,3 l/ha	2	10 días	100 - 400 l/ha	Judía verde sin vaina. (Uso menor por Jerarquía de cultivos). Aplicar durante BBCH 50-72.					
Leguminosas de grano	Ascoquitosis, Ascochyta sp.	0,8 - 1,3 l/ha	2	10 días	100 - 400 l/ha	Indicado para leguminosas secas: lentejas, garbanzos y altramuces Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 50-72.					

Lima	Mycosphaerella spp.	2 l/ha	2	10 días	1500 - 3000 l/ha	(Uso menor por Jerarquía de cultivos) Eficaz contra Mycosphaerella citri. Aplicar durante BBCH 31-85.
Mandarino (incluido clementino e híbridos)	Alternaria spp.	2 l/ha	2	10 días	1500 - 3000 l/ha	Aplicar durante BBCH 31-85.
Melón	Oídio de las cucurbitáceas, Podosphaera xanthii Oídio, Golovinomyces cichoracearum	1,5 l/ha	3	7 días	400 - 1000 l/ha	Aplicar durante BBCH 14-89.
	Oidium spp.					Eficaz contra Sphaerotheca fuliginea. Aplicar durante BBCH 14-89.
Naranja	Alternaria spp.	2 l/ha	2	10 días	1500 - 3000 l/ha	Aplicar durante BBCH 31-85.
	Mycosphaerella spp.					
Nogal	Alternaria spp. Antracnosis del nogal, Ophiognomonia leptostyla Colletotrichum spp.	2 l/ha	2	7 días	150 - 2000 l/ha	Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*).
	Fusariosis, Fusarium spp.					Aplicar durante BBCH 19-79.
Olivo	Repilo del olivo, Venturia oleaginea	2 l/ha	2	10 días	1000 - 1500 l/ha	Indicado para olivo de almazara y de verdeo. Aplicar durante BBCH 15-85.
Patata	Alternaria spp.	1,25 l/ha	3	7 días	100 - 1000 l/ha	Aplicar durante BBCH 20-97.
Pepinillo	Oidium spp.	1,5 l/ha	3	7 días	400 - 1000 l/ha	Eficaz contra Sphaerotheca fuliginea. Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*).
	Oídio de las cucurbitáceas, Podosphaera xanthii Oídio, Golovinomyces cichoracearum					Aplicar durante BBCH 14-89.
Pepino	Oidium spp.	1,5 l/ha	3	7 días	400 - 1000 l/ha	Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*).
	Oídio de las cucurbitáceas, Podosphaera xanthii Oídio, Golovinomyces cichoracearum					Aplicar durante BBCH 14-89.
Pistachero	Botryosphaeria spp.	2 l/ha	2	7 días	150 - 2000 l/ha	Eficaz contra Sphaerotheca fuliginea. Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*).
Repollo	Alternaria spp.	1,5 l/ha	2	10 días	200 - 1000 l/ha	Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*).
	Erysiphe spp. Mancha anular de la col, Neopseudocercospora brassicae					Aplicar durante BBCH 12-49.
Rúcula	Alternaria spp.	1,5 l/ha	1	--	200 - 800 l/ha	Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*).
Sandía	Oídio de las cucurbitáceas, Podosphaera xanthii Oídio, Golovinomyces cichoracearum	1,5 l/ha	3	7 días	400 - 1000 l/ha	Aplicar durante BBCH 14-89.
	Oidium spp.					Eficaz contra Sphaerotheca fuliginea. Aplicar durante BBCH 14-89.
	Alternaria spp.					

		GOBIERNO DE ESPAÑA		MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN		ES-01394		REYONA		SECRETARIA GENERAL DE RECURSOS AGRARIOS Y SEGURIDAD ALIMENTARIA		DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD DE LA PRODUCCIÓN AGROALIMENTARIA Y BIENESTAR ANIMAL	
Tallos jóvenes	Erysiphe spp.										Indicado para apio, hinojo, cardo y ruibarbo. Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 21-49.		
	Ramularia spp.												
	Septoriosis, Septoria spp.	1,5 l/ha	2	14 días	500 - 800 l/ha								
Tomate	Alternaria spp.										Aplicar durante BBCH 14-89.		
	Leveillula spp.	1,5 l/ha	3	7 días	400 - 1000 l/ha								
Toronja, pomelo	Mycosphaerella spp.	2 l/ha	2	10 días	1500 - 3000 l/ha						(Uso menor por Jerarquía de cultivos) Eficaz contra Mycosphaerella citri. Aplicar durante BBCH 31-85.		
Vid	Oídio de la vid, Erysiphe necator										Dosis expresada por área de pared foliar (LWA): 1,0 l/10 000 m² de área de pared foliar;.		
	Black rot, podredumbre negra de la vid, Phyllosticta ampelícida	1,3 l/ha	3	10-14 días	100 - 1200 l/ha						Aplicar durante BBCH 14-83. Dosis expresada por área de pared foliar (LWA): 1,0 l/10 000 m² de área de pared foliar;.		
Ámbito de Aplicación: Agrario - Tipo de Usuario: Profesional - Sistema de Cultivo: Aire libre - Método de Aplicación: Manual con mochila													
Alcachofa	Alternaria spp.										Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 15-59.		
	Leveillula spp.												
	Oídio, Golovinomyces cichoracearum	1,5 l/ha	3	7 días	200 - 1000 l/ha								
Almendro	Antracnosis del fresón, Colletotrichum acutatum										Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 19-79.		
	Cribado, perdigonado, Wilsonomyces carpophilus												
	Mancha ocre del almendro, Polystigma ochraceum												
	Monilia, Monilinia spp.	2 l/ha	2	7 días	150 - 2000 l/ha								
	Antracnosis, Colletotrichum gloeosporioides										Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Autorizado solo contra Sphaceloma coryli. Aplicar durante BBCH 19-79.		
	Alternaria spp.												
	Cladosporiosis, Cladosporium spp.												
	Colletotrichum spp.												
	Fusariosis, Fusarium spp.												
	Monilia, Monilinia spp.												
Avellano	Oídio del avellano, Phyllactinia guttata	2 l/ha	2	7 días	150 - 2000 l/ha						Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 19-79.		
Berenjena	Alternaria spp.										Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 14-89.		
	Leveillula spp.	1,5 l/ha	3	7 días	400 - 1000 l/ha								
Brécol	Alternaria spp.										Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 12-91.		
	Erysiphe spp.												
	Mancha anular de la col, Neopseudocercospora brassicae	1,5 l/ha	2	7 días	200 - 1000 l/ha								
	Cercosporiosis, Cercospora spp.												

Brotes tiernos, incluidas las especies de Brassica	Cladosporiosis, Cladosporium spp. Colletotrichum spp.					
	Estemfilosis, Stemphylium spp.	1,5 l/ha	1	--	200 - 800 l/ha	Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 19-49.
Calabacín	Oídio de las cucurbitáceas, Podosphaera xanthii Oídio, Golovinomyces cichoracearum					Aplicar durante BBCH 14-89.
	Oidium spp.	1,5 l/ha	3	7 días	400 - 1000 l/ha	Eficaz contra Sphaerotheca fuliginea. Aplicar durante BBCH 14-89.
Calabaza	Oidium spp.					Eficaz contra Sphaerotheca fuliginea. Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 14-89.
	Chancro gomoso del tallo de las cucurbitáceas, Stagonosporopsis cucurbitacearum Oídio de las cucurbitáceas, Podosphaera xanthii					
	Oídio, Golovinomyces cichoracearum	1,5 l/ha	3	7 días	400 - 1000 l/ha	Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 14-89.
Caqui	Mycosphaerella spp.	2 l/ha	2	7 días	150 - 2000 l/ha	Eficaz contra Mycosphaerella nawae. Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 55-85.
Castaño	Gnomoniopsis spp.					Eficaz contra Gnomoniopsis castanae. Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 19-79.
	Socarrina, mancha foliar del castaño, Mycosphaerella maculiformis	2 l/ha	2	7 días	150 - 2000 l/ha	Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 19-79.
Coliflor	Alternaria spp.					
	Erysiphe spp. Mancha anular de la col, Neopseudocercospora brassicae	1,5 l/ha	2	7 días	200 - 1000 l/ha	Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 12-91.
Espárrago	Botrytis spp.					
	Estemfilosis, mancha foliar de la alfalfa, Stemphylium botryosum Estemfilosis, mancha negra, Stemphylium vesicarium Roya del espárrago, Puccinia asparagi	1,5 l/ha	3	14 días	200 - 800 l/ha	Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 51-75.
Espinaca	Cercosporiosis, Cercospora spp. Cladosporiosis, Cladosporium spp. Colletotrichum spp.					
	Estemfilosis, Stemphylium spp.	1,5 l/ha	1	--	200 - 800 l/ha	Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 10-49.
Guisante para grano	Rabia del guisante, Ascochyta pisi					
	Roya del guisante, Uromyces pisi	0,8 - 1,3 l/ha	2	10 días	100 - 400 l/ha	Guisante verde sin vaina. (Uso menor por Jerarquía de cultivos). Aplicar durante BBCH 50-72.

 GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN		ES-01394 REVYONA				SECRETARIA GENERAL DE RECURSOS AGRARIOS Y SEGURIDAD ALIMENTARIA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD DE LA PRODUCCIÓN AGROALIMENTARIA Y BIENESTAR ANIMAL
Guisante proteaginoso /forrajero	Rabia del guisante, Ascochyta pisi Roya del guisante, Uromyces pisi	0,8 - 1,3 l/ha	2	10 días	100 - 400 l/ha	Guisante verde sin vaina. (Uso menor por Jerarquía de cultivos). Aplicar durante BBCH 50-72.
Guisante verde	Rabia del guisante, Ascochyta pisi Roya del guisante, Uromyces pisi	0,8 - 1,3 l/ha	2	10 días	100 - 400 l/ha	Guisante verde sin vaina. (Uso menor por Jerarquía de cultivos). Aplicar durante BBCH 50-72.
Hierbas aromáticas y flores comestibles	Cercosporiosis, Cercospora spp. Cladosporiosis, Cladosporium spp. Colletotrichum spp.					
	Estemfilosis, Stemphylium spp.	1,5 l/ha	1	--	200 - 800 l/ha	Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 10-49.
Judía forrajera	Rabia del haba, Ascochyta fabae Roya del haba, Uromyces viciae-fabae	0,8 - 1,3 l/ha	2	10 días	100 - 400 l/ha	(Uso menor por Jerarquía de cultivos). Aplicar durante BBCH 50-72.
Judía para grano	Rabia del haba, Ascochyta fabae Roya del haba, Uromyces viciae-fabae	0,8 - 1,3 l/ha	2	10 días	100 - 400 l/ha	(Uso menor por Jerarquía de cultivos). Aplicar durante BBCH 50-72.
Judía verde	Rabia del haba, Ascochyta fabae Roya del haba, Uromyces viciae-fabae	0,8 - 1,3 l/ha	2	10 días	100 - 400 l/ha	Judía verde sin vaina. (Uso menor por Jerarquía de cultivos). Aplicar durante BBCH 50-72.
Leguminosas de grano	Ascoquitosis, Ascochyta sp.	0,8 - 1,3 l/ha	2	10 días	100 - 400 l/ha	Indicado para leguminosas secas: lentejas, garbanzos y altramuces Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 50-72.
Lima	Mycosphaerella spp.	2 l/ha	2	10 días	1500 - 3000 l/ha	(Uso menor por Jerarquía de cultivos) Eficaz contra Mycosphaerella citri. Aplicar durante BBCH 31-85.
Mandarino (incluido clementino e híbridos)	Alternaria spp.	2 l/ha	2	10 días	1500 - 3000 l/ha	Aplicar durante BBCH 31-85.
Melón	Oídio de las cucurbitáceas, Podosphaera xanthii Oídio, Golovinomyces cichoracearum					Aplicar durante BBCH 14-89.
	Oidium spp.	1,5 l/ha	3	7 días	400 - 1000 l/ha	Eficaz contra Sphaerotheca fuliginea. Aplicar durante BBCH 14-89.
Naranja	Alternaria spp.					
	Mycosphaerella spp.	2 l/ha	2	10 días	1500 - 3000 l/ha	Aplicar durante BBCH 31-85.
Nogal	Alternaria spp. Antracnosis del nogal, Ophiognomonina leptostyla Colletotrichum spp.					
	Fusariosis, Fusarium spp.	2 l/ha	2	7 días	150 - 2000 l/ha	Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 19-79.
Olivo	Repilo del olivo, Venturia oleaginea	2 l/ha	2	10 días	1000 - 1500 l/ha	Indicado para olivo de almazara y de verdeo. Aplicar durante BBCH 15-85.
Patata	Alternaria spp.	1,25 l/ha	3	7 días	100 - 1000 l/ha	Aplicar durante BBCH 20-97.
	Oidium spp.					Eficaz contra Sphaerotheca fuliginea. Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 14-89.



Pepinillo	Oídio de las cucurbitáceas, Podosphaera xanthii					
	Oídio, Golovinomyces cichoracearum	1,5 l/ha	3	7 días	400 - 1000 l/ha	Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 14-89.
Pepino	Oidium spp.					Eficaz contra Sphaerotheca fuliginea. Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 14-89.
	Oídio de las cucurbitáceas, Podosphaera xanthii					
Pepino	Oídio, Golovinomyces cichoracearum	1,5 l/ha	3	7 días	400 - 1000 l/ha	Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 14-89.
Pistachero	Botryosphaeria spp.	2 l/ha	2	7 días	150 - 2000 l/ha	Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Tratamiento indicado contra Botryosphaeria dothidea. Aplicar durante BBCH 19-79.
Repollo	Alternaria spp.					
	Erysiphe spp.					
	Mancha anular de la col, Neopseudocercospora brassicae	1,5 l/ha	2	10 días	200 - 1000 l/ha	Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 12-49.
Rúcula	Alternaria spp.	1,5 l/ha	1	--	200 - 800 l/ha	Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 10-49.
Sandía	Oídio de las cucurbitáceas, Podosphaera xanthii					
	Oídio, Golovinomyces cichoracearum					Aplicar durante BBCH 14-89.
Sandía	Oidium spp.	1,5 l/ha	3	7 días	400 - 1000 l/ha	Eficaz contra Sphaerotheca fuliginea. Aplicar durante BBCH 14-89.
Tallo jóvenes	Alternaria spp.					
	Erysiphe spp.					
	Ramularia spp.					
Tallo jóvenes	Septorios, Septoria spp.	1,5 l/ha	2	14 días	500 - 800 l/ha	Indicado para apio, hinojo, cardo y ruibarbo. Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 21-49.
Tomate	Alternaria spp.					
	Leveillula spp.	1,5 l/ha	3	7 días	400 - 1000 l/ha	Aplicar durante BBCH 14-89.
Toronja, pomelo	Mycosphaerella spp.	2 l/ha	2	10 días	1500 - 3000 l/ha	(Uso menor por Jerarquía de cultivos) Eficaz contra Mycosphaerella citri. Aplicar durante BBCH 31-85.
Vid	Oídio de la vid, Erysiphe necator					Dosis expresada por área de pared foliar (LWA): 1,0 l/10 000 m² de área de pared foliar;. Aplicar durante BBCH 14-83.
	Black rot, podredumbre negra de la vid, Phyllosticta ampelícola	1,3 l/ha	3	10-14 días	100 - 1200 l/ha	Dosis LWA: 1,0 l/10 000 m² de área de pared foliar;. Aplicar durante BBCH 14-83.
Ámbito de Aplicación: Agrario - Tipo de Usuario: Profesional - Sistema de Cultivo: Aire libre - Método de Aplicación: Pulverización normal con tractor						
Albaricoquero	Monilia, Monilinia spp.					Dosis expresada por área de pared foliar (LWA): 1,0 l/10 000 m² de área de pared foliar; La dosis máx. individual = 1,8 l/ha de suelo, incluso si el área de pared foliar > 18 000 m². Aplicar durante BBCH 55-89.
	Oídios, Erysiphaceae	1,8 l/ha	2	7 días	200 - 2000 l/ha	Eficaz frente a Sphaerotheca spp. Dosis expresada por área de pared foliar (LWA): 1,0 l/10 000 m² de área de pared foliar; La dosis máx. individual = 1,8 l/ha de suelo, incluso si el área de pared foliar > 18 000 m². Aplicar durante BBCH 55-89.
	Alternaria spp.					
	Leveillula spp.					

		GOBIERNO DE ESPAÑA				MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN		ES-01394		REYVYONA		SECRETARIA GENERAL DE RECURSOS AGRARIOS Y SEGURIDAD ALIMENTARIA		DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD DE LA PRODUCCIÓN AGROALIMENTARIA Y BIENESTAR ANIMAL	
Alcachofa	Oídio, Golovinomyces cichoracearum	1,5 l/ha	3	7 días	200 - 1000 l/ha	Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 15-59.									
Almendro	Antracnosis del fresón, Colletotrichum acutatum Cribado, perdigonado, Wilsonomyces carpophilus Mancha ocre del almendro, Polystigma ochraceum	2 l/ha	2	7 días	150 - 2000 l/ha	Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 19-79.									
	Monilia, Monilinia spp.					Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 19-79.									
Avellano	Antracnosis, Colletotrichum gloeosporioides	2 l/ha	2	7 días	150 - 2000 l/ha	Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Autorizado solo contra Sphaceloma coryli. Aplicar durante BBCH 19-79.									
	Alternaria spp.														
	Cladosporiosis, Cladosporium spp.														
	Colletotrichum spp.														
	Fusariosis, Fusarium spp.														
	Monilia, Monilinia spp.														
Berenjena	Oídio del avellano, Phyllactinia guttata	2 l/ha	2	7 días	150 - 2000 l/ha	Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 19-79.									
Berenjena	Alternaria spp.	1,5 l/ha	3	7 días	400 - 1000 l/ha	Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 14-89.									
	Leveillula spp.														
Brécol	Alternaria spp.	1,5 l/ha	2	7 días	200 - 1000 l/ha	Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 12-91.									
	Erysiphe spp.														
Brécol	Mancha anular de la col, Neopseudocercospora brassicae	1,5 l/ha	2	7 días	200 - 1000 l/ha	Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 12-91.									
	Cercosporiosis, Cercospora spp.														
Brécol	Cladosporiosis, Cladosporium spp.	1,5 l/ha	2	7 días	200 - 1000 l/ha	Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 12-91.									
	Colletotrichum spp.														
Brotes tiernos, incluidas las especies de Brassica	Estemfilosis, Stemphylium spp.	1,5 l/ha	1	--	200 - 800 l/ha	Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 19-49.									
Calabacín	Oídio de las cucurbitáceas, Podosphaera xanthii Oídio, Golovinomyces cichoracearum	1,5 l/ha	3	7 días	400 - 1000 l/ha	Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 14-89.									
	Oidium spp.					Eficaz contra Sphaerotheca fuliginea. Aplicar durante BBCH 14-89.									
Calabacín	Oidium spp.	1,5 l/ha	3	7 días	400 - 1000 l/ha	Eficaz contra Sphaerotheca fuliginea. Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 14-89.									
	Chancro gomoso del tallo de las cucurbitáceas, Stagonosporopsis cucurbitacearum Oídio de las cucurbitáceas, Podosphaera xanthii														
Calabaza	Oídio, Golovinomyces cichoracearum	1,5 l/ha	3	7 días	400 - 1000 l/ha	Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 14-89.									

Caqui	Mycosphaerella spp.	2 l/ha	2	7 días	150 - 2000 l/ha	Eficaz contra Mycosphaerella nawae. Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 55-85.
Castaño	Gnomoniopsis spp.	2 l/ha	2	7 días	150 - 2000 l/ha	Eficaz contra Gnomoniopsis castanae. Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 19-79.
	Socarrina, mancha foliar del castaño, Mycosphaerella maculiformis					Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 19-79.
Cerezo	Cilindrosporiosis, antracnosis del cerezo, Blumeriella jaapii	1,8 l/ha	2	7 días	200 - 2000 l/ha	[Uso secundario] Uso menor por jerarquía nacional de cultivos. Dosis expresada por área de pared foliar (LWA):1,0 l/10 000 m² de área de pared foliar; La dosis máx. individual = 1,8 l/ha de suelo, incluso si el área de pared foliar > 18 000 m². Aplicar durante BBCH 55-89.
	Oídios, Erysiphaceae					Eficaz frente a Sphaerotheca spp. Uso menor por jerarquía nacional de cultivos. Dosis expresada por área de pared foliar (LWA):1,0 l/10 000 m² de área de pared foliar; La dosis máx. individual = 1,8 l/ha de suelo, incluso si el área de pared foliar > 18 000 m². Aplicar durante BBCH 55-89.
	Monilia, Monilinia spp.					Uso menor por jerarquía nacional de cultivos. Dosis expresada por área de pared foliar (LWA): 1,0 l/10 000 m² de área de pared foliar; La dosis máx. individual = 1,8 l/ha de suelo, incluso si el área de pared foliar > 18 000 m². Aplicar durante BBCH 55-89.
Ciruelo	Oídios, Erysiphaceae	1,8 l/ha	2	7 días	200 - 2000 l/ha	Eficaz frente a Sphaerotheca spp. Uso menor por jerarquía nacional de cultivos. Dosis expresada por área de pared foliar (LWA): 1,0 l/10 000 m² de área de pared foliar; La dosis máx. individual = 1,8 l/ha de suelo, incluso si el área de pared foliar > 18 000 m². Aplicar durante BBCH 55-89.
	Monilia, Monilinia spp.					Uso menor por jerarquía nacional de cultivos. Dosis expresada por área de pared foliar (LWA): 1,0 l/10 000 m² de área de pared foliar; La dosis máx. individual = 1,8 l/ha de suelo, incluso si el área de pared foliar > 18 000 m². Aplicar durante BBCH 55-89.
Coliflor	Alternaria spp.	1,5 l/ha	2	7 días	200 - 1000 l/ha	Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 12-91.
	Erysiphe spp. Mancha anular de la col, Neopseudocercospora brassicae					
Espárrago	Botrytis spp.	1,5 l/ha	3	14 días	200 - 800 l/ha	Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 51-75.
	Estemfilosis, mancha foliar de la alfalfa, Stemphylium botryosum Estemfilosis, mancha negra, Stemphylium vesicarium Roya del espárrago, Puccinia asparagi					
Espinaca	Cercosporiosis, Cercospora spp. Cladosporiosis, Cladosporium spp. Colletotrichum spp.	1,5 l/ha	1	--	200 - 800 l/ha	Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 10-49.
	Estemfilosis, Stemphylium spp.					
Guisante para grano	Rabia del guisante, Ascochyta pisi	0,8 - 1,3 l/ha	2	10 días	100 - 400 l/ha	Guisante verde sin vaina. (Uso menor por Jerarquía de cultivos). Aplicar durante BBCH 50-72.
	Roya del guisante, Uromyces pisi					
Guisante proteaginoso /forrajero	Rabia del guisante, Ascochyta pisi	0,8 - 1,3 l/ha	2	10 días	100 - 400 l/ha	Guisante verde sin vaina. (Uso menor por Jerarquía de cultivos). Aplicar durante BBCH 50-72.
	Roya del guisante, Uromyces pisi					

Guisante verde	Rabia del guisante, Ascochyta pisi Roya del guisante, Uromyces pisi	0,8 - 1,3 l/ha	2	10 días	100 - 400 l/ha	Guisante verde sin vaina. (Uso menor por Jerarquía de cultivos). Aplicar durante BBCH 50-72.
Hierbas aromáticas y flores comestibles	Cercosporiosis, Cercospora spp. Cladosporiosis, Cladosporium spp. Colletotrichum spp.	1,5 l/ha	1	--	200 - 800 l/ha	Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 10-49.
	Estemfilosis, Stemphylium spp.					
Judía forrajera	Rabia del haba, Ascochyta fabae Roya del haba, Uromyces viciae-fabae	0,8 - 1,3 l/ha	2	10 días	100 - 400 l/ha	(Uso menor por Jerarquía de cultivos). Aplicar durante BBCH 50-72.
Judía para grano	Rabia del haba, Ascochyta fabae Roya del haba, Uromyces viciae-fabae	0,8 - 1,3 l/ha	2	10 días	100 - 400 l/ha	(Uso menor por Jerarquía de cultivos). Aplicar durante BBCH 50-72.
Judía verde	Rabia del haba, Ascochyta fabae Roya del haba, Uromyces viciae-fabae	0,8 - 1,3 l/ha	2	10 días	100 - 400 l/ha	Judía verde sin vaina. (Uso menor por Jerarquía de cultivos). Aplicar durante BBCH 50-72.
Leguminosas de grano	Ascoquitosis, Ascochyta sp.	0,8 - 1,3 l/ha	2	10 días	100 - 400 l/ha	Indicado para leguminosas secas: lentejas, garbanzos y altramuces Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 50-72.
Lima	Mycosphaerella spp.	2 l/ha	2	10 días	1500 - 3000 l/ha	(Uso menor por Jerarquía de cultivos) Eficaz contra Mycosphaerella citri. Aplicar durante BBCH 31-85.
Maíz de grano	Tizón del maíz, niebla, Exserohilum turcicum	0,75 - 1,25 l/ha	1	--	100 - 400 l/ha	Eficaz frente a Setosphaeria turcica. Indicado para maíz para grano y ensilado. Aplicar durante BBCH 31-69.
	Fusariosis, Fusarium spp.					Indicado para maíz para grano y ensilado. Aplicar durante BBCH 31-69.
Mandarino (incluido clementino e híbridos)	Alternaria spp.	2 l/ha	2	10 días	1500 - 3000 l/ha	Aplicar durante BBCH 31-85.
Manzano	Venturia spp.	2 l/ha	2	7 días	150 - 2000 l/ha	Dosis expresada por área de pared foliar (LWA): 1,3 l/10 000 m² de área de pared foliar. El máx. individual permanece en 2 l/ha de suelo, incluso si el área de pared foliar > 15 300 m². Aplicar durante BBCH 53-85.
	Oídio del manzano, Podosphaera leucotricha					Dosis expresada por área de pared foliar (LWA):1,3 l/10 000 m² de área de pared foliar. El máx. individual permanece en 2 l/ha de suelo, incluso si el área de pared foliar > 15 300 m². Aplicar durante BBCH 53-85.
	Alternaria spp.					Eficaz frente a Alternaria mali. Dosis expresada por área de pared foliar (LWA): 1,3 l/10 000 m² de área de pared foliar. El máx. individual permanece en 2 l/ha de suelo, incluso si el área de pared foliar > 15 300 m². Aplicar durante BBCH 53-85.
Melocotonero	Oídios, Erysiphaceae	1,8 l/ha	2	7 días	200 - 2000 l/ha	Eficaz frente a Sphaerotheca spp. Incluye nectarino. Dosis expresada por área de pared foliar (LWA): 1,0 l/10 000 m² de área de pared foliar; La dosis máx. individual = 1,8 l/ha de suelo, incluso si el área de pared foliar > 18 000 m². Aplicar durante BBCH 55-89.
	Monilia, Monilinia spp.					Incluye nectarino. Dosis expresada por área de pared foliar (LWA): 1,0 l/10 000 m² de área de pared foliar; La dosis máx. individual = 1,8 l/ha de suelo, incluso si el área de pared foliar > 18 000 m². Aplicar durante BBCH 55-89.
Melón	Oídio de las cucurbitáceas, Podosphaera xanthii Oídio, Golovinomyces cichoracearum	1,5 l/ha	3	7 días	400 - 1000 l/ha	Aplicar durante BBCH 14-89.
	Oidium spp.					Eficaz contra Sphaerotheca fuliginea. Aplicar durante BBCH 14-89.
	Alternaria spp.					

Naranja	Mycosphaerella spp.	2 l/ha	2	10 días	1500 - 3000 l/ha	Aplicar durante BBCH 31-85.
Nogal	Alternaria spp.	2 l/ha	2	7 días	150 - 2000 l/ha	Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 19-79.
	Antracnosis del nogal, Ophiognomonía leptostyla					
	Colletotrichum spp.					
Olivo	Repilo del olivo, Venturia oleaginea	2 l/ha	2	10 días	1000 - 1500 l/ha	Indicado para olivo de almazara y de verdeo. Aplicar durante BBCH 15-85.
Patata	Alternaria spp.	1,25 l/ha	3	7 días	100 - 1000 l/ha	Aplicar durante BBCH 20-97.
Pepinillo	Oidium spp.	1,5 l/ha	3	7 días	400 - 1000 l/ha	Eficaz contra Sphaerotheca fuliginea. Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 14-89.
	Oídio de las cucurbitáceas, Podosphaera xanthii					
	Oídio, Golovinomyces cichoracearum					
Pepino	Oidium spp.	1,5 l/ha	3	7 días	400 - 1000 l/ha	Eficaz contra Sphaerotheca fuliginea. Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 14-89.
	Oídio de las cucurbitáceas, Podosphaera xanthii					
	Oídio, Golovinomyces cichoracearum					
Peral	Estemfilosis, Stemphylium spp.	2 l/ha	2	7 días	150 - 2000 l/ha	Dosis expresada por área de pared foliar (LWA): 1,3 l/10 000 m² de área de pared foliar. El máx. individual permanece en 2 l/ha de suelo, incluso si el área de pared foliar > 15 300 m². Aplicar durante BBCH 53-85. Eficaz contra Podosphaera leucotricha Dosis expresada por área de pared foliar (LWA): 1,3 l/10 000 m² de área de pared foliar. El máx. individual permanece en 2 l/ha de suelo, incluso si el área de pared foliar > 15 300 m². Aplicar durante BBCH 53-85. Eficaz frente a Alternaria mali. Dosis expresada por área de pared foliar (LWA): 1,3 l/10 000 m² de área de pared foliar. El máx. individual permanece en 2 l/ha de suelo, incluso si el área de pared foliar > 15 300 m². Aplicar durante BBCH 53-85.
	Venturia spp.					
	Oídios, Erysiphaceae					
Pistachero	Botryosphaeria spp.	2 l/ha	2	7 días	150 - 2000 l/ha	Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Tratamiento indicado contra Botryosphaeria dothidea. Aplicar durante BBCH 19-79.
Repollo	Alternaria spp.	1,5 l/ha	2	10 días	200 - 1000 l/ha	Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 12-49.
	Erysiphe spp.					
	Mancha anular de la col, Neopseudocercospora brassicae					
Rúcula	Alternaria spp.	1,5 l/ha	1	--	200 - 800 l/ha	Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 10-49.
Sandía	Oídio de las cucurbitáceas, Podosphaera xanthii	1,5 l/ha	3	7 días	400 - 1000 l/ha	Aplicar durante BBCH 14-89. Eficaz contra Sphaerotheca fuliginea. Aplicar durante BBCH 14-89.
	Oídio, Golovinomyces cichoracearum					
	Oidium spp.					
	Alternaria spp.					

	Erysiphe spp.					
	Ramularia spp.					
Tallos jóvenes	Septoriosis, Septoria spp.	1,5 l/ha	2	14 días	500 - 800 l/ha	Indicado para apio, hinojo, cardo y ruibarbo. Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 21-49.
	Alternaria spp.					
Tomate	Leveillula spp.	1,5 l/ha	3	7 días	400 - 1000 l/ha	Aplicar durante BBCH 14-89.
Toronja, pomelo	Mycosphaerella spp.	2 l/ha	2	10 días	1500 - 3000 l/ha	(Uso menor por Jerarquía de cultivos) Eficaz contra Mycosphaerella citri. Aplicar durante BBCH 31-85.
	Black rot, podredumbre negra de la vid, Phyllosticta ampelicida					
Vid	Oídio de la vid, Erysiphe necator	1,3 l/ha	3	10-14 días	100 - 1200 l/ha	Dosis expresada por área de pared foliar (LWA): 1,0 l/10 000 m² de área de pared foliar;. Aplicar durante BBCH 14-83.
Ámbito de Aplicación: Agrario - Tipo de Usuario: Profesional - Sistema de Cultivo: Invernadero - Método de Aplicación: Carretilla						
	Alternaria spp.					
	Leveillula spp.					
Berenjena	Oídio del tomate, Oidium neolycopersici	1,5 l/ha	3	7 días	400 - 1500 l/ha	Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 14-89.
	Oídio de las cucurbitáceas, Podosphaera xanthii					Aplicar durante BBCH 14-89.
Calabacín	Oidium spp.	1,5 l/ha	3	7 días	400 - 1500 l/ha	Eficaz contra Sphaerotheca fuliginea. Aplicar durante BBCH 14-89.
	Oidium spp.					Eficaz contra Sphaerotheca fuliginea. Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 14-89.
	Chancro gomoso del tallo de las cucurbitáceas, Stagonosporopsis cucurbitacearum					
	Oídio de las cucurbitáceas, Podosphaera xanthii					
Calabaza	Oídio, Golovinomyces cichoracearum	1,5 l/ha	3	7 días	400 - 1500 l/ha	Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 14-89.
	Leveillula spp.					
Fresal	Podosphaera spp.	1,5 l/ha	3	7 días	200 - 1000 l/ha	Uso autorizado solo para aplicación en Wallk in tunnel. Aplicar durante BBCH 14-89.
	Oídio de las cucurbitáceas, Podosphaera xanthii					Aplicar durante BBCH 14-89.
Melón	Oidium spp.	1,5 l/ha	3	7 días	400 - 1500 l/ha	Eficaz contra Sphaerotheca fuliginea. Aplicar durante BBCH 14-89.
	Oidium spp.					Eficaz contra Sphaerotheca fuliginea. Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 14-89.
	Alternaria spp.					
	Chancro gomoso del tallo de las cucurbitáceas, Stagonosporopsis cucurbitacearum					
	Oídio de las cucurbitáceas, Podosphaera xanthii					
Pepinillo	Oídio, Golovinomyces cichoracearum	1,5 l/ha	3	7 días	400 - 1500 l/ha	Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 14-89.



	Oidium spp.					Eficaz contra Sphaerotheca fuliginea. Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 14-89.
	Alternaria spp. Chancro gomoso del tallo de las cucurbitáceas, Stagonosporopsis cucurbitacearum Oídio de las cucurbitáceas, Podosphaera xanthii					
Pepino	Oídio, Golovinomyces cichoracearum	1,5 l/ha	3	7 días	400 - 1500 l/ha	Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 14-89.
Pimiento	Leveillula spp.	1,5 l/ha	3	7 días	400 - 1500 l/ha	Aplicar durante BBCH 14-89.
Sandía	Oídio de las cucurbitáceas, Podosphaera xanthii					Aplicar durante BBCH 14-89.
	Oidium spp.	1,5 l/ha	3	7 días	400 - 1500 l/ha	Eficaz contra Sphaerotheca fuliginea. Aplicar durante BBCH 14-89.
Tomate	Leveillula spp.					
	Oídio del tomate, Oidium neolycopersici	1,5 l/ha	3	7 días	400 - 1500 l/ha	Aplicar durante BBCH 14-89.
Ámbito de Aplicación: Agrario - Tipo de Usuario: Profesional - Sistema de Cultivo: Invernadero - Método de Aplicación: Manual con lanza o pistola						
Berenjena	Alternaria spp.					
	Leveillula spp.					
Calabacín	Oídio del tomate, Oidium neolycopersici	1,5 l/ha	3	7 días	400 - 1500 l/ha	Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 14-89.
	Oídio de las cucurbitáceas, Podosphaera xanthii					Aplicar durante BBCH 14-89.
	Oidium spp.	1,5 l/ha	3	7 días	400 - 1500 l/ha	Eficaz contra Sphaerotheca fuliginea. Aplicar durante BBCH 14-89.
	Oidium spp.					Eficaz contra Sphaerotheca fuliginea. Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 14-89.
Calabaza	Chancro gomoso del tallo de las cucurbitáceas, Stagonosporopsis cucurbitacearum Oídio de las cucurbitáceas, Podosphaera xanthii					
	Oídio, Golovinomyces cichoracearum	1,5 l/ha	3	7 días	400 - 1500 l/ha	Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 14-89.
Fresal	Leveillula spp.					
	Podosphaera spp.	1,5 l/ha	3	7 días	200 - 1000 l/ha	Uso autorizado solo para aplicación en Walk in tunnel. Aplicar durante BBCH 14-89.
Melón	Oídio de las cucurbitáceas, Podosphaera xanthii					Aplicar durante BBCH 14-89.
	Oidium spp.	1,5 l/ha	3	7 días	400 - 1500 l/ha	Eficaz contra Sphaerotheca fuliginea. Aplicar durante BBCH 14-89.
	Oidium spp.					Eficaz contra Sphaerotheca fuliginea. Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 14-89.
	Alternaria spp. Chancro gomoso del tallo de las cucurbitáceas, Stagonosporopsis cucurbitacearum					



Pepinillo	Oídio de las cucurbitáceas, Podosphaera xanthii					
	Oídio, Golovinomyces cichoracearum	1,5 l/ha	3	7 días	400 - 1500 l/ha	Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 14-89.
Pepino	Oidium spp.					Eficaz contra Sphaerotheca fuliginea. Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 14-89.
	Alternaria spp.					
	Chancro gomoso del tallo de las cucurbitáceas, Stagonosporopsis cucurbitacearum					
	Oídio de las cucurbitáceas, Podosphaera xanthii					
Pepino	Oídio, Golovinomyces cichoracearum	1,5 l/ha	3	7 días	400 - 1500 l/ha	Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 14-89.
Pimiento	Leveillula spp.	1,5 l/ha	3	7 días	400 - 1500 l/ha	Aplicar durante BBCH 14-89.
Sandía	Oídio de las cucurbitáceas, Podosphaera xanthii					Aplicar durante BBCH 14-89.
	Oidium spp.	1,5 l/ha	3	7 días	400 - 1500 l/ha	Eficaz contra Sphaerotheca fuliginea. Aplicar durante BBCH 14-89.
Tomate	Leveillula spp.					
	Oídio del tomate, Oidium neolycopersici	1,5 l/ha	3	7 días	400 - 1500 l/ha	Aplicar durante BBCH 14-89.
Ámbito de Aplicación: Agrario - Tipo de Usuario: Profesional - Sistema de Cultivo: Invernadero - Método de Aplicación: Manual con mochila						
Berenjena	Alternaria spp.					
	Leveillula spp.					
	Oídio del tomate, Oidium neolycopersici	1,5 l/ha	3	7 días	400 - 1500 l/ha	Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 14-89.
Calabacín	Oídio de las cucurbitáceas, Podosphaera xanthii					Aplicar durante BBCH 14-89.
	Oidium spp.	1,5 l/ha	3	7 días	400 - 1500 l/ha	Eficaz contra Sphaerotheca fuliginea. Aplicar durante BBCH 14-89.
Calabaza	Oidium spp.					Eficaz contra Sphaerotheca fuliginea. Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 14-89.
	Chancro gomoso del tallo de las cucurbitáceas, Stagonosporopsis cucurbitacearum					
	Oídio de las cucurbitáceas, Podosphaera xanthii					
	Oídio, Golovinomyces cichoracearum	1,5 l/ha	3	7 días	400 - 1500 l/ha	Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 14-89.
Fresal	Leveillula spp.					
	Podosphaera spp.	1,5 l/ha	3	7 días	200 - 1000 l/ha	Uso autorizado solo para aplicación en Walk in tunnel. Aplicar durante BBCH 14-89.
Melón	Oídio de las cucurbitáceas, Podosphaera xanthii					Aplicar durante BBCH 14-89.
	Oidium spp.	1,5 l/ha	3	7 días	400 - 1500 l/ha	Eficaz contra Sphaerotheca fuliginea. Aplicar durante BBCH 14-89.
	Oidium spp.					Eficaz contra Sphaerotheca fuliginea. Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 14-89.

 GOBIERNO DE ESPAÑA  MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN		ES-01394 REYONA	SECRETARIA GENERAL DE RECURSOS AGRARIOS Y SEGURIDAD ALIMENTARIA	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD DE LA PRODUCCIÓN AGROALIMENTARIA Y BIENESTAR ANIMAL	
		Clase de Usuario			
Uso profesional.					
		Mitigación de riesgos en la manipulación			
SEGURIDAD DEL APLICADOR					
Pulverización al aire libre y por carretilla en invernadero y walk in tunnel:					
El aplicador utilizará durante la mezcla/carga: - Guantes de protección química - Ropa de protección nivel C1 o equivalente. - Ropa de protección parcial tipo delantal de nivel C3, o equivalente. - Calzado de uso profesional de material polimérico. - Pantalla facial.					
Durante la aplicación: - Guantes de protección química. - Ropa de protección con nivel C1 o equivalente. - Calzado de uso profesional de material polimérico.					
Pulverización manual (lanza/pistola o mochila) en invernadero y walk in tunnel:					
El aplicador utilizará durante la mezcla/carga: - Guantes de protección química. - Ropa de protección parcial tipo delantal nivel C3 o equivalente. - Calzado de uso profesional de material polimérico. - Pantalla facial.					
Durante la aplicación: - Guantes de protección química. - Ropa de protección parcial tipo delantal de nivel C3, o equivalente. - Calzado de uso profesional de material polimérico.					
SEGURIDAD DEL TRABAJADOR					
El trabajador utilizará durante la reentrada al cultivo: - Guantes de protección química (excepto en maíz). - Ropa de protección nivel C1 o ropa de trabajo. - Calzado cerrado.					
NORMATIVA APLICABLE A LOS EPIS					
- Guantes de protección contra productos químicos conforme a la norma UNE-EN ISO 374-1:2016 y su modificación UNE-EN ISO 374-1:2016/A1:2018. Los guantes deben ser reutilizables al manipular el producto concentrado. Para el contacto con el producto diluido o residuo seco, pueden ser reutilizables o desechables. Deben tener la resistencia mecánica suficiente para evitar la rotura. Si se dañan, deben reemplazarse de inmediato. - Ropa de protección: nivel C1, C2, C3 de protección completa, frente a productos fitosanitarios, según norma UNE-EN ISO 27065:2017 y su modificación UNE EN ISO 27065: 2017/A1:2019. - Alternativamente, se puede usar ropa de protección química, tipo 6, frente a salpicaduras de productos líquidos, conforme a norma UNE-EN 13034: 2005 + A1: 2009. - Alternativamente se puede usar ropa de protección química para cuerpo completo tipo 3, de acuerdo a la norma UNE-EN ISO 14605:2005+A1:2009, cuyo material haya superado ensayos de permeación frente a productos fitosanitarios Estos equipos se usarán con las limitaciones de uso indicadas por el fabricante. - Ropa de protección parcial: nivel C3, de protección frente a productos fitosanitarios, según norma UNE-EN ISO 27065:2017 y su modificación UNE EN ISO 27065: 2017/A1:2019. - Alternativamente, se puede usar ropa de protección química parcial tipo PB (3) con uniones herméticas a los líquidos o tipo PB (4) con uniones herméticas a la pulverización según norma UNE-EN 14605:2005+A1:2009, cuyo material haya superado ensayos de permeación frente a fitosanitarios. - Calzado de uso profesional, al menos botas tobilleras, de caucho u otro material polimérico (clasificación II). - Ropa de trabajo adecuada: Mono o chaqueta de manga larga y pantalón largo hechos de algodón (≥ 300 g/m2) o de algodón y al menos un 65% de poliéster (≥ 245 g/m2). - Protección facial: pantalla facial según norma UNE-EN 166:2002 o UNE-EN ISO 16321-1:2022.					
Medidas adicionales de mitigación del riesgo:					
- Durante la aplicación con tractor se deberán usar los guantes de protección química únicamente para manipular el equipo de aplicación o superficies contaminadas. - En la limpieza y mantenimiento del equipo se aplicarán las mismas medidas de protección que en mezcla/carga.					

Otras Indicaciones reglamentarias

OBSERVACIONES (esta información no tiene que figurar en la etiqueta)

En cumplimiento del artículo 45 del Reglamento (CE) nº 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2008 sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas (CLP), los usuarios intermedios o importadores de mezclas clasificadas para la salud humana o por sus peligros físicos, deberán enviar la información pertinente para la formulación de medidas preventivas y curativas, en particular para la respuesta sanitaria en caso de urgencia al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (Organismo designado a tal efecto según la Ley 8/2010 de 31 de marzo).

La Orden JUS/288/2021, de 25 de marzo, regula el procedimiento de comunicación de dicha información al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.

Para incluir el teléfono del Servicio de Información Toxicológica en la etiqueta, instrucciones de primeros auxilios, así como en el apartado 1.4 de la Ficha de Datos de Seguridad es obligatorio haber realizado previamente el alta de la ficha toxicológica según el procedimiento mencionado.

Lo que se informa a los efectos dispuestos en el Real Decreto y los Reglamentos antes citados.

(*) La etiqueta deberá incluir una referencia a la responsabilidad de la persona que utilice el producto fitosanitario con respecto a la eficacia o la fitotoxicidad del uso. Los usos menores se identificarán por separado en la etiqueta.

INDICACIONES QUE DEBEN FIGURAR EN LA ETIQUETA

Otros componentes además del ingrediente activo técnico:

1,2-Benzisotiazol-3-(2H)-ona (CAS 2634-33-5).
Mezcla de 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona y 2-metil-2H-isotiazol-3-ona (3:1) (CAS 55965-84-9).
1,2,3- ácido propanotricarboxílico, 2-hidroxi-, polímero con a-hidro-hidroxipoli (oxi-1,4-butanodiilo) y 5-isocianato-1-(isocianato-metil)-1,3,3-trimetil-ciclohexano, polietilenglicol mono -Me éter- y polietilen-polipropilenglicol mono-C16-18-alquil éteres bloqueados (CAS 1887149-14-5).

Otras leyendas e indicaciones:

El preparado no se usará en combinación con otros productos.
EUH401: A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso.

