



|                                                       |                                                                                                                                                                                                                              |               |     |         |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|---------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                       | Antracnosis del fresón,<br>Colletotrichum acutatum<br>Abolladura, lepra del<br>melocotonero, Taphrina<br>deformans<br>Cribado, perdigonado,<br>Wilsonomyces carpophilus<br>Mancha ocre del almendro,<br>Polystigma ochraceum |               | 1-2 |         |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Almendro                                              | Monilia, Monilinia spp.                                                                                                                                                                                                      | 1 Kg/ha       | 1-2 | 10-15 d | 1000 - 1500 l/ha | Pulverización normal con tractor ó manual.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                       | Botrytis spp.                                                                                                                                                                                                                |               |     |         |                  | (Uso menor autorizado por procedimiento nacional).<br>Producción destinada a consumo de tallos y hojas.<br>Pulverización normal con tractor ó manual.<br>- Para producción de tallos: dosis de 1 kg/ha. PS:21días.<br>- Para producción de hojas de apio: dosis de 1,5 kg/ha. PS: 14 días.<br>Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*).<br>Aplicar entre BBCH 15-49.                                   |
| Apio                                                  | Mildiu de las umbelíferas,<br>Plasmopara crustosa                                                                                                                                                                            | 1 - 1,5 Kg/ha | 1-2 | 10 d    | 400 - 1000 l/ha  | (Uso menor autorizado por procedimiento nacional).<br>Producción destinada a consumo de tallos y hojas.<br>Pulverización normal con tractor ó manual.<br>- Para producción de tallos: dosis de 1 kg/ha.<br>- Para producción de hojas de apio: dosis de 1,5 kg/ha.<br>Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*).<br>Aplicar entre BBCH 15-49.                                                           |
| Arándano, mirtilo                                     | Botrytis spp.<br>Oídio, Microsphaera<br>penicillata                                                                                                                                                                          | 1 - 1,5 Kg/ha | 1-2 | 7-10 d  | 400 - 1000 l/ha  | Pulverización normal con tractor ó manual.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Avellano                                              | Alternaria spp.<br>Antracnosis, Colletotrichum<br>gloeosporioides<br>Cladosporiosis,<br>Cladosporium spp.<br>Fusariosis, Fusarium spp.                                                                                       | 1 Kg/ha       | 1-2 | 10-15 d | 600 - 1500 l/ha  | Pulverización normal con tractor ó manual.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Barbarea                                              | Botrytis spp.<br>Sclerotinia spp.                                                                                                                                                                                            | 1,5 Kg/ha     | 1-2 | 7 d     | 1000 l/ha        | (Uso menor autorizado por procedimiento nacional).<br>Pulverización normal con tractor ó manual.<br>Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*).<br>Aplicar entre BBCH 15-47.                                                                                                                                                                                                                             |
| Berenjena                                             | Botrytis spp.<br>Oídio del tomate, Oidium<br>neolycopersici<br>Sclerotinia spp.                                                                                                                                              | 0,1 - 0,15 %  | 1-3 | 7-10 d  | 400 - 1000 l/ha  | Dosis máxima: 1,5 kg/ha.<br>Pulverización normal con tractor o manual.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Berro, mastuerzo                                      | Botrytis spp.<br>Sclerotinia spp.                                                                                                                                                                                            | 1,5 Kg/ha     | 1-2 | 7 d     | 1000 l/ha        | (Uso menor autorizado por procedimiento nacional).<br>Pulverización normal con tractor ó manual.<br>Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*).<br>Aplicar entre BBCh 15-47.<br>(Uso menor autorizado por procedimiento nacional).<br>Pulverización normal con tractor ó manual.<br>Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*).<br>Aplicar entre BBCH 15-47. |
| Brécol                                                | Mancha negra, tizón de las<br>crucíferas, Alternaria<br>brassicae                                                                                                                                                            | 1 Kg/ha       | 1-3 | 7-10 d  | 400 - 1000 l/ha  | Pulverización normal con tractor ó manual.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Brotes tiernos, incluidas<br>las especies de Brassica | Botrytis spp.<br>Sclerotinia spp.                                                                                                                                                                                            | 1,5 Kg/ha     | 1-2 | 7 d     | 1000 l/ha        | (Uso menor autorizado por procedimiento nacional).<br>Pulverización normal con tractor ó manual.<br>Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*).<br>Aplicar entre BBCh 15-47.                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                       | Botrytis spp.                                                                                                                                                                                                                |               |     |         |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                         |                                                       |               |     |        |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|-----|--------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Canónigo                                | Sclerotinia spp.                                      | 1,5 Kg/ha     | 1-2 | 7 d    | 1000 l/ha       | (Uso menor autorizado por procedimiento nacional).<br>Pulverización normal con tractor ó manual.<br>Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*).<br>Aplicar entre BBCH 15-47.                                        |
| Cebolla                                 | Botrytis spp.                                         | 1 - 1,5 Kg/ha | 1-2 | 7-10 d | 400 - 1000 l/ha | Pulverización normal con tractor ó manual.                                                                                                                                                                                                                      |
|                                         | Sclerotinia spp.                                      |               |     |        |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Diente de león                          | Botrytis spp.                                         | 1,5 Kg/ha     | 1-2 | 7 d    | 1000 l/ha       | (Uso menor autorizado por procedimiento nacional).<br>Pulverización normal con tractor ó manual.<br>Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*).<br>Aplicar entre BBCH 15-47.                                        |
|                                         | Sclerotinia spp.                                      |               |     |        |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Escarola                                | Botrytis spp.                                         | 1 - 1,5 Kg/ha | 1-2 | 7-10 d | 400 - 600 l/ha  | Pulverización normal con tractor ó manual.                                                                                                                                                                                                                      |
|                                         | Sclerotinia spp.                                      |               |     |        |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Espárrago                               | Podredumbre blanca, Sclerotinia sclerotiorum          | 1 - 1,5 Kg/ha | 1-2 | 10 d   | 400 - 1000 l/ha | Pulverización normal con tractor ó manual.                                                                                                                                                                                                                      |
|                                         | Roya del espárrago, Puccinia asparagi                 |               |     | 10 D   |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Espinaca                                | Cladosporiosis de la espinaca, Cladosporium variabile | 1 Kg/ha       | 1-2 | 7-10 d | 400 - 1000 l/ha | Pulverización normal con tractor ó manual.                                                                                                                                                                                                                      |
|                                         | Mildiu de la acelga, Peronospora farinosa             |               |     | 7-10   |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Frambueso                               | Antracnosis, Colletotrichum gloeosporioides           | 1 - 1,5 Kg/ha | 1-2 | 7-10 d | 400 - 1000 l/ha | Pulverización normal con tractor ó manual.                                                                                                                                                                                                                      |
|                                         | Botrytis spp.                                         |               |     |        |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Garbanzo                                | Oídio de la fresa, Podosphaera aphanis                | 1 - 1,5 Kg/ha | 1-2 | 10 d   | 400 - 1000 l/ha | Pulverización normal con tractor ó manual.                                                                                                                                                                                                                      |
|                                         | Rabia del garbanzo, Ascochyta rabiei                  |               |     |        |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Grosellero                              | Sclerotinia spp.                                      | 1 - 1,5 Kg/ha | 1-2 | 7-10 d | 400 - 1000 l/ha | Pulverización normal con tractor ó manual.                                                                                                                                                                                                                      |
|                                         | Botrytis spp.                                         |               |     |        |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Hierbas aromáticas y flores comestibles | Oídio del grosellero, Microsphaera grossulariae       | 1 - 1,5 Kg/ha | 1-2 | 10 d   | 400 - 1000 l/ha | (Uso menor autorizado por procedimiento nacional).<br>Pulverización normal con tractor ó manual.<br>Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*).<br>Aplicar entre BBCH 15-47.                                        |
|                                         | Oídio del grosellero, Podosphaera mors-uvae           |               |     |        |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Judía verde                             | Botrytis spp.                                         | 1 - 1,5 Kg/ha | 1-2 | 10 d   | 400 - 1000 l/ha | Judía (sin vaina).<br>Pulverización normal con tractor ó manual.                                                                                                                                                                                                |
|                                         | Roya de la judía, Uromyces appendiculatus             |               |     |        |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Laurel                                  | Sclerotinia spp.                                      | 1,5 Kg/ha     | 1-2 | 10 d   | 400 - 1000 l/ha | (Uso menor autorizado por procedimiento nacional).<br>Hojas aptas para el consumo humano.<br>Pulverización normal con tractor ó manual.<br>Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*).<br>Aplicar entre BBCH 15-47. |
|                                         | Botrytis spp.                                         |               |     |        |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Lechuga                                 | Sclerotinia spp.                                      | 1 - 1,5 Kg/ha | 1-2 | 7-10 d | 600 - 1000 l/ha | Pulverización normal con tractor ó manual.                                                                                                                                                                                                                      |
|                                         | Botrytis spp.                                         |               |     |        |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                         | Sclerotinia spp.                                      |               |     | 7 d    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                                                                                |                                                                                  |                                                                                 |     |         |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                                                                  |  |     | 23977   |                  | SECRETARIA GENERAL DE RECURSOS AGRARIOS Y SEGURIDAD ALIMENTARIA                                                                                                                                                                                                                                                           |
| SIGNUM                                                                                         |                                                                                  |                                                                                 |     |         |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD DE LA PRODUCCIÓN AGROALIMENTARIA Y BIENESTAR ANIMAL               |                                                                                  |                                                                                 |     |         |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Mostaza china                                                                                  | Botrytis spp.                                                                    | 1,5 Kg/ha                                                                       | 1-2 | 7-10 d  | 1000 l/ha        | (Uso menor autorizado por procedimiento nacional).<br>Pulverización normal con tractor ó manual.<br>Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*).<br>Aplicar entre BBCH 15-47.                                                                                                  |
| Nogal                                                                                          | Alternaria spp.                                                                  |                                                                                 |     |         |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                | Antracnosis, Colletotrichum gloeosporioides<br>Cladosporiosis, Cladosporium spp. |                                                                                 |     |         |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Nogal                                                                                          | Fusariosis, Fusarium spp.                                                        | 1 Kg/ha                                                                         | 1-2 | 10-15 d | 600 - 1500 l/ha  | Pulverización normal con tractor ó manual.                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Pimiento                                                                                       | Botrytis spp.                                                                    |                                                                                 |     |         |                  | Dosis máxima: 1,5 kg/ha.<br>Pulverización normal con tractor o manual.                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                | Sclerotinia spp.                                                                 |                                                                                 |     |         |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Pimiento                                                                                       | Oídio del tomate, Oidium neolycopersici                                          | 0,1 - 0,15 %                                                                    | 1-3 | 7-10 d  | 400 - 1000 l/ha  | Pulverización normal con tractor o manual.                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Pistachero                                                                                     | Abolladura, lepra, Taphrina spp.                                                 |                                                                                 |     |         |                  | (Uso menor autorizado por procedimiento nacional).<br>Aplicar en pulverización normal.<br>Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*).<br>Aplicar desde el comienzo de la floración (BBCH 61) hasta que los frutos alcanzan el tamaño propio de su especie/variedad (BBCH 79). |
|                                                                                                | Cribado, perdigonado, Wilsonomyces carpophilus                                   |                                                                                 |     |         |                  | (Uso menor autorizado por procedimiento nacional).<br>Aplicar en pulverización normal.<br>Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*).<br>Aplicar desde el comienzo de la floración (BBCH 61) hasta que los frutos alcanzan el tamaño propio de su especie/variedad (BBCH 79). |
|                                                                                                | Monilia, Monilinia spp.                                                          |                                                                                 |     |         |                  | (Uso menor autorizado por procedimiento nacional).<br>Pulverización normal.<br>Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*).<br>Aplicar desde el comienzo de la floración (BBCH 61) hasta que los frutos alcanzan el tamaño propio de su especie/variedad (BBCH 79).            |
|                                                                                                | Botryosphaeria spp.                                                              | 1 Kg/ha                                                                         | 1-2 | 10-15 d | 1000 - 1500 l/ha | (Uso secundario).<br>Contra Botryosphaeria dothidea.<br>Pulverización normal.<br>Aplicar desde el comienzo de la floración (BBCH 61) hasta que los frutos alcanzan el tamaño propio de su especie/variedad (BBCH 79).                                                                                                     |
| Puerro                                                                                         | Botrytis spp.<br>Punta blanca, mildiu del puerro, Phytophthora porri             | 1 - 1,5 Kg/ha                                                                   | 1-2 | 7-14 d  | 400 - 1000 l/ha  | Pulverización normal con tractor ó manual.                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Rúcula                                                                                         | Botrytis spp.                                                                    |                                                                                 |     |         |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                | Sclerotinia spp.                                                                 | 1,5 Kg/ha                                                                       | 1-2 | 7 d     | 1000 l/ha        | (Uso menor autorizado por procedimiento nacional).<br>Pulverización normal con tractor ó manual.<br>Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*).<br>Aplicar entre BBCH 15-47.                                                                                                  |
| Tomate                                                                                         | Oídio del tomate, Oidium neolycopersici                                          |                                                                                 |     |         |                  | Dosis máxima: 1,5 kg/ha.<br>Pulverización normal con tractor o manual al aire libre.                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                | Botrytis spp.                                                                    |                                                                                 |     |         |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Tomate                                                                                         | Sclerotinia spp.                                                                 | 0,1 - 0,15 %                                                                    | 1-3 | 7-10 d  | 400 - 1000 l/ha  | Dosis máxima: 1,5 kg/ha.<br>Pulverización normal con tractor o manual.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Zanahoria                                                                                      | Alternaria spp.                                                                  |                                                                                 |     |         |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                | Oídio de la zanahoria, Erysiphe heraclei                                         | 1 Kg/ha                                                                         | 1-2 | 7-10 d  | 400 - 1000 l/ha  | Pulverización normal con tractor ó manual.                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Zarzamoras                                                                                     | Botrytis spp.                                                                    |                                                                                 |     |         |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                | Oídio de la fresa, Podosphaera aphanis                                           | 1 - 1,5 Kg/ha                                                                   | 1-2 | 7-10 d  | 400 - 1000 l/ha  | Pulverización normal con tractor ó manual.                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ámbito de Aplicación: Agrario - Tipo de Usuario: Profesional - Sistema de Cultivo: Invernadero |                                                                                  |                                                                                 |     |         |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                | Botrytis spp.<br>Oídio del tomate, Oidium neolycopersici                         |                                                                                 |     |         |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                                                                                             |                                         |                                                                                                                                            |     |                 |                 |                                                                                                                                                                        |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  <div>GOBIERNO DE ESPAÑA</div> |                                         |  <div>MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN</div> |     | 23977<br>SIGNUM |                 | <div>SECRETARIA GENERAL DE RECURSOS AGRARIOS Y SEGURIDAD ALIMENTARIA</div> <div>DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD DE LA PRODUCCIÓN AGROALIMENTARIA Y BIENESTAR ANIMAL</div> |  |
| Berenjena                                                                                                   | Sclerotinia spp.                        | 0,1 - 0,15 %                                                                                                                               | 1-3 | 7-10 d          | 400 - 1000 l/ha | Dosis máxima: 1,5 kg/ha.<br>Pulverización manual, fija automatizada ó hidroneumática desde el exterior.                                                                |  |
| Fresal                                                                                                      | Botrytis spp.                           |                                                                                                                                            |     |                 |                 |                                                                                                                                                                        |  |
|                                                                                                             | Oídio de la fresa, Podosphaera aphanis  | 1 - 1,8 Kg/ha                                                                                                                              | 1-2 | 7-10 d          | 400 - 1000 l/ha | Pulverización manual.                                                                                                                                                  |  |
| Pimiento                                                                                                    | Botrytis spp.                           |                                                                                                                                            |     |                 |                 |                                                                                                                                                                        |  |
|                                                                                                             | Sclerotinia spp.                        |                                                                                                                                            |     |                 |                 | Dosis máxima: 1,5 kg/ha.<br>Pulverización manual, fija automatizada ó hidroneumática desde el exterior.                                                                |  |
|                                                                                                             | Oídio del tomate, Oidium neolycopersici | 0,1 - 0,15 %                                                                                                                               | 1-3 | 7-10 d          | 400 - 1000 l/ha | Pulverización manual, fija automatizada ó hidroneumática desde el exterior.                                                                                            |  |
| Tomate                                                                                                      | Botrytis spp.                           |                                                                                                                                            |     |                 |                 |                                                                                                                                                                        |  |
|                                                                                                             | Oídio del tomate, Oidium neolycopersici |                                                                                                                                            |     |                 |                 |                                                                                                                                                                        |  |
|                                                                                                             | Sclerotinia spp.                        | 0,1 - 0,15 %                                                                                                                               | 1-3 | 7-10 d          | 400 - 1000 l/ha | Dosis máxima: 1,5 kg/ha.<br>Pulverización manual, fija automatizada ó hidroneumática desde el exterior.                                                                |  |
| Ámbito de Aplicación: No Agrario - Tipo de Usuario: Profesional - Sistema de Cultivo: Aire libre            |                                         |                                                                                                                                            |     |                 |                 |                                                                                                                                                                        |  |
| Arbustos y pequeños árboles ornamentales                                                                    | Botrytis spp.                           |                                                                                                                                            |     | 10 d            |                 |                                                                                                                                                                        |  |
|                                                                                                             | Oídios, Erysiphaceae                    | 1 - 1,5 Kg/ha                                                                                                                              | 1-2 | 10 D            | 400 - 1000 l/ha | Pulverización normal con tractor ó manual.                                                                                                                             |  |
| Coníferas                                                                                                   | Botrytis spp.                           |                                                                                                                                            |     | 10 d            |                 | Exclusivamente para usos ornamentales.<br>Pulverización normal con tractor ó manual al aire libre.                                                                     |  |
|                                                                                                             | Oídios, Erysiphaceae                    | 1 - 1,5 Kg/ha                                                                                                                              | 1-2 | 10 D            | 400 - 1000 l/ha | Exclusivamente para usos ornamentales.<br>Pulverización normal con tractor ó manual.                                                                                   |  |
| Frondosas                                                                                                   | Oídios, Erysiphaceae                    |                                                                                                                                            |     |                 |                 | Exclusivamente para usos ornamentales.<br>Pulverización normal con tractor ó manual.                                                                                   |  |
|                                                                                                             | Botrytis spp.                           | 1 - 1,5 Kg/ha                                                                                                                              | 1-2 | 10 d            | 400 - 1000 l/ha | Exclusivamente para usos ornamentales.<br>Pulverización normal con tractor ó manual.                                                                                   |  |
| Ornamentales herbáceas                                                                                      | Botrytis spp.                           |                                                                                                                                            |     | 10 d            |                 |                                                                                                                                                                        |  |
|                                                                                                             | Oídios, Erysiphaceae                    | 1 - 1,5 Kg/ha                                                                                                                              | 1-2 | 10 D            | 400 - 1000 l/ha | Pulverización normal con tractor ó manual.                                                                                                                             |  |
| Palmáceas                                                                                                   | Botrytis spp.                           |                                                                                                                                            |     |                 |                 |                                                                                                                                                                        |  |
|                                                                                                             | Oídios, Erysiphaceae                    | 1 - 1,5 Kg/ha                                                                                                                              | 1-2 | 10 d            | 400 - 1000 l/ha | Pulverización normal con tractor ó manual.                                                                                                                             |  |
| Palmera datilera                                                                                            | Botrytis spp.                           |                                                                                                                                            |     |                 |                 |                                                                                                                                                                        |  |
|                                                                                                             | Oídios, Erysiphaceae                    | 1 - 1,5 Kg/ha                                                                                                                              | 1-2 | 10 d            | 400 - 1000 l/ha | Exclusivamente para uso ornamental (no apto para consumo humano).<br>Pulverización normal con tractor ó manual.                                                        |  |
| Ámbito de Aplicación: No Agrario - Tipo de Usuario: Profesional - Sistema de Cultivo: Invernadero           |                                         |                                                                                                                                            |     |                 |                 |                                                                                                                                                                        |  |
| Arbustos y pequeños árboles ornamentales                                                                    | Oídios, Erysiphaceae                    |                                                                                                                                            |     | 10 D            |                 | Pulverización manual, fija automatizada o hidroneumática desde el exterior en invernadero.                                                                             |  |
|                                                                                                             | Botrytis spp.                           | 1 - 1,5 Kg/ha                                                                                                                              | 1-2 | 10 d            | 400 - 1000 l/ha | Pulverización manual, fija automatizada o hidroneumática desde el exterior.                                                                                            |  |
| Coníferas                                                                                                   | Oídios, Erysiphaceae                    |                                                                                                                                            |     | 10 D            |                 | Exclusivamente para usos ornamentales.<br>Pulverización manual, fija automatizada o hidroneumática desde el exterior en invernadero.                                   |  |
|                                                                                                             | Botrytis spp.                           | 1 - 1,5 Kg/ha                                                                                                                              | 1-2 | 10 d            | 400 - 1000 l/ha | Exclusivamente para usos ornamentales.<br>Pulverización manual, fija automatizada o hidroneumática desde el exterior.                                                  |  |
| Frondosas                                                                                                   | Oídios, Erysiphaceae                    |                                                                                                                                            |     |                 |                 | Exclusivamente para usos ornamentales.<br>Pulverización manual, fija automatizada o hidroneumática desde el exterior.                                                  |  |
|                                                                                                             | Botrytis spp.                           | 1 - 1,5 Kg/ha                                                                                                                              | 1-2 | 10 d            | 400 - 1000 l/ha | Exclusivamente para usos ornamentales.<br>Pulverización manual, fija automatizada o hidroneumática desde el exterior.                                                  |  |
| Ornamentales herbáceas                                                                                      | Botrytis spp.                           |                                                                                                                                            |     | 10 d            |                 |                                                                                                                                                                        |  |
|                                                                                                             | Oídios, Erysiphaceae                    | 1 - 1,5 Kg/ha                                                                                                                              | 1-2 | 10 D            | 400 - 1000 l/ha | Pulverización manual, fija automatizada o hidroneumática desde el exterior.                                                                                            |  |
| Palmáceas                                                                                                   | Botrytis spp.                           |                                                                                                                                            |     |                 |                 |                                                                                                                                                                        |  |
|                                                                                                             | Oídios, Erysiphaceae                    | 1 - 1,5 Kg/ha                                                                                                                              | 1-2 | 10 d            | 400 - 1000 l/ha | Pulverización manual, fija automatizada o hidroneumática desde el exterior.                                                                                            |  |
|                                                                                                             | Botrytis spp.                           |                                                                                                                                            |     |                 |                 |                                                                                                                                                                        |  |

|                  |                      |               |     |      |                 |                                                                                                                                               |
|------------------|----------------------|---------------|-----|------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Palmera datilera | Oídios, Erysiphaceae | 1 - 1,5 Kg/ha | 1-2 | 10 d | 400 - 1000 l/ha | Exclusivamente para uso ornamental (no apto para consumo humano). Pulverización manual, fija automatizada o hidroneumática desde el exterior. |
|------------------|----------------------|---------------|-----|------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Plazos de Seguridad (Protección del Consumidor)                                                                                                                                                                                                                               |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| USO                                                                                                                                                                                                                                                                           | P.S. (días)             |
| Arándano, mirtilo, Berenjena, Frambueso, Grosellero, Pimiento, Tomate, Zarzamoras, Fresal                                                                                                                                                                                     | 3                       |
| Garbanzo, Lechuga                                                                                                                                                                                                                                                             | 7                       |
| Judía verde                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10                      |
| Achicoria (hojas), Ajo, Alcachofa, Barbarea, Berro, mastuerzo, Brécol, Brotes tiernos, incluidas las especies de Brassica, Canónigo, Cebolla, Diente de león, Escarola, Espinaca, Hierbas aromáticas y flores comestibles, Laurel, Mostaza china, Rúcula, Zanahoria, Coliflor | 14                      |
| Puerro                                                                                                                                                                                                                                                                        | 21                      |
| Almendro, Avellano, Nogal, Pistachero                                                                                                                                                                                                                                         | 28                      |
| Espárrago, Arbustos y pequeños árboles ornamentales, Coníferas, Frondosas, Ornamentales herbáceas, Palmáceas, Palmera datilera                                                                                                                                                | NO PROCEDE              |
| Apio                                                                                                                                                                                                                                                                          | TALLOS (21), HOJAS (14) |



| Clase de Usuario                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uso profesional.<br>Uso profesional no agrario en lugares no destinados al público en general. |



Mitigación de riesgos en la manipulación

Seguridad del APLICADOR:

Aire libre:  
En lechuga, escarola, tomate, pimiento, berenjena, apio, alcachofa, coliflor, canónigo, berro (mastuerzo), barbarea, rúcula, mostaza china, brotes tiernos (incluidas las especies de Brassica), achicoria, diente de león, hierbas aromáticas y flores comestibles, laurel, zanahoria, cebolla, ajo, frambuesas, zarzamora, arándanos, grosella, brécol, almendro, pistachero, avellano y nogal, esparrago, judía verde (sin vaina), garbanzo, espinaca, puerro y ornamentales en pulverización normal con tractor o manual, durante la mezcla/carga se deberán utilizar guantes de protección química y durante la aplicación, limpieza y mantenimiento del equipo se deberán utilizar guantes y ropa de protección química (tipo 3 o 4 de acuerdo a norma UNE-EN14605: 2005 + A1:2009) y calzado adecuado.

Durante la aplicación con tractor con cabina cerrada y dispositivo de filtrado de aire, se podrá prescindir del equipo de protección, siempre que se mantengan las ventanas cerradas.

Evítese el contacto con el follaje húmedo durante el tratamiento.

Invernadero:  
En tomate, pimiento, berenjena y fresal, y ornamentales en pulverización manual, durante la mezcla/carga se deberán utilizar guantes de protección química, y durante la aplicación, limpieza y mantenimiento del equipo se deberán utilizar guantes y ropa de protección química (tipo 6 de acuerdo a norma UNE-EN13034: 2005 + A1:2009).

En tomate, pimiento, berenjena y ornamentales, en pulverización hidroneumática desde el exterior, durante la mezcla carga, aplicación, limpieza y mantenimiento del equipo se deberán utilizar guantes de protección química, como mínima medida de protección individual.

En tomate, pimiento y berenjena y ornamentales en pulverización con instalaciones fijas automatizadas, durante la mezcla/carga, limpieza y mantenimiento del equipo se deberán utilizar guantes de protección química. No entrar en el invernadero hasta finalizada la aplicación.

Se recomienda revisar la instalación del sistema de pulverización antes del comienzo de la aplicación del producto.

Seguridad del TRABAJADOR:  
En tomate, pimiento, berenjena, apio, alcachofa, coliflor, canónigo, berro (mastuerzo), barbarea, rúcula, mostaza china, brotes tiernos (incluidas las especies de Brassica), achicoria, diente de león, hierbas aromáticas y flores comestibles, laurel, fresal, y frambuesa, zarzamora, arándanos, y grosellas, escarola y ornamentales se deberán utilizar guantes de protección química para tareas que superen las dos horas.

En avellano, nogal, almendro, pistachero 13 días como periodo de reentrada para labores superiores a 2 horas, en lechuga, escarola, cebolla y ajo 7 días, en espárrago, judía verde (sin vaina), puerro, guisante y garbanzo 5 días y en brécol 4 días.

No tratar con este producto en caso de que se prevea la realización de labores mecánicas que puedan deteriorar los guantes de protección química.

SPo2: Lávese toda la ropa de protección después de usarla.  
SPo5 Ventilar los invernaderos tratados hasta que se haya secado la pulverización antes de volver a entrar.

SPo 5: Ventilar los invernaderos tratados hasta que se haya secado la pulverización antes de volver a entrar.





Otras Indicaciones reglamentarias

OBSERVACIONES (esta información no tiene que figurar en la etiqueta).

No autorizado para uso profesional en lugares destinados al público en general en cumplimiento con el artículo 49.4 del Real Decreto 1311/2012 de 14 de septiembre, por el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de productos fitosanitarios.

En cumplimiento del artículo 45 del Reglamento (CE) nº 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2008 sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas (CLP), los usuarios intermedios o importadores de mezclas clasificadas para la salud humana o por sus peligros físicos, deberán enviar la información pertinente para la formulación de medidas preventivas y curativas, en particular para la respuesta sanitaria en caso de urgencia al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (Organismo designado a tal efecto según la Ley 8/2010 de 31 de marzo).

La Orden JUS/288/2021, de 25 de marzo, regula el procedimiento de comunicación de dicha información al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.

Para incluir el teléfono del Servicio de Información Toxicológica en la etiqueta, instrucciones de primeros auxilios, así como en el apartado 1.4 de la Ficha de Datos de Seguridad es obligatorio haber realizado previamente el alta de la ficha toxicológica según el procedimiento mencionado.

Lo que se informa a los efectos dispuestos en el Real Decreto y los Reglamentos antes citados.

(\*) Con respecto a los usos menores autorizados en esta propuesta de autorización; apio, alcachofa, coliflor, canónigo, berro (mastuerzo), barbarea, rúcula, mostaza china, brotes tiernos (incluidas las especies de Brassica), achicoria, diente de león, hierbas aromáticas y flores comestibles, laurel, pistachero, tal y como se establece en el tercer párrafo del artículo 51.5 del reglamento (CE) 1107/2009, “La publicación oficial o, en su caso, la etiqueta incluirá una referencia a la responsabilidad de la persona que utilice el producto fitosanitario en relación con los fallos de eficacia o con la fitotoxicidad del producto para el que se haya concedido el uso menor. La ampliación del uso menor figurará de manera separada en la etiqueta.”

INDICACIONES QUE DEBEN FIGURAR EN LA ETIQUETA.

☐ Otras leyendas e indicaciones.

- El preparado no se usará en combinación con otros productos.
- EUH401: A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso.