

Datos del Producto						
Número de Registro:	ES-00045	Estado:	☒ Vigente	Fechas	Inscripción:	29/06/2017
					Renovación:	
					Caducidad:	31/08/2027
Nombre Comercial:	TUREX 50 WG					

Titular	Fabricante
MITSUI AGRISCIENCE INTERNATIONAL S.A./N.V. Avenue de Tervueren 270 1150 (Bruselas) BÉLGICA	CERTIS USA LLC 9145 Guilford Road, Suite 175 MD 21046 Columbia (Maryland) USA

Composición
BACILLUS THURINGIENSIS AIZAWAI 50% [WG] P/P

Envases
Bolsas de 1 kg. Bolsas de 1 Kg con caja de cartón exterior.

Usos y Dosis Autorizados						
USO	AGENTE	Dosis	Nº Aplic.	Intervalos	Vol. Caldo	Condic. Especifico
Acelga	Pirálidos, Pyralidae	1 - 2 Kg/ha	2-4	Ver cond. esp.	500-1000 l/ha	Incluye aire libre e invernadero. Eficaz contra Pyralidae (Ostrinia spp.) Aplicar desde la 2a hoja verdadera del tallo principal, desplegada hasta la madurez completa (BBCH 12-89) El intervalo mínimo entre aplicaciones es de 7 días. 4 semanas de pulverización, seguidas de un periodo de 4 semanas sin pulverización.
Alcachofa	Barrenador de la alcachofa, Gortyna xanthenes Mariposas de la col, Pieris spp.	Noctuidos, Noctuidae	1 - 2 Kg/ha	2-4	Ver cond. esp.	1000 l/ha Al aire libre Aplicar desde la 2a hoja verdadera desplegada hasta la madurez completa (BBCH 12-89) El intervalo mínimo entre aplicaciones es de 7 días. 4 semanas de pulverización, seguidas de un periodo de 4 semanas sin pulverización.
Algodonero	Noctuidos, Noctuidae	1,2 - 2 Kg/ha	2-4	Ver cond. esp.	500-800 l/ha	Eficaz contra Heliothis armigera. Aplicar desde la 2a hoja, desplegada hasta que la mayoría de las cápsulas están abiertas (BBCH 12-89). El intervalo mínimo entre aplicaciones es de 7 días. 4 semanas de pulverización, seguidas de un periodo de 4 semanas sin pulverización.
	Pirálidos, Pyralidae					Incluye aire libre e invernadero. Eficaz contra Pyralidae (Ostrinia spp.) Aplicar desde la 2a hoja verdadera del tallo principal, desplegada hasta la madurez completa (BBCH 12-89) El intervalo mínimo entre aplicaciones es de 7 días. 4 semanas de pulverización, seguidas de un periodo de 4 semanas sin pulverización.
	Noctuidos, Noctuidae					

Berenjena	Polilla del tomate, Tuta absoluta	1 - 2 Kg/ha	2-4	Ver cond. esp.	500-1000 l/ha	Incluye aire libre e invernadero. Aplicar desde la 2a hoja verdadera del tallo principal, desplegada hasta la madurez completa (BBCH 12-89) El intervalo mínimo entre aplicaciones es de 7 días. 4 semanas de pulverización, seguidas de un periodo de 4 semanas sin pulverización.
Cítricos	Prays, polilla de los cítricos, Prays citri	1 - 2 Kg/ha	2-3	Ver cond. esp.	1000-1500 l/ha	Incluye limonero, naranjo y mandarino. Aplicar de 2 a 3 veces al año desde que la mayoría de los pétalos están caídos hasta que los frutos tienen sabor varietal y firmeza típicos (BBCH 67-89) El intervalo mínimo entre aplicaciones es de 7 días. 3 semanas de pulverización, seguidas de un periodo de 3 semanas sin pulverización.
Colza	Mariposas de la col, Pieris spp.	1 - 2 Kg/ha	2-4	Ver cond. esp.	1000 l/ha	Al aire libre Aplicar desde la 2a hoja verdadera desplegada hasta la madurez completa (BBCH 12-89) El intervalo mínimo entre aplicaciones es de 7 días. 4 semanas de pulverización, seguidas de un periodo de 4 semanas sin pulverización.
	Noctuidos, Noctuidae					Al aire libre. Eficaz contra Ostrinia nubilalis.
	Pirálidos, Pyralidae					Aplicar desde la 2a hoja verdadera desplegada hasta la madurez completa (BBCH 12-89) El intervalo mínimo entre aplicaciones es de 7 días. 4 semanas de pulverización, seguidas de un periodo de 4 semanas sin pulverización.
Cucurbitáceas	Noctuidos, Noctuidae	1 - 2 Kg/ha	2-4	Ver cond. esp.	500-1000 l/ha	Incluye melón, sandía, calabacín, pepino y calabaza al aire libre e invernadero. Eficaz contra Mamestra brassicae, Autographa gamma, Spodopetera littoralis, Heliotis armigera. Aplicar desde la 2a hoja verdadera del tallo principal, desplegada hasta la madurez completa (BBCH 12-89) El intervalo mínimo entre aplicaciones es de 7 días. 4 semanas de pulverización, seguidas de un periodo de 4 semanas sin pulverización.
	Mariposas de la col, Pieris spp.					Incluye melón, sandía, calabacín, pepino y calabaza al aire libre e invernadero. Aplicar desde la 2a hoja verdadera del tallo principal, desplegada hasta la madurez completa (BBCH 12-89) El intervalo mínimo entre aplicaciones es de 7 días. 4 semanas de pulverización, seguidas de un periodo de 4 semanas sin pulverización.
	Mariposas de la col, Pieris spp.					
Espinaca	Noctuidos, Noctuidae	1 - 2 Kg/ha	2-4	Ver cond. esp.	500-1000 l/ha	Aire libre e invernadero. Aplicar desde la 2a hoja verdadera desplegada hasta la madurez completa (BBCH 12-89) El intervalo mínimo entre aplicaciones es de 7 días. 4 semanas de pulverización, seguidas de un periodo de 4 semanas sin pulverización.
Forestales y ornamentales leñosas	Procesionaria, Thaumetopoea spp.	1 - 2 Kg/ha	2-3	Ver cond. esp.	1000-1500 l/ha	Exclusivamente Pinus spp, Fir-tree Aplicar a un BBCH 12-89 El intervalo mínimo entre aplicaciones es de 7 días. 3 semanas de pulverización, seguidas de un periodo de 3 semanas sin pulverización.
	Lagartas, Lymantria spp.					Exclusivamente Pinus spp, Fir-tree, Populus spp. Exclusivamente contra Lymantria monacha. Aplicar a un BBCH 12-89 El intervalo mínimo entre aplicaciones es de 7 días. 3 semanas de pulverización, seguidas de un periodo de 3 semanas sin pulverización.
Fresal	Heliothis, Helicoverpa spp.	1 - 2 Kg/ha	2-4	Ver cond. esp.	500-1000 l/ha	Incluye aire libre e invernadero.
	Noctuidos, Noctuidae					Aplicar desde 2 hojas, desplegadas hasta la segunda cosecha (BBCH 12-89)
	Orugas de la piel, Pandemis spp.					El intervalo mínimo entre aplicaciones es de 7 días. 4 semanas de pulverización, seguidas de un periodo de 4 semanas sin pulverización.
	Polilla arrolladora, Argyrotaenia ljugiana					
	Rosquilla negra, Spodoptera littoralis					
	Rosquilla verde, Spodoptera exigua					
	Arañuelo, oruga hilandera, Yponomeuta spp.					
	Falena invernol, Operophtera brumata					
	Minadora de los brotes y frutos, Anarsia lineatella					
	Polilla oriental, Grapholita molesta					

 GOBIERNO DE ESPAÑA		MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN		ES-00045 TUREX 50 WG		SECRETARIA GENERAL DE RECURSOS AGRARIOS Y SEGURIDAD ALIMENTARIA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD DE LA PRODUCCIÓN AGROALIMENTARIA Y BIENESTAR ANIMAL
Frutales de hueso	Viejecita, Orgyia antiqua	1 - 2 Kg/ha	2-3	Ver cond. esp.	1000-1500 l/ha	Incluye albaricoque, cerezo, ciruelo, endrino, melocotón y nectarino. Aplicar de 2 a 3 veces al año desde que la mayoría de los pétalos están caídos hasta que los frutos tienen sabor varietal y firmeza típicos (BBCH 67-89) El intervalo mínimo entre aplicaciones es de 7 días. 3 semanas de pulverización, seguidas de un periodo de 3 semanas sin pulverización. En el caso del endrino únicamente para tratamientos a plantaciones comerciales.
Frutales de pepita	Arañuelo, oruga hilandera, Yponomeuta spp. Arrollador, cigarrero, Archips spp. Carpocapsa de manzanas y peras, Cydia pomonella Falena invernall, Operophtera brumata Noctuidos, Noctuidae Orugas de la piel, Pandemis spp. Polilla arrolladora, Argyrotaenia ljungiana	1 - 2 Kg/ha	2-3	Ver cond. esp.	1000-1500 l/ha	Incluye manzano y peral. Aplicar de 2 a 3 veces al año desde la apertura de las yemas hasta la madurez completa (BBCH 53-99) El intervalo mínimo entre aplicaciones es de 7 días. 3 semanas de pulverización, seguidas de un periodo de 3 semanas sin pulverización.
	Mariposas de la col, Pieris spp. Noctuidos, Noctuidae					
Haba para grano	Pirálidos, Pyralidae	1 - 2 Kg/ha	2-4	Ver cond. esp.	1000 l/ha	Al aire libre Aplicar desde la 2a hoja verdadera desplegada hasta la madurez completa (BBCH 12-89) El intervalo mínimo entre aplicaciones es de 7 días. 4 semanas de pulverización, seguidas de un periodo de 4 semanas sin pulverización. Al aire libre. Eficaz contra Ostrinia nubilalis. Aplicar desde la 2a hoja verdadera desplegada hasta la madurez completa (BBCH 12-89) El intervalo mínimo entre aplicaciones es de 7 días. 4 semanas de pulverización, seguidas de un periodo de 4 semanas sin pulverización.
	Mariposas de la col, Pieris spp. Noctuidos, Noctuidae	1 - 2 Kg/ha	2-4	Ver cond. esp.	1000 l/ha	Al aire libre Aplicar desde la 2a hoja verdadera desplegada hasta la madurez completa (BBCH 12-89) El intervalo mínimo entre aplicaciones es de 7 días. 4 semanas de pulverización, seguidas de un periodo de 4 semanas sin pulverización. Al aire libre. Eficaz contra Ostrinia nubilalis. Aplicar desde la 2a hoja verdadera desplegada hasta la madurez completa (BBCH 12-89) El intervalo mínimo entre aplicaciones es de 7 días. 4 semanas de pulverización, seguidas de un periodo de 4 semanas sin pulverización.
Haba verde	Pirálidos, Pyralidae					
Hierbas aromáticas y flores comestibles	Mariposas de la col, Pieris spp.	1 - 2 Kg/ha	2-4	Ver cond. esp.	500-1000 l/ha	Exclusivamente apio, perejil, eneldo, hierbas frescas, al aire libre e invernadero. Aplicar desde la 2a hoja verdadera desplegada hasta la madurez completa (BBCH 12-89) El intervalo mínimo entre aplicaciones es de 7 días. 4 semanas de pulverización, seguidas de un periodo de 4 semanas sin pulverización.
	Noctuidos, Noctuidae					
Hortalizas del género Brassica	Mariposas de la col, Pieris spp.	0,5 - 1 Kg/ha	2-4	Ver cond. esp.	500-1000 l/ha	Incluye aire libre e invernadero. Aplicar desde la 2a hoja verdadera desplegada hasta la madurez completa (BBCH 12-89) El intervalo mínimo entre aplicaciones es de 7 días. 4 semanas de pulverización, seguidas de un periodo de 4 semanas sin pulverización.
	Noctuidos, Noctuidae	1 - 2 Kg/ha				
Judía para grano	Mariposas de la col, Pieris spp. Noctuidos, Noctuidae	1 - 2 Kg/ha	2-4	Ver cond. esp.	1000 l/ha	Al aire libre Aplicar desde la 2a hoja verdadera desplegada hasta la madurez completa (BBCH 12-89) El intervalo mínimo entre aplicaciones es de 7 días. 4 semanas de pulverización, seguidas de un periodo de 4 semanas sin pulverización. Al aire libre. Eficaz contra Ostrinia nubilalis. Aplicar desde la 2a hoja verdadera desplegada hasta la madurez completa (BBCH 12-89) El intervalo mínimo entre aplicaciones es de 7 días. 4 semanas de pulverización, seguidas de un periodo de 4 semanas sin pulverización.
	Pirálidos, Pyralidae					
	Mariposas de la col, Pieris spp.					

	Noctuidos, Noctuidae					Al aire libre Aplicar desde la 2a hoja verdadera desplegada hasta la madurez completa (BBCH 12-89) El intervalo mínimo entre aplicaciones es de 7 días. 4 semanas de pulverización, seguidas de un periodo de 4 semanas sin pulverización.
Judía verde	Pirálidos, Pyralidae	1 - 2 Kg/ha	2-4	Ver cond. esp.	1000 l/ha	Al aire libre. Eficaz contra Ostrinia nubilalis. Aplicar desde la 2a hoja verdadera desplegada hasta la madurez completa (BBCH 12-89) El intervalo mínimo entre aplicaciones es de 7 días. 4 semanas de pulverización, seguidas de un periodo de 4 semanas sin pulverización.
Kiwi	Polilla arrolladora, Argyrotaenia ljugiana	1 - 2 Kg/ha	2-3	Ver cond. esp.	1000-1500 l/ha	Aplicar de 2 a 3 veces al año desde que la mayoría de los pétalos están caídos hasta que los frutos tienen sabor varietal y firmeza típicos (BBCH 67-89) El intervalo mínimo entre aplicaciones es de 7 días. 3 semanas de pulverización, seguidas de un periodo de 3 semanas sin pulverización.
Lechuga y similares	Mariposas de la col, Pieris spp. Noctuidos, Noctuidae	1 - 2 Kg/ha	2-4	Ver cond. esp.	500-1000 l/ha	Exclusivamente lechuga, achicoria y rúcula al aire libre e invernadero. Aplicar desde la 2a hoja verdadera desplegada hasta la madurez completa (BBCH 12-89) El intervalo mínimo entre aplicaciones es de 7 días. 4 semanas de pulverización, seguidas de un periodo de 4 semanas sin pulverización.
Maíz	Piral del maíz, O.nubilalis	1 - 2 Kg/ha	2-4	Ver cond. esp.	1000 l/ha	Aplicar desde la 2a hoja desplegada hasta la madurez completa (BBCH 12-89) El intervalo mínimo entre aplicaciones es de 7 días. 4 semanas de pulverización, seguidas de un periodo de 4 semanas sin pulverización.
Nabo	Mariposas de la col, Pieris spp.	1 - 2 Kg/ha	2-4	Ver cond. esp.	500-1000 l/ha	Incluye aire libre e invernadero. Aplicar desde la 2a hoja verdadera desplegada hasta la madurez completa (BBCH 12-89) El intervalo mínimo entre aplicaciones es de 7 días. 4 semanas de pulverización, seguidas de un periodo de 4 semanas sin pulverización.
Olivo	Prays, polilla del olivo, Prays oleae	1 - 2 Kg/ha	2-3	Ver cond. esp.	500-1000 l/ha	Aplicar de 2 a 3 veces al año desde el fin de la floración hasta que los frutos son aptos para la extracción de aceite (BBCH 69-89) El intervalo mínimo entre aplicaciones es de 7 días. 3 semanas de pulverización, seguidas de un periodo de 3 semanas sin pulverización.
Ornamentales herbáceas	Mariposas de la col, Pieris spp. Noctuidos, Noctuidae	1 - 2 Kg/ha	2-4	Ver cond. esp.	1000 l/ha	Exclusivamente especies florales. Incluye Lysiantus spp., Tulipán, Fresa spp., Lilium spp, clavel, gerbera, rosa, Cacoecimorpha pronubana ed Epichoristodes acerbella al aire libre Aplicar a un BBCH 12-89 El intervalo mínimo entre aplicaciones es de 7 días. 4 semanas de pulverización, seguidas de un periodo de 4 semanas sin pulverización.
Patata	Mariposas de la col, Pieris spp. Noctuidos, Noctuidae Polilla de la patata, Phthorimaea operculella	1 - 2 Kg/ha	2-4	Ver cond. esp.	1000 l/ha	Al aire libre Aplicar desde la 2a hoja del tallo principal desplegada hasta la madurez completa (BBCH 12-89) El intervalo mínimo entre aplicaciones es de 7 días. 4 semanas de pulverización, seguidas de un periodo de 4 semanas sin pulverización.
Pimiento	Pirálidos, Pyralidae Noctuidos, Noctuidae	1 - 2 Kg/ha	2-4	Ver cond. esp.	500-1000 l/ha	Incluye aire libre e invernadero. Eficaz contra Pyralidae (Ostrinia spp.) Aplicar desde la 2a hoja verdadera del tallo principal, desplegada hasta la madurez completa (BBCH 12-89) El intervalo mínimo entre aplicaciones es de 7 días. 4 semanas de pulverización, seguidas de un periodo de 4 semanas sin pulverización. Incluye aire libre e invernadero. Aplicar desde la 2a hoja verdadera del tallo principal, desplegada hasta la madurez completa (BBCH 12-89) El intervalo mínimo entre aplicaciones es de 7 días. 4 semanas de pulverización, seguidas de un periodo de 4 semanas sin pulverización.
Rábano	Mariposas de la col, Pieris spp.	1 - 2 Kg/ha	2-4	Ver cond. esp.	500-1000 l/ha	Incluye aire libre e invernadero. Aplicar desde la 2a hoja verdadera desplegada hasta la madurez completa (BBCH 12-89) El intervalo mínimo entre aplicaciones es de 7 días. 4 semanas de pulverización, seguidas de un periodo de 4 semanas sin pulverización.
Remolacha azucarera	Noctuidos, Noctuidae	1 - 2 Kg/ha	2-4	Ver cond. esp.	1000 l/ha	Al aire libre Aplicar desde 1er par de hojas desplegadas hasta la madurez completa (BBCH 12-89) El intervalo mínimo entre aplicaciones es de 7 días. 4 semanas de pulverización, seguidas de un periodo de 4 semanas sin pulverización.
Remolacha forrajera	Noctuidos, Noctuidae	1 - 2 Kg/ha	2-4	Ver cond. esp.	1000 l/ha	Al aire libre Aplicar desde 1er par de hojas desplegadas hasta la madurez completa (BBCH 12-89) El intervalo mínimo entre aplicaciones es de 7 días. 4 semanas de pulverización, seguidas de un periodo de 4 semanas sin pulverización.
Tabaco	Noctuidos, Noctuidae	1 - 2 Kg/ha	2-4	Ver cond. esp.	1000 l/ha	Al aire libre Aplicar desde 1er par de hojas desplegadas hasta la madurez completa (BBCH 12-89) El intervalo mínimo entre aplicaciones es de 7 días. 4 semanas de pulverización, seguidas de un periodo de 4 semanas sin pulverización.

