

Albaricoquero	Minadora de los brotes y frutos, Anarsia lineatella	0,1 - 0,13 Kg/Hl	Realizar un máximo de 2-3 aplicaciones mediante pulverización con tractor o manual por campaña con un intervalo entre las mismas de 7 días (3 semanas de pulverización, seguidas de un período de 3 semanas sin pulverización) desde BBCH 67 (flores marchitándose) hasta BBCH 89 (madurez de consumo). Emplear un volumen de caldo de 1.000-1.500 l/ha.
Alcachofa	Noctuidos, Noctuidae	1 - 2 Kg/ha	Realizar un máximo de 2-4 aplicaciones mediante pulverización con tractor o manual (aire libre) por campaña con un intervalo entre las mismas de 7 días (4 semanas de pulverización, seguidas de un período de 4 semanas sin pulverización) desde BBCH 12 (2a hoja verdadera desplegada) hasta BBCH 89 (madurez completa). Emplear un volumen de caldo de 1.000 l/ha. Exclusivamente contra Gortyna xanthenes, Mamestra brassicae, Autographa gamma, Spodoptera littoralis y Helicoverpa armigera.
	Depressaria spp.		
	Mariposas de la col, Pieris spp.		
Alcachofa	Piral del maíz, O.nubialis	1 - 2 Kg/ha	Realizar un máximo de 2-4 aplicaciones mediante pulverización con tractor o manual (aire libre) por campaña con un intervalo entre las mismas de 7 días (4 semanas de pulverización, seguidas de un período de 4 semanas sin pulverización) desde BBCH 12 (2a hoja verdadera desplegada) hasta BBCH 89 (madurez completa). Emplear un volumen de caldo de 1.000 l/ha.
Algodonero	Gusano rosado del algodón, Pectinophora gossypiella	1,5 - 2 Kg/ha	Realizar un máximo de 2-4 aplicaciones mediante pulverización con tractor o manual (aire libre) por campaña con un intervalo entre las mismas de 7 días (4 semanas de pulverización, seguidas de un período de 4 semanas sin pulverización) desde BBCH 12 (2a hoja verdadera desplegada) hasta BBCH 89 (madurez completa). Emplear un volumen de caldo de 1.000 l/ha.
	Noctuidos, Noctuidae		
Apio	Depressaria spp.	1 - 2 Kg/ha	(aire libre e invernadero): Realizar un máximo de 2-4 aplicaciones mediante pulverización con tractor o manual (aire libre) o manual (invernadero) por campaña con un intervalo entre las mismas de 7 días (4 semanas de pulverización, seguidas de un período de 4 semanas sin pulverización) desde BBCH 12 (2a hoja verdadera desplegada) hasta BBCH 89 (madurez completa). Emplear un volumen de caldo de 500-1.000 l/ha.
	Mariposas de la col, Pieris spp.		
Apio	Noctuidos, Noctuidae	1 - 2 Kg/ha	
Berenjena	Noctuidos, Noctuidae	1 - 2 Kg/ha	(aire libre e invernadero): Realizar un máximo de 2-4 aplicaciones mediante pulverización con tractor o manual (aire libre) o manual (invernadero) por campaña con un intervalo entre las mismas de 7 días (4 semanas de pulverización, seguidas de un período de 4 semanas sin pulverización) desde BBCH 12 (2a hoja verdadera desplegada) hasta BBCH 89 (madurez completa). Emplear un volumen de caldo de 500-1.000 l/ha.
	Polilla del tomate, Tuta absoluta		
Cardo	Depressaria spp.	1,5 - 2 Kg/ha	(aire libre e invernadero): Realizar un máximo de 2-4 aplicaciones mediante pulverización con tractor o manual (aire libre) o manual (invernadero) por campaña con un intervalo entre las mismas de 7 días (4 semanas de pulverización, seguidas de un período de 4 semanas sin pulverización) desde BBCH 12 (2a hoja verdadera desplegada) hasta BBCH 89 (madurez completa). Emplear un volumen de caldo de 500-1.000 l/ha.
	Mariposas de la col, Pieris spp.		
Cardo	Noctuidos, Noctuidae	1,5 - 2 Kg/ha	
Cerezo	Arañuelo, oruga hilandera, Yponomeuta spp.	0,1 - 0,13 Kg/Hl	Realizar un máximo de 2-3 aplicaciones mediante pulverización con tractor o manual por campaña con un intervalo entre las mismas de 7 días (3 semanas de pulverización, seguidas de un período de 3 semanas sin pulverización) desde BBCH 67 (flores marchitándose) hasta BBCH 89 (madurez de consumo). Emplear un volumen de caldo de 1.000-1.500 l/ha.
	Falena invernol, Operophtera brumata		
Cerezo	Lagartas, Lymantria spp.	0,1 - 0,13 Kg/Hl	Realizar un máximo de 2-3 aplicaciones mediante pulverización con tractor o manual por campaña con un intervalo entre las mismas de 7 días (3 semanas de pulverización, seguidas de un período de 3 semanas sin pulverización) desde BBCH 67 (flores marchitándose) hasta BBCH 89 (madurez de consumo). Emplear un volumen de caldo de 1.000-1.500 l/ha.
	Minadora de los brotes y frutos, Anarsia lineatella		
Ciruelo	Arañuelo, oruga hilandera, Yponomeuta spp.	0,1 - 0,13 Kg/Hl	Realizar un máximo de 2-3 aplicaciones mediante pulverización con tractor o manual por campaña con un intervalo entre las mismas de 7 días (3 semanas de pulverización, seguidas de un período de 3 semanas sin pulverización) desde BBCH 67 (flores marchitándose) hasta BBCH 89 (madurez de consumo). Emplear un volumen de caldo de 1.000-1.500 l/ha.
	Falena invernol, Operophtera brumata		
Ciruelo	Lagartas, Lymantria spp.	0,1 - 0,13 Kg/Hl	Realizar un máximo de 2-3 aplicaciones mediante pulverización con tractor o manual por campaña con un intervalo entre las mismas de 7 días (3 semanas de pulverización, seguidas de un período de 3 semanas sin pulverización) desde BBCH 67 (flores marchitándose) hasta BBCH 89 (madurez de consumo). Emplear un volumen de caldo de 1.000-1.500 l/ha.
	Minadora de los brotes y frutos, Anarsia lineatella		



GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

19430

TUREX

SECRETARIA GENERAL DE RECURSOS AGRARIOS Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD DE LA PRODUCCIÓN AGROALIMENTARIA Y BIENESTAR ANIMAL

Colza	Depressaria spp. Mariposas de la col, Pieris spp. Noctuidos, Noctuidae			Realizar un máximo de 2-4 aplicaciones mediante pulverización con tractor o manual (aire libre) por campaña con un intervalo entre las mismas de 7 días (4 semanas de pulverización, seguidas de un período de 4 semanas sin pulverización) desde BBCH 12 (2a hoja verdadera desplegada) hasta BBCH 89 (madurez completa). Emplear un volumen de caldo de 1.000 l/ha.
	Piral del maíz, O.nubilalis	1 - 2 Kg/ha		
Cucurbitáceas	Mariposas de la col, Pieris spp.			
	Noctuidos, Noctuidae	1,5 - 2 Kg/ha		(Uso en sandía, melón, calabacín, calabaza, pepino aire libre e invernadero): Realizar un máximo de 2-4 aplicaciones mediante pulverización con tractor o manual (aire libre) o manual (invernadero) por campaña con un intervalo entre las mismas de 7 días (4 semanas de pulverización, seguidas de un período de 4 semanas sin pulverización) desde BBCH 12 (2a hoja verdadera desplegada) hasta BBCH 89 (madurez completa). Emplear un volumen de caldo de 500-1.000 l/ha.
Endrino	Arañuelo, oruga hilandera, Yponomeuta spp. Falena invernal, Operophtera brumata Lagartas, Lymantria spp.			
	Minadora de los brotes y frutos, Anarsia lineatella	0,1 - 0,13 Kg/Hl		Únicamente para tratamientos a plantaciones comerciales. Realizar un máximo de 2-3 aplicaciones mediante pulverización con tractor o manual por campaña con un intervalo entre las mismas de 7 días (3 semanas de pulverización, seguidas de un período de 3 semanas sin pulverización) desde BBCH 67 (flores marchitándose) hasta BBCH 89 (madurez de consumo). Emplear un volumen de caldo de 1.000-1.500 l/ha.
Espinaca	Depressaria spp. Mariposas de la col, Pieris spp.			
	Noctuidos, Noctuidae	1 - 2 Kg/ha		(aire libre e invernadero): Realizar un máximo de 2-4 aplicaciones mediante pulverización con tractor o manual (aire libre) o manual (invernadero) por campaña con un intervalo entre las mismas de 7 días (4 semanas de pulverización, seguidas de un período de 4 semanas sin pulverización) desde BBCH 12 (2a hoja verdadera desplegada) hasta BBCH 89 (madurez completa). Emplear un volumen de caldo de 500-1.000 l/ha.
Fresal	Heliothis, Helicoverpa spp. Orugas de la piel, Pandemis spp. Polilla arrolladora, Argyrotaenia ljungiana Rosquilla negra, Spodoptera littoralis			
	Rosquilla verde, Spodoptera exigua	1,5 - 2 Kg/ha		(aire libre e invernadero): Realizar un máximo de 2-4 aplicaciones mediante pulverización con tractor o manual (aire libre) o manual (invernadero) por campaña con un intervalo entre las mismas de 7 días (4 semanas de pulverización, seguidas de un período de 4 semanas sin pulverización) desde BBCH 12 (2 hojas desplegadas) hasta BBCH 89 (segunda cosecha). Emplear un volumen de caldo de 500-1.000 l/ha.
Haba para grano	Depressaria spp. Mariposas de la col, Pieris spp. Noctuidos, Noctuidae			
	Piral del maíz, O.nubilalis	1 - 2 Kg/ha		Realizar un máximo de 2-4 aplicaciones mediante pulverización con tractor o manual (aire libre) por campaña con un intervalo entre las mismas de 7 días (4 semanas de pulverización, seguidas de un período de 4 semanas sin pulverización) desde BBCH 12 (2a hoja verdadera desplegada) hasta BBCH 89 (madurez completa). Emplear un volumen de caldo de 1.000 l/ha.
	Noctuidos, Noctuidae			Realizar un máximo de 2-4 aplicaciones mediante pulverización con tractor o manual (aire libre) por campaña con un intervalo entre las mismas de 7 días (4 semanas de pulverización, seguidas de un período de 4 semanas sin pulverización) desde BBCH 12 (2a hoja verdadera desplegada) hasta BBCH 89 (madurez completa). Emplear un volumen de caldo de 1.000 l/ha. Exclusivamente contra: Mamestra brassicae, Autographa gamma, Spodoptera littoralis, Helicoverpa armigera.
	Depressaria spp. Mariposas de la col, Pieris spp.			



GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

19430
TUREX

SECRETARIA GENERAL DE RECURSOS AGRARIOS Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD DE LA PRODUCCIÓN AGROALIMENTARIA Y BIENESTAR ANIMAL

Haba verde	Piral del maíz, O.nubilalis	1 - 2 Kg/ha	Realizar un máximo de 2-4 aplicaciones mediante pulverización con tractor o manual (aire libre) por campaña con un intervalo entre las mismas de 7 días (4 semanas de pulverización, seguidas de un período de 4 semanas sin pulverización) desde BBCH 12 (2a hoja verdadera desplegada) hasta BBCH 89 (madurez completa). Emplear un volumen de caldo de 1.000 l/ha.
	Noctuidos, Noctuidae		(Para albahaca, perejil, hierbas frescas y eneldo aire libre e invernadero): Realizar un máximo de 2-4 aplicaciones mediante pulverización con tractor o manual (aire libre) o manual (invernadero) por campaña con un intervalo entre las mismas de 7 días (4 semanas de pulverización, seguidas de un período de 4 semanas sin pulverización) desde BBCH 12 (2a hoja verdadera desplegada) hasta BBCH 89 (madurez completa). Emplear un volumen de caldo de 500-1.000 l/ha. En albahaca unicamente contra Spodoptera exigua y Spodoptera littoralis.
	Depressaria spp.		
	Mariposas de la col, Pieris spp.		(Para perejil, hierbas frescas y eneldo aire libre e invernadero): Realizar un máximo de 2-4 aplicaciones mediante pulverización con tractor o manual (aire libre) o manual (invernadero) por campaña con un intervalo entre las mismas de 7 días (4 semanas de pulverización, seguidas de un período de 4 semanas sin pulverización) desde BBCH 12 (2a hoja verdadera desplegada) hasta BBCH 89 (madurez completa). Emplear un volumen de caldo de 500-1.000 l/ha.
	Hierbas aromáticas y flores comestibles	Piral del maíz, O.nubilalis	1,5 - 2 Kg/ha
	Depressaria spp.		
	Mariposas de la col, Pieris spp.		
	Noctuidos, Noctuidae	1,5 - 2 Kg/ha	Para la producción de hojas para el consumo. Realizar un máximo de 2-4 aplicaciones mediante pulverización con tractor o manual (aire libre) o manual (invernadero) por campaña con un intervalo entre las mismas de 7 días (4 semanas de pulverización, seguidas de un período de 4 semanas sin pulverización) desde BBCH 12 (2a hoja verdadera desplegada) hasta BBCH 89 (madurez completa). Emplear un volumen de caldo de 500-1.000 l/ha.
	Mariposas de la col, Pieris spp.	0,5 - 1 Kg/ha	
	Noctuidos, Noctuidae	1 - 2 Kg/ha	(aire libre e invernadero): Realizar un máximo de 2-4 aplicaciones mediante pulverización con tractor o manual (aire libre) o manual (invernadero) por campaña con un intervalo entre las mismas de 7 días (4 semanas de pulverización, seguidas de un período de 4 semanas sin pulverización) desde BBCH 12 (2a hoja verdadera desplegada) hasta BBCH 89 (madurez completa). Emplear un volumen de caldo de 500-1.000 l/ha.
	Depressaria spp.		
	Mariposas de la col, Pieris spp.		
	Noctuidos, Noctuidae		
	Judía para grano	Piral del maíz, O.nubilalis	1 - 2 Kg/ha
	Depressaria spp.		
	Mariposas de la col, Pieris spp.		Realizar un máximo de 2-4 aplicaciones mediante pulverización con tractor o manual (aire libre) por campaña con un intervalo entre las mismas de 7 días (4 semanas de pulverización, seguidas de un período de 4 semanas sin pulverización) desde BBCH 12 (2a hoja verdadera desplegada) hasta BBCH 89 (madurez completa). Emplear un volumen de caldo de 1.000 l/ha. Exclusivamente contra contra Helicoverpa armigera.
	Noctuidos, Noctuidae		
	Judía verde	Piral del maíz, O.nubilalis	1 - 2 Kg/ha
Kiwi	Polilla arrolladora, Argyrotaenia ljugiana	0,1 - 0,13 Kg/Hl	Realizar un máximo de 2-3 aplicaciones mediante pulverización con tractor o manual por campaña con un intervalo entre las mismas de 7 días (3 semanas de pulverización, seguidas de un período de 3 semanas sin pulverización) desde BBCH 67 (flores marchitándose) hasta BBCH 89 (madurez de consumo). Emplear un volumen de caldo de 1.000-1.500 l/ha.
	Depressaria spp.		
	Mariposas de la col, Pieris spp.		



GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

19430
TUREX

SECRETARIA GENERAL DE RECURSOS AGRARIOS Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD DE LA PRODUCCIÓN AGROALIMENTARIA Y BIENESTAR ANIMAL

Lechuga y similares	Noctuidos, Noctuidae	1,5 - 2 Kg/ha	(aire libre e invernadero): Realizar un máximo de 2-4 aplicaciones mediante pulverización con tractor o manual (aire libre) o manual (invernadero) por campaña con un intervalo entre las mismas de 7 días (4 semanas de pulverización, seguidas de un período de 4 semanas sin pulverización) desde BBCH 12 (2a hoja verdadera desplegada) hasta BBCH 89 (madurez completa). Emplear un volumen de caldo de 500-1.000 l/ha.
Manzano	Noctuidos, Noctuidae	0,1 - 0,13 Kg/Hl	Exclusivamente contra Orthosia incerta. Realizar un máximo de 2-3 aplicaciones mediante pulverización con tractor o manual por campaña con un intervalo entre las mismas de 7 días (3 semanas de pulverización, seguidas de un período de 3 semanas sin pulverización) desde BBCH 53 (apertura de las yemas) hasta BBCH 99 (partes cosechadas). Emplear un volumen de caldo de 1.000-1.500 l/ha.
	Arañuelo, oruga hilandera, Yponomeuta spp. Falena invernol, Operophtera brumata Falena, Erannis defoliaria		
	Tortricidos, Tortricidae		
	Viejecita, Orgyia antiqua		Realizar un máximo de 2-3 aplicaciones mediante pulverización con tractor o manual por campaña con un intervalo entre las mismas de 7 días (3 semanas de pulverización, seguidas de un período de 3 semanas sin pulverización) desde BBCH 53 (apertura de las yemas) hasta BBCH 99 (partes cosechadas). Emplear un volumen de caldo de 1.000-1.500 l/ha.
Melocotonero	Arañuelo, oruga hilandera, Yponomeuta spp.	0,1 - 0,13 Kg/Hl	Incluye nectarino. Realizar un máximo de 2-3 aplicaciones mediante pulverización con tractor o manual por campaña con un intervalo entre las mismas de 7 días (3 semanas de pulverización, seguidas de un período de 3 semanas sin pulverización) desde BBCH 67 (flores marchitándose) hasta BBCH 89 (madurez de consumo). Emplear un volumen de caldo de 1.000-1.500 l/ha. Exclusivamente contra Yponomeuta padella.
	Minadora de los brotes y frutos, Anarsia lineatella		
	Falena invernol, Operophtera brumata		
	Viejecita, Orgyia antiqua		Incluye nectarino. Realizar un máximo de 2-3 aplicaciones mediante pulverización con tractor o manual por campaña con un intervalo entre las mismas de 7 días (3 semanas de pulverización, seguidas de un período de 3 semanas sin pulverización) desde BBCH 67 (flores marchitándose) hasta BBCH 89 (madurez de consumo). Emplear un volumen de caldo de 1.000-1.500 l/ha.
Nabo	Mariposas de la col, Pieris spp.	1,5 - 2 Kg/ha	(aire libre e invernadero): Realizar un máximo de 2-4 aplicaciones mediante pulverización con tractor o manual (aire libre) o manual (invernadero) por campaña con un intervalo entre las mismas de 7 días (4 semanas de pulverización, seguidas de un período de 4 semanas sin pulverización) desde BBCH 12 (2a hoja verdadera desplegada) hasta BBCH 89 (madurez completa). Emplear un volumen de caldo de 500-1.000 l/ha.
Olivo	Prays, polilla del olivo, Prays oleae	0,2 Kg/Hl	Realizar un máximo de 2-3 aplicaciones mediante pulverización con tractor o manual por campaña con un intervalo entre las mismas de 7 días (3 semanas de pulverización, seguidas de un período de 3 semanas sin pulverización) desde BBCH 69 (fin de la floración) hasta BBCH 89 (los frutos adquieren el color característico de la variedad). Emplear un volumen de caldo de 500-1.000 l/ha.
Ornamentales herbáceas	Depressaria spp. Mariposas de la col, Pieris spp.	0,1 - 0,2 Kg/Hl	(aire libre e invernadero): Para cultivos destinados a la producción de flor cortada. Realizar un máximo de 2-4 aplicaciones mediante pulverización con tractor o manual (aire libre) o manual (invernadero) por campaña con un intervalo entre las mismas de 7 días (4 semanas de pulverización, seguidas de un período de 4 semanas sin pulverización) desde BBCH 12 (2a hoja verdadera desplegada) hasta BBCH 89 (madurez completa). Emplear un volumen de caldo de 1.000 l/ha.
	Noctuidos, Noctuidae		
Patata	Depressaria spp. Mariposas de la col, Pieris spp. Noctuidos, Noctuidae	1 - 2 Kg/ha	Realizar un máximo de 2-4 aplicaciones mediante pulverización con tractor o manual (aire libre) por campaña con un intervalo entre las mismas de 7 días (4 semanas de pulverización, seguidas de un período de 4 semanas sin pulverización) desde BBCH 12 (2a hoja verdadera desplegada) hasta BBCH 89 (madurez completa). Emplear un volumen de caldo de 1.000 l/ha.
	Polilla de la patata, Phthorimaea operculella		
	Arañuelo, oruga hilandera, Yponomeuta spp. Falena invernol, Operophtera brumata Falena, Erannis defoliaria		



GOBIERNO DE ESPAÑA



MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

19430

TUREX

SECRETARIA GENERAL DE RECURSOS AGRARIOS Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD DE LA PRODUCCIÓN AGROALIMENTARIA Y BIENESTAR ANIMAL

Peral	Noctuidos, Noctuidae	Viejecita, Orgyia antiqua	0,1 - 0,13 Kg/Hl	Realizar un máximo de 2-3 aplicaciones mediante pulverización con tractor o manual por campaña con un intervalo entre las mismas de 7 días (3 semanas de pulverización, seguidas de un período de 3 semanas sin pulverización) desde BBCH 53 (apertura de las yemas) hasta BBCH 99 (partes cosechadas). Emplear un volumen de caldo de 1.000-1.500 l/ha.
	Tortricidos, Tortricidae			(aire libre e invernadero): Realizar un máximo de 2-4 aplicaciones mediante pulverización con tractor o manual (aire libre) o manual (invernadero) por campaña con un intervalo entre las mismas de 7 días (4 semanas de pulverización, seguidas de un período de 4 semanas sin pulverización) desde BBCH 12 (2a hoja verdadera desplegada) hasta BBCH 89 (madurez completa). Emplear un volumen de caldo de 500-1.000 l/ha.
Pimiento	Noctuidos, Noctuidae		1 - 2 Kg/ha	(aire libre e invernadero): Realizar un máximo de 2-4 aplicaciones mediante pulverización con tractor o manual (aire libre) o manual (invernadero) por campaña con un intervalo entre las mismas de 7 días (4 semanas de pulverización, seguidas de un período de 4 semanas sin pulverización) desde BBCH 12 (2a hoja verdadera desplegada) hasta BBCH 89 (madurez completa). Emplear un volumen de caldo de 500-1.000 l/ha.
Rábano	Mariposas de la col, Pieris spp.		1,5 - 2 Kg/ha	(aire libre e invernadero): Realizar un máximo de 2-4 aplicaciones mediante pulverización con tractor o manual (aire libre) o manual (invernadero) por campaña con un intervalo entre las mismas de 7 días (4 semanas de pulverización, seguidas de un período de 4 semanas sin pulverización) desde BBCH 12 (2a hoja verdadera desplegada) hasta BBCH 89 (madurez completa). Emplear un volumen de caldo de 500-1.000 l/ha.
Remolacha azucarera	Nóctua de la col, Mamestra brassicae	Plusia, Autographa gamma	1,5 - 2 Kg/ha	Realizar un máximo de 2-4 aplicaciones mediante pulverización con tractor o manual (aire libre) por campaña con un intervalo entre las mismas de 7 días (4 semanas de pulverización, seguidas de un período de 4 semanas sin pulverización) desde BBCH 12 (2a hoja verdadera desplegada) hasta BBCH 89 (madurez completa). Emplear un volumen de caldo de 1.000 l/ha.
Remolacha de mesa	Nóctua de la col, Mamestra brassicae	Plusia, Autographa gamma	1,5 - 2 Kg/ha	Realizar un máximo de 2-4 aplicaciones mediante pulverización con tractor o manual (aire libre) por campaña con un intervalo entre las mismas de 7 días (4 semanas de pulverización, seguidas de un período de 4 semanas sin pulverización) desde BBCH 12 (2a hoja verdadera desplegada) hasta BBCH 89 (madurez completa). Emplear un volumen de caldo de 1.000 l/ha.
Remolacha forrajera	Nóctua de la col, Mamestra brassicae	Plusia, Autographa gamma	1,5 - 2 Kg/ha	Realizar un máximo de 2-4 aplicaciones mediante pulverización con tractor o manual (aire libre) por campaña con un intervalo entre las mismas de 7 días (4 semanas de pulverización, seguidas de un período de 4 semanas sin pulverización) desde BBCH 12 (2a hoja verdadera desplegada) hasta BBCH 89 (madurez completa). Emplear un volumen de caldo de 1.000 l/ha.
Rúcula	Depressaria spp.	Mariposas de la col, Pieris spp.		(aire libre e invernadero): Realizar un máximo de 2-4 aplicaciones mediante pulverización con tractor o manual (aire libre) o manual (invernadero) por campaña con un intervalo entre las mismas de 7 días (4 semanas de pulverización, seguidas de un período de 4 semanas sin pulverización) desde BBCH 12 (2a hoja verdadera desplegada) hasta BBCH 89 (madurez completa). Emplear un volumen de caldo de 500-1.000 l/ha.
	Noctuidos, Noctuidae			
Tabaco	Gusano gris, Peridroma saucia	Nóctua de la col, Mamestra brassicae	1,5 - 2 Kg/ha	Realizar un máximo de 2-4 aplicaciones mediante pulverización con tractor o manual (aire libre) por campaña con un intervalo entre las mismas de 7 días (4 semanas de pulverización, seguidas de un período de 4 semanas sin pulverización) desde BBCH 12 (2a hoja verdadera desplegada) hasta BBCH 89 (madurez completa). Emplear un volumen de caldo de 1.000 l/ha.
Tomate	Noctuidos, Noctuidae	Polilla del tomate, Tuta absoluta	1 - 2 Kg/ha	(aire libre e invernadero): Realizar un máximo de 2-4 aplicaciones mediante pulverización con tractor o manual (aire libre) o manual (invernadero) por campaña con un intervalo entre las mismas de 7 días (4 semanas de pulverización, seguidas de un período de 4 semanas sin pulverización) desde BBCH 12 (2a hoja verdadera desplegada) hasta BBCH 89 (madurez completa). Emplear un volumen de caldo de 500-1.000 l/ha.
Valeriana	Depressaria spp.	Mariposas de la col, Pieris spp.		Realizar un máximo de 2-4 aplicaciones mediante pulverización con tractor o manual (aire libre) o manual (invernadero) por campaña con un intervalo entre las mismas de 7 días (4 semanas de pulverización, seguidas de un período de 4 semanas sin pulverización) desde BBCH 12 (2a hoja verdadera desplegada) hasta BBCH 89 (madurez completa). Emplear un volumen de caldo de 500-1.000 l/ha.
	Noctuidos, Noctuidae			
	Polilla de la vid, Eupoecilia ambiguella			

