

 GOBIERNO DE ESPAÑA		 MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN		25697		KARBICURE 85		SECRETARIA GENERAL DE RECURSOS AGRARIOS Y SEGURIDAD ALIMENTARIA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD DE LA PRODUCCIÓN AGROALIMENTARIA Y BIENESTAR ANIMAL	
	Oídio del rosal, Podosphaera pannosa							(Uso menor autorizado por procedimiento nacional). Aplicar entre BBCH 61-89. <u>Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*)</u> .	
Almendro	Antracnosis del fresón, Colletotrichum acutatum								
	Septoriosis, Septoria spp.	5 Kg/ha	1-3	7-10 días	500-1500 l/ha	[Uso secundario] (Uso menor autorizado por procedimiento nacional). Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*).			
Anacardiáceas	Oídios, Erysiphaceae	5 Kg/ha	1-3	7-10 días	1000-1500 l/ha	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional). Aplicar desde BBCH 61 (Comienzo de la floración: alrededor del 10% de las flores, abiertas) a BBCH 89 (madurez de consumo: Frutos tienen sabor varietal y firmeza típicos). Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*).			
Apio	Oídio de la zanahoria, Erysiphe heraclei	3 Kg/ha	1-5	7-10 días	200-1000 l/ha	Solo al aire libre. Aplicar desde BBCH 10 (la 1a hoja verdadera emerge del coleóptilo) hasta BBCH 87 (70% de los frutos maduros).			
Apionabo	Botrytis spp.	3 Kg/ha	1-5	7-10 días	500-1000 l/ha	Solo al aire libre. (Uso menor autorizado por procedimiento nacional). Aplicar desde BBCH 10 (cotiledones desplegados) hasta BBCH 87 (madurez frutos). Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*).			
Arbustos y pequeños árboles ornamentales	Oídios, Erysiphaceae	3 Kg/ha	1-6	7-10 días	500-2000 l/ha	Al aire libre e invernadero. Aplicar cuando el follaje es joven y maduro. Se incluye también el cultivo para la obtención de flor cortada, entre BBCH 10-87.			
Avellano	Monilia, Monilinia spp.								
	Oídio del avellano, Phyllactinia guttata	5 Kg/ha	1-3	7-10 días	500-1500 l/ha				
Berenjena	Botrytis spp.								
	Oídio, oidiopsis, Leveillula taurica	3 Kg/ha	1-8	7-10 días	200-1000 l/ha	Al aire libre e invernadero. Aplicar desde BBCH 10 (la 1a hoja verdadera emerge del coleóptilo) hasta BBCH 87 (70% de los frutos maduros).			
Berro de agua	Botrytis spp.								
	Oídio, Golovinomyces cichoracearum	3 Kg/ha	1-5	7-10 días	200-1000 l/ha	Solo al aire libre. Aplicar desde BBCH 10 (la 1a hoja verdadera emerge del coleóptilo) hasta BBCH 87 (70% de los frutos maduros).			
Berro, mastuerzo	Botrytis spp.								
	Oídio, Golovinomyces cichoracearum	3 Kg/ha	1-5	7-10 días	200-1000 l/ha	Al aire libre e invernadero. Aplicar desde BBCH 10 (la 1a hoja verdadera emerge del coleóptilo) hasta BBCH 87 (70% de los frutos maduros).			
Berza , col	Botrytis spp.	3 Kg/ha	1-5	7-10 días	200-1000 l/ha	Solo al aire libre. Aplicar desde BBCH 10 (la 1a hoja verdadera emerge del coleóptilo) hasta BBCH 87 (70% de los frutos maduros).			
Borraja	Oídio, Golovinomyces cichoracearum				500 - 1000	500-1000 l/ha			
	Botrytis spp.	3 Kg/ha	1-5	7-10 días	500-1000 l/ha	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional): aplicar desde BBCH 10 (cotiledones desplegados) hasta BBCH 87 (madurez frutos). Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*).			
Brécol	Botrytis spp.	3 Kg/ha	1-5	7-10 días	200-1000 l/ha	Solo al aire libre. Aplicar desde BBCH 10 (la 1a hoja verdadera emerge del coleóptilo) hasta BBCH 87 (70% de los frutos maduros).			
Calabacín	Oídio de las cucurbitáceas, Podosphaera xanthii								
	Oídio, Golovinomyces cichoracearum	3 Kg/ha	1-5	7-10 días	Aire libre: 200-500 l/ha Invernadero: 200-1000 l/ha	Al aire libre e invernadero. Aplicar desde BBCH 10 (la 1a hoja verdadera emerge del coleóptilo) hasta BBCH 87 (70% de los frutos maduros).			
Calabaza	Botrytis spp.		1-5	7-10 días	200-1000 l/ha	Solo al aire libre. Aplicar desde BBCH 10-89			
	Oídio de las cucurbitáceas, Podosphaera xanthii								
	Oídio, Golovinomyces cichoracearum	3 Kg/ha	1-8	7 días	600-1000 l/ha	Al aire libre e invernadero. Aplicar entre BBCH 10-89.			
Canónigo	Botrytis spp.	3 Kg/ha	1-5	7-10 días	500-1000 l/ha	Solo al aire libre. (Uso menor autorizado por procedimiento nacional). Aplicar desde BBCH 10 (cotiledones desplegados) hasta BBCH 87 (madurez frutos). Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*).			
Caqui	Botrytis spp.	5 Kg/ha	1-3	7-10 días	500-1500 l/ha				

 GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN			25697			KARBICURE 85			SECRETARIA GENERAL DE RECURSOS AGRARIOS Y SEGURIDAD ALIMENTARIA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD DE LA PRODUCCIÓN AGROALIMENTARIA Y BIENESTAR ANIMAL		
Cardo	Botrytis spp.		1-5	7-10 días	500-1000 l/ha	Solo al aire libre. (Uso menor autorizado por procedimiento nacional). Aplicar desde BBCH 10 (cotiledones desplegados) hasta BBCH 87 (madurez frutos). Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*).					
	Oídio, Golovinomyces cichoracearum	3 Kg/ha	1-8	7 días	600-1000 l/ha	Solo al aire libre. Uso menor. Aplicar entre BBCH 10-69.					
Cebolleta	Botrytis spp.										
	Oídios, Erysiphaceae	3 Kg/ha	1-5	7-10 días	200-1000 l/ha	Solo al aire libre. Aplicar desde BBCH 10 (la 1a hoja verdadera emerge del coleóptilo) hasta BBCH 87 (70% de los frutos maduros).					
Cerezo	Botrytis spp.										
	Monilia, Monilinia spp.										
Cerezo	Oídio del albaricoquero, Podosphaera tridactyla	5 Kg/ha	1-3	7-10 días	1000-1500 l/ha	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional). Aplicar desde BBCH 61 (Comienzo de la floración: alrededor del 10% de las flores, abiertas) a BBCH 89 (madurez de consumo: Frutos tienen sabor varietal y firmeza típicos). Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*).					
	Botrytis spp.										
Chalote	Oídios, Erysiphaceae	3 Kg/ha	1-5	7-10 días	200-1000 l/ha	Solo al aire libre. Aplicar desde BBCH 10 (la 1a hoja verdadera emerge del coleóptilo) hasta BBCH 87 (70% de los frutos maduros).					
	Botrytis spp.										
Chirimoyo	Oídios, Erysiphaceae	5 Kg/ha	1-3	7-10 días	1000-1500 l/ha	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional). Aplicar desde BBCH 61 (Comienzo de la floración: alrededor del 10% de las flores, abiertas) a BBCH 89 (madurez de consumo: Frutos tienen sabor varietal y firmeza típicos). Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*).					
	Botrytis spp.										
Chirivía	Oídio de la zanahoria, Erysiphe heraclei	3 Kg/ha	1-5	7-10 días	500-1000 l/ha	Solo al aire libre. (Uso menor autorizado por procedimiento nacional). Aplicar desde BBCH 10 (cotiledones desplegados) hasta BBCH 87 (madurez frutos). Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*).					
	Monilia, Monilinia spp.	5 Kg/ha	1-3	7-10 días	1000-1500 l/ha	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional). Aplicar desde BBCH 61 (Comienzo de la floración: alrededor del 10% de las flores, abiertas) a BBCH 89 (madurez de consumo: Frutos tienen sabor varietal y firmeza típicos). Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*).					
Col de Bruselas	Botrytis spp.	3 Kg/ha	1-5	7-10 días	200-1000 l/ha	Solo al aire libre. Aplicar desde BBCH 10 (la 1a hoja verdadera emerge del coleóptilo) hasta BBCH 87 (70% de los frutos maduros).					
Col de China	Botrytis spp.	3 Kg/ha	1-5	7-10 días	200-1000 l/ha	Solo al aire libre. Aplicar desde BBCH 10 (la 1a hoja verdadera emerge del coleóptilo) hasta BBCH 87 (70% de los frutos maduros).					
Coliflor	Botrytis spp.	3 Kg/ha	1-5	7-10 días	200-1000 l/ha	Solo al aire libre. Aplicar BBCH 10 (la 1a hoja verdadera emerge del coleóptilo) hasta BBCH 87 (70% de los frutos maduros).					
Colinabo	Botrytis spp.	3 Kg/ha	1-5	7-10 días	500-1000 l/ha	Solo al aire libre. (Uso menor autorizado por procedimiento nacional). Aplicar desde BBCH 10 (cotiledones desplegados) hasta BBCH 87 (madurez frutos). Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*).					
Colirrábano	Botrytis spp.	3 Kg/ha	1-5	7-10 días	200-1000 l/ha	Solo al aire libre. Aplicar desde BBCH 10 (la 1a hoja verdadera emerge del coleóptilo) hasta BBCH 87 (70% de los frutos maduros).					
Coníferas	Oídios, Erysiphaceae	3 Kg/ha	1-6	7-10 días	500-2000 l/ha	Al aire libre e invernadero. Aplicar cuando el follaje es joven y maduro.					
Endibia	Botrytis spp.										
	Oídio, Golovinomyces cichoracearum	3 Kg/ha	1-5	7-10 días	200-1000 l/ha	Al aire libre e invernadero. Aplicar desde BBCH 10 (la 1a hoja verdadera emerge del coleóptilo) hasta BBCH 87 (70% de los frutos maduros).					
Endrino	Monilia, Monilinia spp.	5 Kg/ha	1-3	7-10 días	1000-1500 l/ha	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional). Únicamente para tratamientos a plantaciones comerciales. Aplicar desde BBCH 61 (Comienzo de la floración: alrededor del 10% de las flores, abiertas) a BBCH 89 (madurez de consumo: Frutos tienen sabor varietal y firmeza típicos). Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*).					



GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

25697

KARBICURE 85

SECRETARIA GENERAL DE RECURSOS AGRARIOS Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD DE LA PRODUCCIÓN AGROALIMENTARIA Y BIENESTAR ANIMAL

	Botrytis spp.					
Escarola	Oídio, Golovinomyces cichoracearum	3 Kg/ha	1-5	7-10 días	200-1000 l/ha	Al aire libre e invernadero. Aplicar desde BBCH 10 (la 1a hoja verdadera emerge del coleóptilo) hasta BBCH 87 (70% de los frutos maduros).
	Botrytis spp.					
Espinaca	Oídio, Golovinomyces cichoracearum	3 Kg/ha	1-5	7-10 días	200-1000 l/ha	Al aire libre e invernadero. Aplicar desde BBCH 10 (la 1a hoja verdadera emerge del coleóptilo) hasta BBCH 87 (70% de los frutos maduros).
Frambueso	Oídio de la fresa, Podosphaera aphanis	3 - 5 Kg/ha	1-5	7-10 días	Aire libre: 500-1000 l/ha Invernadero: 200-1000 l/ha	Al aire libre e invernadero. Dosis en invernadero: 3 kg/ha. Aplicar entre BBCH 10-87.
Fresal	Oídio de la fresa, Podosphaera aphanis	3 Kg/ha	1-5	7-10 días	Aire libre: 200-500 l/ha Invernadero: 200-1000 l/ha	Al aire libre e invernadero. Aplicar entre BBCH 10-87.
Frondosas	Oídios, Erysiphaceae	3 Kg/ha	1-6	7-10 días	500-2000 l/ha	Al aire libre e invernadero. Aplicar cuando el follaje es joven y maduro.
	Botrytis spp.					
	Venturia spp.					Eficaz contra moteado (Venturia spp.)
Granado	Monilia, Monilinia spp.	5 Kg/ha	1-3	7-10 días	500-1500 l/ha	
Grosellero	Oídio del grosellero, Microsphaera grossulariae Oídio del grosellero, Podosphaera mors-uvae	5 Kg/ha	1-5	7-10 días	500-1000 l/ha	Al aire libre e invernadero. Aplicar entre BBCH 10-87.
	Botrytis spp.					
	Oídio, Golovinomyces cichoracearum					
Guisante verde	Oídio, Podosphaera fuliginea	3 Kg/ha	1-5	7-10 días	200-1000 l/ha	Solo al aire libre. Aplicar desde BBCH 10 (la 1a hoja verdadera emerge del coleóptilo) hasta BBCH 87 (70% de los frutos maduros).
	Botrytis spp.					
	Oídio, Golovinomyces cichoracearum					
Haba verde	Oídio, Podosphaera fuliginea	3 Kg/ha	1-5	7-10 días	200-1000 l/ha	Solo al aire libre. Aplicar desde BBCH 10 (la 1a hoja verdadera emerge del coleóptilo) hasta BBCH 87 (70% de los frutos maduros).
Hierbas aromáticas y flores comestibles	Oídios, Erysiphaceae	3 Kg/ha			Aire libre: 200-500 l/ha Invernadero: 200-1000 l/ha	Al aire libre e invernadero. Aplicar entre BBCH 10-89. (Uso menor autorizado por procedimiento nacional).
Higuera	Botrytis spp.	5 Kg/ha	1-3	7-10 días	1000-1500 l/ha	Aplicar desde BBCH 61 (Comienzo de la floración: alrededor del 10% de las flores, abiertas) a BBCH 89 (madurez de consumo: Frutos tienen sabor varietal y firmeza típicos). Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*).
	Botrytis spp.					
	Oídio, Golovinomyces cichoracearum					
Judía verde	Oídio, Podosphaera fuliginea	3 Kg/ha	1-5	7-10 días	200-1000 l/ha	Al aire libre e invernadero. Aplicar desde BBCH 10 (la 1a hoja verdadera emerge del coleóptilo) hasta BBCH 87 (70% de los frutos maduros).
Kiwi	Botrytis spp.	5 Kg/ha	1-3	7-10 días	500-1500 l/ha	
	Botrytis spp.					
	Oídio, Golovinomyces cichoracearum					
Lenteja	Oídio, Podosphaera fuliginea	3 Kg/ha	1-5	7-10 días	500-1000 l/ha	Solo al aire libre. (Uso menor autorizado por procedimiento nacional). Aplicar desde BBCH 10 (cotiledones desplegados) hasta BBCH 87 (madurez frutos). Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*).
	Botrytis spp.					(Uso menor autorizado por procedimiento nacional). Aplicar entre BBCh 10-89. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*).

Lúpulo	Oídio del lúpulo, Podosphaera macularis	3 Kg/ha	1-5	7-10 días	500-1500 l/ha	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional). Aplicar entre BBCH 10-89. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*).
Mango	Oídio del mango, Oidium mangiferae	5 Kg/ha	1-3	7-10 días	500-1500 l/ha	
Manzano	Moteado o roña del manzano, Venturia inaequalis	5 Kg/ha	1-3	7-10 días	400-1000 l/ha	Aplicar entre BBCH 07-89.
Melocotonero	Monilia, Monilinia spp.	5 Kg/ha	1-3	7-10 días	500-1500 l/ha	Aplicar desde BBCH 61 (Comienzo de la floración: alrededor del 10% de las flores, abiertas) a BBCH 89 (madurez de consumo: Frutos tienen sabor varietal y firmeza típicos).
Melón	Oídio de las cucurbitáceas, Podosphaera xanthii Oídio, Golovinomyces cichoracearum	3 Kg/ha	1-8	7 días	600-1000 l/ha	Al aire libre e invernadero. Aplicar entre BBCH 10-89.
Nabo	Botrytis spp.	3 Kg/ha	1-5	7-10 días	500-1000 l/ha	Solo al aire libre. (Uso menor autorizado por procedimiento nacional). Aplicar desde BBCH 10 (cotiledones desplegados) hasta BBCH 87 (madurez frutos). Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*).
Níspero, níspero del Japón	Moteado o roña del manzano, Venturia inaequalis	5 Kg/ha	1-3	7-10 días	500-1500 l/ha	
Nogal	Monilia, Monilinia spp.	5 Kg/ha	1-3	7-10 días	500-1500 l/ha	
Ornamentales herbáceas	Oídios, Erysiphaceae	3 Kg/ha	1-6	7-10 días	500-2000 l/ha	Al aire libre e invernadero. Aplicar cuando el follaje es joven y maduro. Se incluye también el cultivo para la obtención de flor cortada, entre BBCH 10-87.
Palmáceas	Oídios, Erysiphaceae	3 Kg/ha	1-6	7-10 días	500-2000 l/ha	Al aire libre e invernadero. Aplicar cuando el follaje es joven y maduro.
Palmera datilera	Botrytis spp.	5 Kg/ha	1-3	7-10 días	1000-1500 l/ha	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional). Aplicar desde BBCH 61 (Comienzo de la floración: alrededor del 10% de las flores, abiertas) a BBCH 89 (madurez de consumo: Frutos tienen sabor varietal y firmeza típicos). Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*).
Papaya	Botrytis spp. Oídio de la papaya, Oidium caricae-papayae	5 Kg/ha	1-3	7-10 días	1.000-1.500 l/ha	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional). Aplicar desde BBCH 61 (Comienzo de la floración: alrededor del 10% de las flores, abiertas) a BBCH 89 (madurez de consumo: Frutos tienen sabor varietal y firmeza típicos). Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*).
Pepinillo	Oídio de las cucurbitáceas, Podosphaera xanthii Oídio, Golovinomyces cichoracearum	3 Kg/ha	1-5	7-10 días	Aire libre: 200-500 l/ha Invernadero: 200-1000 l/ha	Al aire libre e invernadero. Aplicar entre BBCH 10-89.
Pepino	Oídio de las cucurbitáceas, Podosphaera xanthii Oídio, Golovinomyces cichoracearum	3 Kg/ha	1-5	7-10 días	Aire libre: 200-500 l/ha Invernadero: 200-1000 l/ha	Al aire libre e invernadero. Aplicar entre BBCH 10-89.
Pimiento	Oídio, oidiopsis, Leveillula taurica	3 Kg/ha	1-8	7-10 días	500-1.000 l/ha	Solo en invernadero. Aplicar entre BBCH 10-89.
Pistachero	Septorios del pistacho, Septoria spp. Monilia, Monilinia spp. Oídios, Erysiphaceae	5 Kg/ha	1-3	7-10 días	500-1500 l/ha	[Uso secundario]
Platanera	Botrytis spp.	5 Kg/ha	1-3	7-10 días	1000-1500 l/ha	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional). Aplicar desde BBCH 61 (Comienzo de la floración: alrededor del 10% de las flores, abiertas) a BBCH 89 (madurez de consumo: Frutos tienen sabor varietal y firmeza típicos). Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*).
Puerro	Botrytis spp. Oídios, Erysiphaceae	3 Kg/ha	1-5	7-10 días	200-1000 l/ha	Solo al aire libre. Aplicar desde BBCH 10 (la 1a hoja verdadera emerge del coleóptilo) hasta BBCH 87 (70% de los frutos maduros).
Rábano	Botrytis spp. Oídio de la zanahoria, Erysiphe heraclei	3 Kg/ha	1-5	7-10 días	500-1000 l/ha	Solo al aire libre. (Uso menor autorizado por procedimiento nacional). Aplicar desde BBCH 10 (cotiledones desplegados) hasta BBCH 87 (madurez frutos). Ver en el apartado otras indicaciones reglamentarias lo referente a usos menores (*).

