SECRETARIA GENERAL DE RECURSOS AGRARIOS Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD DE LA PRODUCCIÓN AGROALIMENTARIA Y BIENESTAR ANIMAL

Datos del Producto

Número de Registro: 18454 **Estado:** Cancelado **Fechas** **Inscripción:** 05/05/1989 **Renovación:** 17/07/2017 **Cancelación:** 12/02/2020 **Límite de Venta:** 01/05/2020

Nombre Comercial: DOMINEX-10

Titular

BASF Agricultural Solutions Spain S.L.U.

Calle Can Rabia número 3-5, planta 5

08017

(Barcelona)

ESPAÑA

Fabricante

BASF Agricultural Solutions Spain S.L.U.

Calle Can Rabia número 3-5, planta 5

08017

(Barcelona)

ESPAÑA

Composición

ALFA CIPERMETRIN 10% [EC] P/V

Envases

Botella de COEX (HDPE) de 1 l (boca 62 mm).
Botella de COEX (HDPE) de 100 ml.

Usos y Dosis Autorizados

USO	AGENTE	Dosis	Condic. Especifico
Alfalfa	CUCA (Denominación en revisión) GUSANO VERDE (Denominación en revisión) PULGONES (Denominación en revisión)	0,15 l/ha	Realizar la aplicación en un volumen de caldo de 300 l/Ha.
Algodonero	EARIAS (Denominación en revisión) GUSANO ROSADO (Denominación en revisión) ORUGAS (Denominación en revisión) PULGONES (Denominación en revisión)	0,15 l/ha	Realizar la aplicación en un volumen de caldo de 500 l/Ha.
Aliso	PARANTRENE (Denominación en revisión)	0,15 l/ha	El volumen de caldo dependerá del tamaño del árbol.
Arbustos y pequeños árboles ornamentales	ORUGAS (Denominación en revisión) PULGONES (Denominación en revisión) GARRAPATILLO (Denominación en revisión)	0,15 l/ha	Aire libre e invernadero. Realizar la aplicación en un volumen de caldo de 1.000 l/Ha.

Avena	PULGONES (Denominación en revisión)	0,15 l/ha	Realizar la aplicación en un volumen de caldo de 250 l/Ha.
Cebada	GARRAPATILLO (Denominación en revisión) PULGONES (Denominación en revisión)	0,15 l/ha	Realizar la aplicación en un volumen de caldo de 250 l/Ha.
Centeno	GARRAPATILLO (Denominación en revisión) PULGONES (Denominación en revisión)	0,15 l/ha	Realizar la aplicación en un volumen de caldo de 250 l/Ha.
Chopos y álamos	PARANTRENE (Denominación en revisión)	0,15 l/ha	El volumen de caldo dependerá del tamaño del árbol.
Cucurbitáceas	MOSCA BLANCA (Denominación en revisión) ORUGAS (Denominación en revisión) PULGONES (Denominación en revisión)	0,15 l/ha	Aire libre e invernadero. Realizar la aplicación en un volumen de caldo de 1.000 l/Ha.
Guisante para grano	PULGONES (Denominación en revisión)	0,15 l/ha	Realizar la aplicación en un volumen de caldo de 500 l/Ha.
Guisante verde	PULGONES (Denominación en revisión)	0,15 l/ha	Aire libre e invernadero. Realizar la aplicación en un volumen de caldo de 1.000 l/Ha.
Haba para grano	PULGONES (Denominación en revisión)	0,15 l/ha	Realizar la aplicación en un volumen de caldo de 500 l/Ha.
Haba verde	MOSCA BLANCA (Denominación en revisión) PULGONES (Denominación en revisión)	0,15 l/ha	Aire libre e invernadero. Realizar la aplicación en un volumen de caldo de 1.000 l/Ha.
Hortalizas del género Brassica	MOSCA BLANCA (Denominación en revisión) ORUGAS (Denominación en revisión) PULGONES (Denominación en revisión)	0,15 l/ha	Realizar la aplicación en un volumen de caldo de 800 l/Ha.
Judía para grano	PULGONES (Denominación en revisión)	0,15 l/ha	Realizar la aplicación en un volumen de caldo de 500 l/Ha.
Judía verde	MOSCA BLANCA (Denominación en revisión) PULGONES (Denominación en revisión)	0,15 l/ha	Aire libre e invernadero. Realizar la aplicación en un volumen de caldo de 1.000 l/Ha.
Lechuga	MOSCA BLANCA (Denominación en revisión) ORUGAS (Denominación en revisión) PULGONES (Denominación en revisión)	0,15 l/ha	Realizar la aplicación en un volumen de caldo de 800 l/Ha.
Olmos	ESCOLITIDOS (Denominación en revisión) GALERUCA (Denominación en revisión)	0,15 l/ha	El volumen de caldo dependerá del tamaño del árbol.
Ornamentales herbáceas	HELIOTIS (Denominación en revisión) ORUGAS (Denominación en revisión) PULGONES (Denominación en revisión)	0,15 l/ha	Aire libre e invernadero. Realizar la aplicación en un volumen de caldo de 1.000 l/Ha.
Patata	ESCARABAJO (Denominación en revisión) PULGONES (Denominación en revisión)	0,15 l/ha	Realizar la aplicación en un volumen de caldo de 800 l/Ha.
Pinos	ESCOLITIDOS (Denominación en revisión)		El volumen de caldo dependerá del tamaño del árbol.
	PROCESIONARIA (Denominación en revisión)	0,15 l/ha	Pulverizar directamente en los bolsones. El volumen de caldo dependerá del tamaño del árbol.
	CORITUCA (Denominación en revisión)		

Plátanos de sombra	ESCOLITIDOS (Denominación en revisión)	0,15 l/ha	El volumen de caldo dependerá del tamaño del árbol.
Puerro	ORUGAS (Denominación en revisión) PULGONES (Denominación en revisión)	0,15 l/ha	Realizar la aplicación en un volumen de caldo de 800 l/Ha.
Remolacha azucarera	CASIDA (Denominación en revisión) HELIOTIS (Denominación en revisión) ORUGAS (Denominación en revisión) PULGON NEGRO (Denominación en revisión) PULGUILLA (Denominación en revisión)	0,15 l/ha	Realizar la aplicación en un volumen de caldo de 500 l/Ha.
Sauces	PARANTRENE (Denominación en revisión)	0,15 l/ha	El volumen de caldo dependerá del tamaño del árbol.
Solanáceas (excepto patata)	HELIOTIS (Denominación en revisión) MOSCA BLANCA (Denominación en revisión) ORUGAS (Denominación en revisión) PULGONES (Denominación en revisión)	0,15 l/ha	Aire libre e invernadero. Realizar la aplicación en un volumen de caldo de 1.000 l/Ha.
Trigo	GARRAPATILLO (Denominación en revisión) PULGONES (Denominación en revisión)	0,15 l/ha	Realizar la aplicación en un volumen de caldo de 250 l/Ha.

Plazos de Seguridad (Protección del Consumidor)

USO	P.S. (días)
Cucurbitáceas, Guisante verde, Haba verde, Hortalizas del género Brassica, Judía verde, Lechuga, Puerro, Solanáceas (excepto patata)	2
Algodonero, Guisante para grano, Haba para grano, Judía para grano, Patata, Remolacha azucarera	21
Avena, Cebada, Centeno, Trigo	35
Alfalfa, Aliso, Arbustos y pequeños árboles ornamentales, Chopos y álamos, Olmos, Ornamentales herbáceas, Pinos, Plátanos de sombra, Sauces	NP

Condiciones Generales de Uso

Aplicar en pulverización normal con tractor o manual (en caso de aplicaciones en invernadero, solo manual), solamente en las etapas de crecimiento más susceptibles de la plaga.
No aplicar en caso de que la plaga esté fuera de control.
Una única aplicación por campaña en todos los usos.
Evitar aplicaciones consecutivas de este producto o de otros del mismo grupo químico (piretroides) y modo de acción similar.
Utilizar dosis menores puede favorecer la aparición de resistencias.

Clase de Usuario

Uso reservado a agricultores y aplicadores profesionales

Mitigación de riesgos en la manipulación

El aplicador deberá utilizar guantes y ropa de protección química en mezcla/carga y aplicación, siempre que el tractor carezca de cabina cerrada y dispositico de filtrado de aire. Para la aplicación en invernadero se deberán utilizar guantes de protección química y mono de tipo 6. En caso de tener que manipular los tubos de riego en las 48 horas posteriores al tratamiento fitosanitario, se utilizarán botas (de caucho o poliméricas), ropa y guantes de protección química. En la limpieza y manejo del equipo se utilizarán las mismas medidas de protección que en la aplicación. No entrar al cultivo hasta que el producto esté seco.

Clasificaciones y Etiquetado

Clase y categoría de peligro (Humana)	Lesiones oculares graves. Categoría 1. Líquidos inflamables. Categoría 3. Sensibilización cutánea. Categoría 1. Toxicidad aguda (inhalación). Categoría 4. Toxicidad aguda (oral). Categoría 4. Toxicidad específica en determinados órganos (exposición única). Categoría 3.
Pictograma	GHS02 (llama) GHS05 (corrosión) GHS07 (signo de exclamación)
Palabra de Advertencia	Peligro
Indicaciones de Peligro	EUH 401 -A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso. EUH 066 -La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel. H226 -Líquidos y vapores inflamables. H302 -Nocivo en caso de ingestión. H332 -Nocivo en caso de inhalación. H372 -Provoca daños en las vías respiratorias tras exposiciones prolongadas o repetidas. H318 -Provoca lesiones oculares graves. H335 -Puede irritar las vías respiratorias. H317 -Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Consejos de Prudencia	P305+P351+P338 -EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. P309+P311+P101 -EN CASO DE exposición o malestar: Llamar a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico. Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. P301+P330+P331 -EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito. P210+P370+P378 -Mantener alejado de fuentes de calor,chispas,llama abierta o superficies calientes. En caso de incendio: Utilizar...para apagarlo (a especificar por el fabricante) P260 -No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. P337+P313 -Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico. P281 -Utilizar el equipo de protección individual obligatorio.
Clase y categoría de peligro (Medio Ambiental)	Acuático agudo 1 Acuático crónico 1
Pictograma	GHS09 (medio ambiente)
Palabra de Advertencia	Atención
Indicaciones de Peligro	H410 -Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.
Consejos de Prudencia	P501 -Elimínense el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos. P273 -Evitar su liberación al medio ambiente. P391 -Recoger el vertido.

Mitigación de riesgos ambientales

SPe 3: Para proteger los organismos acuáticos, respétese sin tratar una banda de seguridad de 20 m. con boquillas de reducción de deriva del 95% en arbustos y pequeños árboles ornamentales (al aire libre); y 20 m., o bien, 5 m con boquillas de reducción de deriva del 75%, o 10 m con boquillas del 50% para el resto de usos.
SPe 3: Para proteger los artrópodos no objetivo, respétese sin tratar una banda de seguridad de 20 m. en arbustos y pequeños árboles ornamentales y ornamentales herbáceas de altura mayor a 50 cm (al aire libre); y 10 m. en el resto de usos, hasta la zona no cultivada.
Peligroso para las abejas. Para proteger las abejas, no aplicar durante la floración de los cultivos, no utilizar donde haya abejas en pecoreo activo, retírense las colmenas durante el tratamiento y durante al menos 4 días después del mismo. Asímismo, no aplicar cuando las malas hierbas estén en floración.

Gestión de Envases

Enjuague enérgicamente tres veces cada envase que utilice, vertiendo el agua de lavado al depósito (del pulverizador). Conforme a lo establecido en el Real Decreto 1416/2001, de 14 de diciembre, sobre envases de productos fitosanitarios, en la etiqueta deberá figurar la siguiente frase: Entregar los envases vacíos o resíduos de envases bien en los puntos de recogida establecidos por los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada (SIG) o directamente en el punto de venta donde se hubiera adquirido si dichos envases se han puesto en el mercado a través de un sistema de depósito, devolución y retorno.

Otras Indicaciones reglamentarias

En la etiqueta se hará constar que "contiene nafta disolvente del petróleo, nº CAS: 64742-95-6, que contiene trimetilbenceno (nº CAS: 95-63-6)".
SP1: NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE. (No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales/Evitese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos).