

Datos del Producto

Número de Registro: 25332 **Estado:** Cancelado **Fechas** **Inscripción:** 29/04/2009 **Renovación:** 05/10/2018 **Cancelación:** 07/09/2020 **Límite de Venta:** 31/10/2020
Nombre Comercial: CANIGO

Titular

KENOGARD, S.A.
 C/ Diputación, 279
 08007
 (Barcelona)

Fabricante

A TO Z DRYING INC.
 1000 Wallance Road Po.O. Box 180, Osage IA
 50461-0180 IOWA
 (Mitchell)
 USA

Composición

BACILLUS THURINGIENSIS AIZAWAI (CEPA ABTS-1857, 540 g/kg) 54% (15 millones de CLU/g) [WG] P/P

Envases

Bote de 0,5 kg.
 Botellas de HDPE de 1 kg.
 Sobres de 15 g de complejo de aluminio estucado.

Usos y Dosis Autorizados

| USO | AGENTE | Dosis | Nº Aplic. | Intervalos | Vol. Caldo | Condic. Especifico |
|-------------|------------------------|----------------|-----------|------------|---|--|
| Alcachofa | LARVAS DE LEPIDOPTEROS | 0,5 - 1 Kg/ha | Máx. 5 | 7-14 | 1.000 l/ha | Aplicar desde la eclosión de las larvas, al inicio de su desarrollo. Contra Acrolepia assectella, Agrotis segetum, Agrotis spp, Depressaria erinaceella, Helicoverpa armigera, Spodoptera exigua, Plusia spp, Plutella xylostella, Phytometra gamma, Vanessa cardui. |
| Algodonero | HELIOTIS | 0,5 - 1 Kg/ha | Máx. 5 | 7-14 | 500-1.000 l/ha | Aplicar desde la eclosión de las larvas, al inicio de su desarrollo. |
| Arroz | LARVAS DE LEPIDOPTEROS | 0,75 - 1 Kg/ha | Máx. 1 | - | 400-500 l/ha | Aplicar desde la eclosión de las larvas, al inicio de su desarrollo. Contra Mythimna unipunctata. |
| Berenjena | LARVAS DE LEPIDOPTEROS | 0,5 - 1 Kg/ha | Máx. 6 | 7-14 | Aire libre: 500-1.000 l/ha Invernadero: 400-1.000 l/ha | Aplicar desde la eclosión de las larvas, al inicio de su desarrollo. Aire libre: contra Helicoverpa armigera, Helicoverpa spp, Spodoptera exigua, Ostrinia nubilalis, Spodoptera littoralis. Invernadero: contra Tuta absoluta, Helicoverpa armigera, Spodoptera exigua, Chrysodeixis (Plusia) chalcites, Spodoptera littoralis. |
| Berza , col | LARVAS DE LEPIDOPTEROS | 0,75 - 1 Kg/ha | Máx. 6 | 7-14 | 500-1.000 l/ha | Aplicar desde la eclosión de las larvas, al inicio de su desarrollo. Contra Helicoverpa armigera, Spodoptera exigua, Pieris rapae, Plutella xylostella, Plutella spp, Spodoptera littoralis, Trichoplusia. |
| Brécol | LARVAS DE LEPIDOPTEROS | 0,75 - 1 Kg/ha | Máx. 6 | 7-14 | 500-1.000 l/ha | Aplicar desde la eclosión de las larvas, al inicio de su desarrollo. Contra Helicoverpa armigera, Spodoptera exigua, Pieris rapae, Plutella xylostella, Plutella spp, Spodoptera littoralis, Trichoplusia. |
| Coliflor | LARVAS DE LEPIDOPTEROS | 0,75 - 1 Kg/ha | Máx. 6 | 7-14 | 500-1.000 l/ha | Aplicar desde la eclosión de las larvas, al inicio de su desarrollo. Contra Helicoverpa armigera, Spodoptera exigua, Pieris rapae, Plutella xylostella, Plutella spp, Spodoptera littoralis, Trichoplusia. |

| | | | | | | |
|------------------------|------------------------|-----------------|--------|------|---|--|
| Escarola | LARVAS DE LEPIDOPTEROS | 0,5 - 1 Kg/ha | Máx. 6 | 7-14 | 500-800 l/ha | Aplicar desde la eclosión de las larvas, al inicio de su desarrollo. Contra Helicoverpa armígera, Spodoptera exigua, Phytometra (autographa) gamma, Spodoptera spp, Trichoplusia ni. |
| Haba verde | LARVAS DE LEPIDOPTEROS | 0,5 - 1 Kg/ha | Máx. 6 | 7-14 | 400-1.000 l/ha | Solo en invernadero. Aplicar desde la eclosión de las larvas, al inicio de su desarrollo. Contra Tuta absoluta, Helicoverpa armígera, Spodoptera exigua, Chrysodeixis (Plusia) chalcites, Spodoptera littoralis. |
| Judía verde | LARVAS DE LEPIDOPTEROS | 0,5 - 1 Kg/ha | Máx. 6 | 7-14 | 400-1.000 l/ha | Solo en invernadero. Aplicar desde la eclosión de las larvas, al inicio de su desarrollo. Contra Tuta absoluta, Helicoverpa armígera, Spodoptera exigua, Chrysodeixis (Plusia) chalcites, Spodoptera littoralis. |
| Lechuga | LARVAS DE LEPIDOPTEROS | 0,5 - 1 Kg/ha | Máx. 6 | 7-14 | 500-800 l/ha | Aplicar desde la eclosión de las larvas, al inicio de su desarrollo. Contra Helicoverpa armígera, Spodoptera exigua, Phytometra (autographa) gamma, Spodoptera spp, Trichoplusia ni. |
| Manzano | LARVAS DE LEPIDOPTEROS | 0,5 - 1,5 Kg/ha | Máx. 4 | 7-14 | 500-1.500 l/ha | Aplicar desde la eclosión de las larvas, al inicio de su desarrollo. Contra Capua reticulana, Cydia pomonella, Operophtera (Cheimatobia) brumata. |
| Melón | LARVAS DE LEPIDOPTEROS | 0,5 - 1 Kg/ha | Máx. 6 | 7-14 | Aire libre: 500-1.000 l/ha Invernadero: 400-1.000 l/ha | Aplicar desde la eclosión de las larvas, al inicio de su desarrollo. Aire libre: contra Helicoverpa armígera, Helicoverpa spp, Spodoptera exigua, Ostrinia nubilalis, Spodoptera littoralis. Invernadero: contra Tuta absoluta, Helicoverpa armígera, Spodoptera exigua, Chrysodeixis (Plusia) chalcites, Spodoptera littoralis. |
| Olivo | PRAYS (GEN. ANTOFAGA) | 0,5 - 1 Kg/ha | Máx. 4 | 7-14 | 1.000-1.500 l/ha | Aplicar desde la eclosión de las larvas, al inicio de su desarrollo. |
| Ornamentales herbáceas | LARVAS DE LEPIDOPTEROS | 0,75 - 1 Kg/ha | Máx. 6 | 7-14 | 1.000 l/ha | Solo en invernadero. Clavel, crisantemo, geranio, gerbera, hibiscus y kalanchoe. Aplicar desde la eclosión de las larvas, al inicio de su desarrollo. Contra Helicoverpa armígera, Spodoptera exigua, Chrysodeixis chalcites, Duponchelia fovealis. |
| Pepino | LARVAS DE LEPIDOPTEROS | 0,5 - 1 Kg/ha | Máx. 6 | 7-14 | 400-1.000 l/ha | Solo en invernadero. Aplicar desde la eclosión de las larvas, al inicio de su desarrollo. Contra Tuta absoluta, Helicoverpa armígera, Spodoptera exigua, Chrysodeixis (Plusia) chalcites, Spodoptera littoralis. |
| Peral | LARVAS DE LEPIDOPTEROS | 0,5 - 1,5 Kg/ha | Máx. 4 | 7-14 | 500-1.500 l/ha | Aplicar desde la eclosión de las larvas, al inicio de su desarrollo. Contra Capua reticulana, Cydia pomonella, Operophtera (Cheimatobia) brumata. |
| Pimiento | LARVAS DE LEPIDOPTEROS | 0,5 - 1 Kg/ha | Máx. 6 | 7-14 | Aire libre: 500-1.000 l/ha Invernadero: 400-1.000 l/ha | Aplicar desde la eclosión de las larvas, al inicio de su desarrollo. Aire libre: contra Helicoverpa armígera, Helicoverpa spp, Spodoptera exigua, Ostrinia nubilalis, Spodoptera littoralis. Invernadero: contra Tuta absoluta, Helicoverpa armígera, Spodoptera exigua, Chrysodeixis (Plusia) chalcites, Spodoptera littoralis. |
| Puerro | LARVAS DE LEPIDOPTEROS | 0,5 - 1 Kg/ha | Máx. 5 | 7-14 | 1.000 l/ha | Aplicar desde la eclosión de las larvas, al inicio de su desarrollo. Contra Acrolepia assectella, Agrotis segetum, Agrotis spp, Depressaria erinaceella, Helicoverpa armígera, Spodoptera exigua, Plusia spp, Plutella xylostella, Phytometra gamma, Vanessa cardui. |
| Rosales | LARVAS DE LEPIDOPTEROS | 0,75 - 1 Kg/ha | Máx. 6 | 7-14 | 1.000 l/ha | Solo en invernadero. Aplicar desde la eclosión de las larvas, al inicio de su desarrollo. Contra Helicoverpa armígera, Spodoptera exigua, Chrysodeixis chalcites, Duponchelia fovealis. |
| Sandía | LARVAS DE LEPIDOPTEROS | 0,5 - 1 Kg/ha | Máx. 6 | 7-14 | Aire libre: 500-1.000 l/ha Invernadero: 400-1.000 l/ha | Aplicar desde la eclosión de las larvas, al inicio de su desarrollo. Aire libre: contra Helicoverpa armígera, Helicoverpa spp, Spodoptera exigua, Ostrinia nubilalis, Spodoptera littoralis. Invernadero: contra Tuta absoluta, Helicoverpa armígera, Spodoptera exigua, Chrysodeixis (Plusia) chalcites, Spodoptera littoralis. |
| Tomate | LARVAS DE LEPIDOPTEROS | 0,5 - 1 Kg/ha | Máx. 6 | 7-14 | Aire libre: 500-1.000 l/ha Invernadero: 400-1.000 l/ha | Aplicar desde la eclosión de las larvas, al inicio de su desarrollo. Aire libre: contra Helicoverpa armígera, Helicoverpa spp, Spodoptera exigua, Ostrinia nubilalis, Spodoptera littoralis. Invernadero: contra Tuta absoluta, Helicoverpa armígera, Spodoptera exigua, Chrysodeixis (Plusia) chalcites, Spodoptera littoralis. |
| Vid | POLILLAS DEL RACIMO | 0,75 - 1 Kg/ha | Máx. 6 | 7-14 | 1.000 l/ha | Aplicar desde la eclosión de las larvas, al inicio de su desarrollo. |

Plazos de Seguridad (Protección del Consumidor)



| USO | P.S. (días) |
|---|-------------|
| Alcachofa, Algodonero, Arroz, Berenjena, Berza, col, Brécol, Coliflor, Escarola, Haba verde, Judía verde, Lechuga, Manzano, Melón, Olivo, Ornamentales herbáceas, Pepino, Peral, Pimiento, Puerro, Rosales, Sandía, Tomate, Vid | NP |

Condiciones Generales de Uso



Insecticida biológico contra larvas de lepidópteros que actúa por ingestión.
Aplicar en pulverización. El momento más oportuno para su aplicación es el inicio del desarrollo de las larvas. El producto no se aplicará antes del desarrollo de las hojas para todos los cultivos.
Aplicar al aire libre e invernadero mediante pulverización normal con tractor o manual.
Uso reservado a agricultores y aplicadores profesionales en lugares no destinados al público en general (Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, por el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios).

Clase de Usuario



Uso profesional en lugares no destinados al público en general.

Mitigación de riesgos en la manipulación



SEGURIDAD DEL APLICADOR

AIRE LIBRE E INVERNADERO:

• MEZCLA, CARGA, APLICACIÓN, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO:

- o Guantes de protección química.
- o Ropa de protección de al menos tipo 6-B contra agentes biológicos, según norma UNE EN 14126: 2004.
- o Mascarilla autofiltrante para partículas al menos de tipo FFP2, según norma UNE-EN-149:2001+A1:2010, o bien mascarilla con filtro al menos de tipo P2, según normas UNE-EN 143:2001, UNE-EN 143/AC:2002, UNE-EN 143:2001/AC:2005, UNE-EN 143:2001/A1:2006.

SEGURIDAD DEL TRABAJADOR

AIRE LIBRE E INVERNADERO:

- o Guantes de protección química.
- o Ropa de protección de al menos tipo 6-B contra agentes biológicos, según norma UNE EN 14126: 2004.
- o Mascarilla autofiltrante para partículas al menos de tipo FFP2, según norma UNE-EN-149:2001+A1:2010, o bien mascarilla con filtro al menos de tipo P2, según normas UNE-EN 143:2001, UNE-EN 143/AC:2002, UNE-EN 143:2001/AC:2005, UNE-EN 143:2001/A1:2006.


FRASES ASOCIADAS A LA REDUCCIÓN DEL RIESGO

- Ropa de trabajo: manga larga, pantalón largo y calzado adecuado.
- Durante la aplicación con tractor con cabina cerrada y dispositivo de filtrado de aire, se podrá prescindir del equipo de protección, siempre que se mantengan las ventanas cerradas. Los operadores llevarán guantes de protección química cuando tengan que salir del tractor para realizar tareas de mantenimiento o limpieza que puedan surgir durante la aplicación.
- Durante la aplicación del producto, el operador evitará el contacto con el follaje húmedo

- No entrar al cultivo hasta que el producto esté seco.
- No tratar con este producto en caso de que se prevea la realización de labores mecánicas que puedan deteriorar los guantes de protección química.
- Asimismo, no se deberá aplicar este producto en ninguna zona adyacente a zonas residenciales.

Clasificaciones y Etiquetado



| | |
|--|---|
| Clase y categoría de peligro (Humana) | Irritación ocular. Categoría 2. |
| Pictograma |  GHS07 (signo de exclamación) |
| Palabra de Advertencia | Atención |
| Indicaciones de Peligro | EUH 401 -A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso. H319 -Provoca irritación ocular grave. |
| Consejos de Prudencia | P284 -[En caso de ventilación insuficiente] llevar equipo de protección respiratoria. P302+P352 -EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua y jabón. P305+P351+P338 -EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. P304+P340 -EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. P261 -Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. P280 -Llevar guantes, prendas y máscara de protección. |
| Clase y categoría de peligro (Medio Ambiental) | |
| Pictograma | |
| Palabra de Advertencia | |
| Indicaciones de Peligro | |
| Consejos de Prudencia | |

Mitigación de riesgos ambientales



Spe3: Para proteger a los organismos acuáticos, respétese sin tratar una banda de seguridad hasta las masas de agua superficial (o canales de desagüe en arrozales) de:

- 30 m para manzano, peral,
- 15 m para olivo,
- 10 m para berenjena (al aire libre), tomate (al aire libre), alcachofa, puerro,
- 5 m para brécol, berza, col, coliflor, pimiento (al aire libre), melón (al aire libre), sandía (al aire libre), lechuga, escarola, vid, algodón.

Spe8: No utilizar donde haya abejas en pecoreo activo.

Gestión de Envases



Conforme a lo establecido en el Real Decreto 1416/2001, de 14 de diciembre, sobre envases de productos fitosanitarios, en la etiqueta deberá figurar la siguiente frase: Entregar los envases vacíos o residuos de envases bien en los puntos de recogida establecidos por los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada (SIG) o directamente en el punto de venta donde se hubiera adquirido si dichos envases se han puesto en el mercado a través de un sistema de depósito, devolución y retorno.

Otras Indicaciones reglamentarias



Sp1: No contaminar el agua con el producto ni con su envase. No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales. Evítese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos.

Contiene *Bacillus Thuringiensis* subsp. *Aizawai* (cepa ABTS-1857). Es potencialmente sensibilizante por vía cutánea y por vía inhalatoria.

El preparado no se usará en combinación con otros productos.

No se debe autorizar para su uso en espacios utilizados por el público en general (parques abiertos, jardines confinados), campos de deporte, espacios utilizados por grupos vulnerables ni en espacios de uso privado (jardinería exterior doméstica y huertos familiares).

El formulado no debe contener β -exotoxina.

Condiciones de almacenamiento



P411 - Almacenar a temperaturas no superiores a ... °C/...°F..

