

Datos del Producto

Número de Registro: ES-01868 **Estado:** Vigente **Fechas** **Inscripción:** 12/01/2026 **Renovación:** **Caducidad:** 03/08/2036
Nombre Comercial: VITROL GB

Titular

Bros Spółka z ograniczona odpowiedzialnoscia

 Karpia 24

 61-619 Poznan

 POLONIA

Fabricante

Bros Spółka z ograniczona odpowiedzialnoscia

 Karpia 24

 61-619 Poznan

 POLONIA

Composición

PIROFOSFATO FÉRRICO 2,4% [RB] P/P

Envases

Botellas o Contenedor (jar) de PE o HDPE o LDPE o PP o PET o PCV de 100 g, 150 g, 200 g, 250 g, 300 g, 350g, 400 g, 450 g, 500 g. Cubeta de PE o HDPE o LDPE o PP o PET o PCV de 250 g, 300 g, 350 g, 400 g, 450 g, 500 g. Saco de PE o HDPE o LDPE o PP o PA o laminado (PET/ALU/PE o PET/PET met PE o PA/PE) de 250 g, 300 g, 350 g, 400 g, 450 g, 500 g. Bolsa de PE o HDPE o LDPE o PP o PA o laminado (PET/ALU/PE o PET/PET met PE o PA/PE o PAP/PE) de 100 g, 150 g, 200 g, 250 g, 300 g, 350 g, 400 g, 450 g, 500 g. Bolsa + caja de cartón de PE o HDPE o LPDE o PP o PA o laminado (PET/ALU/PE o PET/PET met PE o PA/PE) + cartón: 100 g, 150 g, 200 g, 250 g, 300 g, 350 g, 400 g, 450 g, 500 g. Caja de cartón: 100 g, 150 g, 200 g, 250 g, 300 g, 350 g, 400 g, 450 g, 500 g.

Usos y Dosis Autorizados

USO	AGENTE	Dosis	Nº Aplic.	Intervalos	Condic. Especifico
Ámbito de Aplicación: No Agrario - Tipo de Usuario: No Profesional - Sistema de Cultivo: Aire libre					
Acelga	Babosas, limacos				
	Caracoles	7 Kg/ha	1-6	14 días	(Uso menor por Jerarquía de cultivos). Aplicar al inicio de la infestación o a la aparición de los primeros síntomas.
Achicoria (hojas)	Babosas, limacos				
	Caracoles	7 Kg/ha	1-6	14 días	(Uso menor por Jerarquía de cultivos). Aplicar al inicio de la infestación o a la aparición de los primeros síntomas.
Albahaca	Babosas, limacos				
	Caracoles	7 Kg/ha	1-6	14 días	(Uso menor por Jerarquía de cultivos). Aplicar al inicio de la infestación o a la aparición de los primeros síntomas.
Arándano, mirtilo	Babosas, limacos				
	Caracoles	7 Kg/ha	1-6	14 días	(Uso menor por Jerarquía de cultivos). Aplicar al inicio de la infestación o a la aparición de los primeros síntomas.
Berenjena	Babosas, limacos				
	Caracoles	7 Kg/ha	1-6	14 días	(Uso menor por Jerarquía de cultivos). Aplicar al inicio de la infestación o a la aparición de los primeros síntomas.

Berro de agua	Babosas, limacos Caracoles	7 Kg/ha	1-6	14 días	(Uso menor por Jerarquía de cultivos). Aplicar al inicio de la infestación o a la aparición de los primeros síntomas.
Brécol	Babosas, limacos Caracoles	7 Kg/ha	1-6	14 días	(Uso menor por Jerarquía de cultivos). Aplicar al inicio de la infestación o a la aparición de los primeros síntomas.
Calabacín	Babosas, limacos Caracoles	7 Kg/ha	1-6	14 días	Aplicar al inicio de la infestación o a la aparición de los primeros síntomas.
Calabaza	Babosas, limacos Caracoles	7 Kg/ha	1-6	14 días	(Uso menor por Jerarquía de cultivos). Aplicar al inicio de la infestación o a la aparición de los primeros síntomas.
Canónigo	Babosas, limacos Caracoles	7 Kg/ha	1-6	14 días	(Uso menor por Jerarquía de cultivos). Aplicar al inicio de la infestación o a la aparición de los primeros síntomas.
Cebollino	Babosas, limacos Caracoles	7 Kg/ha	1-6	14 días	(Uso menor por Jerarquía de cultivos). Aplicar al inicio de la infestación o a la aparición de los primeros síntomas.
Col de Bruselas	Babosas, limacos Caracoles	7 Kg/ha	1-6	14 días	(Uso menor por Jerarquía de cultivos). Aplicar al inicio de la infestación o a la aparición de los primeros síntomas.
Coliflor	Babosas, limacos Caracoles	7 Kg/ha	1-6	14 días	(Uso menor por Jerarquía de cultivos). Aplicar al inicio de la infestación o a la aparición de los primeros síntomas.
Colinabo	Babosas, limacos Caracoles	7 Kg/ha	1-6	14 días	(Uso menor por Jerarquía de cultivos). Aplicar al inicio de la infestación o a la aparición de los primeros síntomas.
Eneldo	Babosas, limacos Caracoles	7 Kg/ha	1-6	14 días	(Uso menor por Jerarquía de cultivos). Aplicar al inicio de la infestación o a la aparición de los primeros síntomas.
Escarola	Babosas, limacos Caracoles	7 Kg/ha	1-6	14 días	(Uso menor por Jerarquía de cultivos). Aplicar al inicio de la infestación o a la aparición de los primeros síntomas.
Espárrago	Babosas, limacos Caracoles	7 Kg/ha	1-6	14 días	(Uso menor por Jerarquía de cultivos). Aplicar al inicio de la infestación o a la aparición de los primeros síntomas.
Espinaca	Babosas, limacos Caracoles	7 Kg/ha	1-6	14 días	(Uso menor por Jerarquía de cultivos). Aplicar al inicio de la infestación o a la aparición de los primeros síntomas.
Estragón	Babosas, limacos Caracoles	7 Kg/ha	1-6	14 días	(Uso menor por Jerarquía de cultivos). Aplicar al inicio de la infestación o a la aparición de los primeros síntomas.
Frambueso	Babosas, limacos Caracoles	7 Kg/ha	1-6	14 días	(Uso menor por Jerarquía de cultivos). Aplicar al inicio de la infestación o a la aparición de los primeros síntomas.
Fresal	Babosas, limacos Caracoles	7 Kg/ha	1-6	14 días	Aplicar al inicio de la infestación o a la aparición de los primeros síntomas.

	Babosas, limacos					
Grosellero	Caracoles	7 Kg/ha	1-6	14 días	(Uso menor por Jerarquía de cultivos). Aplicar al inicio de la infestación o a la aparición de los primeros síntomas.	
	Babosas, limacos					
Guisante verde	Caracoles	7 Kg/ha	1-6	14 días	(Uso menor por Jerarquía de cultivos). Aplicar al inicio de la infestación o a la aparición de los primeros síntomas.	
	Babosas, limacos					
Haba verde	Caracoles	7 Kg/ha	1-6	14 días	(Uso menor por Jerarquía de cultivos). Aplicar al inicio de la infestación o a la aparición de los primeros síntomas.	
	Babosas, limacos					
Hinojo	Caracoles	7 Kg/ha	1-6	14 días	(Uso menor por Jerarquía de cultivos). Aplicar al inicio de la infestación o a la aparición de los primeros síntomas.	
	Babosas, limacos					
Judía verde	Caracoles	7 Kg/ha	1-6	14 días	(Uso menor por Jerarquía de cultivos). Aplicar al inicio de la infestación o a la aparición de los primeros síntomas.	
	Babosas, limacos					
Laurel	Caracoles	7 Kg/ha	1-6	14 días	Aplicar al inicio de la infestación o a la aparición de los primeros síntomas.	
	Babosas, limacos					
Lechuga	Caracoles	7 Kg/ha	1-6	14 días	Aplicar al inicio de la infestación o a la aparición de los primeros síntomas.	
	Babosas, limacos					
Lenteja	Caracoles	7 Kg/ha	1-6	14 días	(Uso menor por Jerarquía de cultivos). Aplicar al inicio de la infestación o a la aparición de los primeros síntomas.	
	Babosas, limacos					
Maíz dulce	Caracoles	7 Kg/ha	1-6	14 días	(Uso menor por Jerarquía de cultivos). Aplicar al inicio de la infestación o a la aparición de los primeros síntomas.	
	Babosas, limacos					
Melón	Caracoles	7 Kg/ha	1-6	14 días	Aplicar al inicio de la infestación o a la aparición de los primeros síntomas.	
	Babosas, limacos					
Mentas incluida hierbabuena	Caracoles	7 Kg/ha	1-6	14 días	(Uso menor por Jerarquía de cultivos). Aplicar al inicio de la infestación o a la aparición de los primeros síntomas.	
	Babosas, limacos					
Orégano	Caracoles	7 Kg/ha	1-6	14 días	(Uso menor por Jerarquía de cultivos). Aplicar al inicio de la infestación o a la aparición de los primeros síntomas.	
	Babosas, limacos					
Ornamentales herbáceas	Caracoles	7 Kg/ha	1-6	14 días	Aplicar al inicio de la infestación o a la aparición de los primeros síntomas.	
	Babosas, limacos					
Pepino	Caracoles	7 Kg/ha	1-6	14 días	(Uso menor por Jerarquía de cultivos). Aplicar al inicio de la infestación o a la aparición de los primeros síntomas.	
	Babosas, limacos					
Perejil	Caracoles	7 Kg/ha	1-6	14 días	(Uso menor por Jerarquía de cultivos). Aplicar al inicio de la infestación o a la aparición de los primeros síntomas.	
	Babosas, limacos					
Pimiento	Caracoles	7 Kg/ha	1-6	14 días	Aplicar al inicio de la infestación o a la aparición de los primeros síntomas.	
	Babosas, limacos					

Puerro	Caracoles	7 Kg/ha	1-6	14 días	(Uso menor por Jerarquía de cultivos). Aplicar al inicio de la infestación o a la aparición de los primeros síntomas.
	Babosas, limacos				
Repollo	Caracoles	7 Kg/ha	1-6	14 días	(Uso menor por Jerarquía de cultivos). Aplicar al inicio de la infestación o a la aparición de los primeros síntomas.
	Babosas, limacos				
Romero	Caracoles	7 Kg/ha	1-6	14 días	(Uso menor por Jerarquía de cultivos). Aplicar al inicio de la infestación o a la aparición de los primeros síntomas.
	Babosas, limacos				
Rúcula	Caracoles	7 Kg/ha	1-6	14 días	(Uso menor por Jerarquía de cultivos). Aplicar al inicio de la infestación o a la aparición de los primeros síntomas.
	Babosas, limacos				
Salvia	Caracoles	7 Kg/ha	1-6	14 días	(Uso menor por Jerarquía de cultivos). Aplicar al inicio de la infestación o a la aparición de los primeros síntomas.
	Babosas, limacos				
Sandía	Caracoles	7 Kg/ha	1-6	14 días	Aplicar al inicio de la infestación o a la aparición de los primeros síntomas.
	Babosas, limacos				
Tomate	Caracoles	7 Kg/ha	1-6	14 días	Aplicar al inicio de la infestación o a la aparición de los primeros síntomas.
	Babosas, limacos				
Tomillo	Caracoles	7 Kg/ha	1-6	14 días	(Uso menor por Jerarquía de cultivos). Aplicar al inicio de la infestación o a la aparición de los primeros síntomas.
	Babosas, limacos				
Vid de mesa	Caracoles	7 Kg/ha	1-6	14 días	Aplicar al inicio de la infestación o a la aparición de los primeros síntomas.
	Babosas, limacos				
Vid de vinificación	Caracoles	7 Kg/ha	1-6	14 días	Aplicar al inicio de la infestación o a la aparición de los primeros síntomas.
	Babosas, limacos				
Zarzamoras	Caracoles	7 Kg/ha	1-6	14 días	(Uso menor por Jerarquía de cultivos). Aplicar al inicio de la infestación o a la aparición de los primeros síntomas.
Ámbito de Aplicación: No Agrario - Tipo de Usuario: No Profesional - Sistema de Cultivo: Invernadero					
	Babosas, limacos				
Acelga	Caracoles	7 Kg/ha	1-6	14 días	(Uso menor por Jerarquía de cultivos). Aplicar al inicio de la infestación o a la aparición de los primeros síntomas.
	Babosas, limacos				
Achicoria (hojas)	Caracoles	7 Kg/ha	1-6	14 días	(Uso menor por Jerarquía de cultivos). Aplicar al inicio de la infestación o a la aparición de los primeros síntomas.
	Babosas, limacos				
Albahaca	Caracoles	7 Kg/ha	1-6	14 días	(Uso menor por Jerarquía de cultivos). Aplicar al inicio de la infestación o a la aparición de los primeros síntomas.
	Babosas, limacos				
Arándano, mirtilo	Caracoles	7 Kg/ha	1-6	14 días	(Uso menor por Jerarquía de cultivos). Aplicar al inicio de la infestación o a la aparición de los primeros síntomas.
	Babosas, limacos				
Berenjena	Caracoles	7 Kg/ha	1-6	14 días	(Uso menor por Jerarquía de cultivos). Aplicar al inicio de la infestación o a la aparición de los primeros síntomas.
	Babosas, limacos				

Berro de agua	Caracoles	7 Kg/ha	1-6	14 días	(Uso menor por Jerarquía de cultivos). Aplicar al inicio de la infestación o a la aparición de los primeros síntomas.
	Babosas, limacos				
Brécol	Caracoles	7 Kg/ha	1-6	14 días	(Uso menor por Jerarquía de cultivos). Aplicar al inicio de la infestación o a la aparición de los primeros síntomas.
	Babosas, limacos				
Calabacín	Caracoles	7 Kg/ha	1-6	14 días	Aplicar al inicio de la infestación o a la aparición de los primeros síntomas.
	Babosas, limacos				(Uso menor por Jerarquía de cultivos). Aplicar al inicio de la infestación o a la aparición de los primeros síntomas.
Calabaza	Caracoles	7 Kg/ha	1-6	14 días	(Uso menor por Jerarquía de cultivos). Aplicar al inicio de la infestación o a la aparición de los primeros síntomas.
	Babosas, limacos				
Canónigo	Caracoles	7 Kg/ha	1-6	14 días	(Uso menor por Jerarquía de cultivos). Aplicar al inicio de la infestación o a la aparición de los primeros síntomas.
	Babosas, limacos				
Cebollino	Caracoles	7 Kg/ha	1-6	14 días	(Uso menor por Jerarquía de cultivos). Aplicar al inicio de la infestación o a la aparición de los primeros síntomas.
	Babosas, limacos				
Col de Bruselas	Caracoles	7 Kg/ha	1-6	14 días	(Uso menor por Jerarquía de cultivos). Aplicar al inicio de la infestación o a la aparición de los primeros síntomas.
	Babosas, limacos				
Coliflor	Caracoles	7 Kg/ha	1-6	14 días	(Uso menor por Jerarquía de cultivos). Aplicar al inicio de la infestación o a la aparición de los primeros síntomas.
	Babosas, limacos				
Colinabo	Caracoles	7 Kg/ha	1-6	14 días	(Uso menor por Jerarquía de cultivos). Aplicar al inicio de la infestación o a la aparición de los primeros síntomas.
	Babosas, limacos				
Eneldo	Caracoles	7 Kg/ha	1-6	14 días	(Uso menor por Jerarquía de cultivos). Aplicar al inicio de la infestación o a la aparición de los primeros síntomas.
	Babosas, limacos				
Escarola	Caracoles	7 Kg/ha	1-6	14 días	(Uso menor por Jerarquía de cultivos). Aplicar al inicio de la infestación o a la aparición de los primeros síntomas.
	Babosas, limacos				
Espárrago	Caracoles	7 Kg/ha	1-6	14 días	(Uso menor por Jerarquía de cultivos). Aplicar al inicio de la infestación o a la aparición de los primeros síntomas.
	Babosas, limacos				
Espinaca	Caracoles	7 Kg/ha	1-6	14 días	(Uso menor por Jerarquía de cultivos). Aplicar al inicio de la infestación o a la aparición de los primeros síntomas.
	Babosas, limacos				
Estragón	Caracoles	7 Kg/ha	1-6	14 días	(Uso menor por Jerarquía de cultivos). Aplicar al inicio de la infestación o a la aparición de los primeros síntomas.
	Babosas, limacos				
Frambueso	Caracoles	7 Kg/ha	1-6	14 días	(Uso menor por Jerarquía de cultivos). Aplicar al inicio de la infestación o a la aparición de los primeros síntomas.
	Babosas, limacos				
Fresal	Caracoles	7 Kg/ha	1-6	14 días	Aplicar al inicio de la infestación o a la aparición de los primeros síntomas.
	Babosas, limacos				
Grosellero	Caracoles	7 Kg/ha	1-6	14 días	(Uso menor por Jerarquía de cultivos). Aplicar al inicio de la infestación o a la aparición de los primeros síntomas.

Guisante verde	Babosas, limacos				
	Caracoles	7 Kg/ha	1-6	14 días	(Uso menor por Jerarquía de cultivos). Aplicar al inicio de la infestación o a la aparición de los primeros síntomas.
Haba verde	Babosas, limacos				
	Caracoles	7 Kg/ha	1-6	14 días	(Uso menor por Jerarquía de cultivos). Aplicar al inicio de la infestación o a la aparición de los primeros síntomas.
Hinojo	Babosas, limacos				
	Caracoles	7 Kg/ha	1-6	14 días	(Uso menor por Jerarquía de cultivos). Aplicar al inicio de la infestación o a la aparición de los primeros síntomas.
Judía verde	Babosas, limacos				
	Caracoles	7 Kg/ha	1-6	14 días	(Uso menor por Jerarquía de cultivos). Aplicar al inicio de la infestación o a la aparición de los primeros síntomas.
Laurel	Babosas, limacos				
	Caracoles	7 Kg/ha	1-6	14 días	Aplicar al inicio de la infestación o a la aparición de los primeros síntomas.
Lechuga	Babosas, limacos				
	Caracoles	7 Kg/ha	1-6	14 días	Aplicar al inicio de la infestación o a la aparición de los primeros síntomas.
Lenteja	Babosas, limacos				
	Caracoles	7 Kg/ha	1-6	14 días	(Uso menor por Jerarquía de cultivos). Aplicar al inicio de la infestación o a la aparición de los primeros síntomas.
Maíz dulce	Babosas, limacos				
	Caracoles	7 Kg/ha	1-6	14 días	(Uso menor por Jerarquía de cultivos). Aplicar al inicio de la infestación o a la aparición de los primeros síntomas.
Melón	Babosas, limacos				
	Caracoles	7 Kg/ha	1-6	14 días	Aplicar al inicio de la infestación o a la aparición de los primeros síntomas.
Mentas incluida hierbabuena	Babosas, limacos				
	Caracoles	7 Kg/ha	1-6	14 días	(Uso menor por Jerarquía de cultivos). Aplicar al inicio de la infestación o a la aparición de los primeros síntomas.
Orégano	Babosas, limacos				
	Caracoles	7 Kg/ha	1-6	14 días	(Uso menor por Jerarquía de cultivos). Aplicar al inicio de la infestación o a la aparición de los primeros síntomas.
Ornamentales herbáceas	Babosas, limacos				
	Caracoles	7 Kg/ha	1-6	14 días	Aplicar al inicio de la infestación o a la aparición de los primeros síntomas.
Pepino	Babosas, limacos				
	Caracoles	7 Kg/ha	1-6	14 días	(Uso menor por Jerarquía de cultivos). Aplicar al inicio de la infestación o a la aparición de los primeros síntomas.
Perejil	Babosas, limacos				
	Caracoles	7 Kg/ha	1-6	14 días	(Uso menor por Jerarquía de cultivos). Aplicar al inicio de la infestación o a la aparición de los primeros síntomas.
Pimiento	Babosas, limacos				
	Caracoles	7 Kg/ha	1-6	14 días	Aplicar al inicio de la infestación o a la aparición de los primeros síntomas.
Puerro	Babosas, limacos				
	Caracoles	7 Kg/ha	1-6	14 días	(Uso menor por Jerarquía de cultivos). Aplicar al inicio de la infestación o a la aparición de los primeros síntomas.
	Babosas, limacos				

Repollo	Caracoles	7 Kg/ha	1-6	14 días	(Uso menor por Jerarquía de cultivos). Aplicar al inicio de la infestación o a la aparición de los primeros síntomas.
	Babosas, limacos				
Romero	Caracoles	7 Kg/ha	1-6	14 días	(Uso menor por Jerarquía de cultivos). Aplicar al inicio de la infestación o a la aparición de los primeros síntomas.
	Babosas, limacos				
Rúcula	Caracoles	7 Kg/ha	1-6	14 días	(Uso menor por Jerarquía de cultivos). Aplicar al inicio de la infestación o a la aparición de los primeros síntomas.
	Babosas, limacos				
Salvia	Caracoles	7 Kg/ha	1-6	14 días	(Uso menor por Jerarquía de cultivos). Aplicar al inicio de la infestación o a la aparición de los primeros síntomas.
	Babosas, limacos				
Sandía	Caracoles	7 Kg/ha	1-6	14 días	Aplicar al inicio de la infestación o a la aparición de los primeros síntomas.
	Babosas, limacos				
Tomate	Caracoles	7 Kg/ha	1-6	14 días	Aplicar al inicio de la infestación o a la aparición de los primeros síntomas.
	Babosas, limacos				
Tomillo	Caracoles	7 Kg/ha	1-6	14 días	(Uso menor por Jerarquía de cultivos). Aplicar al inicio de la infestación o a la aparición de los primeros síntomas.
	Babosas, limacos				
Vid de mesa	Caracoles	7 Kg/ha	1-6	14 días	Aplicar al inicio de la infestación o a la aparición de los primeros síntomas.
	Babosas, limacos				
Vid de vinificación	Caracoles	7 Kg/ha	1-6	14 días	Aplicar al inicio de la infestación o a la aparición de los primeros síntomas.
	Babosas, limacos				
Zarzamoras	Caracoles	7 Kg/ha	1-6	14 días	(Uso menor por Jerarquía de cultivos). Aplicar al inicio de la infestación o a la aparición de los primeros síntomas.

Plazos de Seguridad (Protección del Consumidor)



USO	P.S. (días)
Acelga, Achicoria (hojas), Albahaca, Arándano, mirtilo, Berenjena, Berro de agua, Brécol, Calabacín, Calabaza, Canónigo, Cebollino, Col de Bruselas, Coliflor, Colinabo, Eneldo, Escarola, Espárrago, Espinaca, Estragón, Frambueso, Fresal, Grosellero, Guisante verde, Haba verde, Hinojo, Judía verde, Laurel, Lechuga, Lenteja, Maíz dulce, Melón, Mentas incluida hierbabuena, Orégano, Ornamentales herbáceas, Pepino, Perejil, Pimiento, Puerro, Repollo, Romero, Rúcula, Salvia, Sandía, Tomate, Tomillo, Vid de mesa, Vid de vinificación, Zarzamoras	1

Condiciones Generales de Uso



Tratamiento molusquicida al aire libre e invernadero con aplicador para fitosanitarios. Esparcir uniformemente. En la etiqueta se darán las indicaciones oportunas para la correcta aplicación del producto.

Clase de Usuario



Uso no profesional.

Mitigación de riesgos en la manipulación



Medidas adicionales de mitigación del riesgo:

- Se recomienda el uso de guantes de protección química durante el manejo del producto.
- En el caso de que sea necesario realizar tareas de mantenimiento en los cultivos tratados, se recomienda ropa de manga larga, pantalón largo y calzado cerrado.

Clasificaciones y Etiquetado



Clase y categoría de peligro (Humana)	
Pictograma	
Palabra de Advertencia	
Indicaciones de Peligro	PFBR -Conforme al artículo 47 del Reglamento 1107/2009 se autoriza como "Producto Fitosanitario de Bajo Riesgo"
Consejos de Prudencia	P262 -Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. P102 -Mantener fuera del alcance de los niños. (Únicamente para los envases destinados a jardinería exterior doméstica).
Clase y categoría de peligro (Medio Ambiental)	
Pictograma	
Palabra de Advertencia	
Indicaciones de Peligro	
Consejos de Prudencia	

Mitigación de riesgos ambientales



SPE 3: Para proteger los organismos acuáticos, respétese sin tratar una banda de seguridad de 5m hasta las masas de agua superficial.

Cualquier actividad que se realice con el presente preparado deberá tener en cuenta las condiciones establecidas en los artículos 31, 32 y 33 del Real Decreto 1311/2012, por el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios.

Eliminación del producto y/o caldo



SP1: NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE. (No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales/Evítese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos).

Gestión de Envases



Conforme a lo establecido en el Real Decreto 1055/2022, de 27 de diciembre, de envases y residuos de envases, en la etiqueta deberá figurar la siguiente frase: Deposite los residuos de envases en los puntos de recogida establecidos por los sistemas de responsabilidad ampliada del productor.



Otras Indicaciones reglamentarias

OBSERVACIONES (esta información no tiene que figurar en la etiqueta)

El producto VITROL GB cumple con el artículo 47 del Reglamento (CE) nº 1107/2009 y, por tanto, se puede autorizar como un producto fitosanitario de bajo riesgo.

En cumplimiento del artículo 45 del Reglamento (CE) nº 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2008 sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas (CLP), los usuarios intermedios o importadores de mezclas clasificadas para la salud humana o por sus peligros físicos, deberán enviar la información pertinente para la formulación de medidas preventivas y curativas, en particular para la respuesta sanitaria en caso de urgencia al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (Organismo designado a tal efecto según la Ley 8/2010 de 31 de marzo).

La Orden JUS/288/2021, de 25 de marzo, regula el procedimiento de comunicación de dicha información al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.

Para incluir el teléfono del Servicio de Información Toxicológica en la etiqueta, instrucciones de primeros auxilios, así como en el apartado 1.4 de la Ficha de Datos de Seguridad es obligatorio haber realizado previamente el alta de la ficha toxicológica según el procedimiento mencionado.

Lo que se informa a los efectos dispuestos en el Real Decreto y los Reglamentos antes citados.

INDICACIONES QUE DEBEN FIGURAR EN LA ETIQUETA

Autorizado para uso no profesional.

EUH401: A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso.