

Datos del Producto

Número de Registro: ES-01728 **Estado:** Vigente **Fechas** **Inscripción:** 08/05/2026 **Renovación:** **Caducidad:** 28/02/2028
Nombre Comercial: READY

Titular

SHARDA CROPCHEM ESPAÑA S.L.

Carril Condomina 3, Edif. Atalayas Business Center, Planta 12

30006 Murcia

(Murcia)

ESPAÑA

Fabricante

SHARDA CROPCHEM LTD.

2nd floor, Prime Business Park. Dashrathlal Joshi Road

400056 VileParleWest

(Mumbai)

INDIA

Composición

PROPAQUIZAFOP 10% [EC] P/V

Envases

Envases de COEX (HDPE/EVOH) y f-HDPE con rango de capacidad inferior a 1 l.
 Envases de COEX (HDPE/EVOH) y f-HDPE con rango de capacidad entre 1 y 20 l.

Usos y Dosis Autorizados

| USO | AGENTE | Dosis | Nº Aplic. | Intervalos | Vol. Caldo | Condic. Especifico |
|--|----------------------------|----------------|-----------|------------|----------------|---|
| Ámbito de Aplicación: Agrario - Tipo de Usuario: Profesional - Sistema de Cultivo: Aire libre | | | | | | |
| Adormidera | Ricio de cereales, Poaceae | 0,5 - 1 l/ha | 1 | -- | 200 - 400 l/ha | Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver condicionamiento general (*). Aplicar en Post-emergencia de las malas hierbas. BBCH 13-29. |
| | Gramíneas anuales | 0,5 - 1,5 l/ha | | | | Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver condicionamiento general (*). Contra Avena spp. and Lolium rigidum aplicar una dosis de 0,5-1 l/ha. Aplicar en Post-emergencia de las malas hierbas. BBCH 13-29. |
| | Gramíneas plurianuales | 1,5 - 2 l/ha | | | | Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver condicionamiento general (*). Aplicar en Post-emergencia de las malas hierbas. BBCH 13-29. |
| Ajo | Ricio de cereales, Poaceae | 0,5 - 1 l/ha | 1 | -- | 200 - 400 l/ha | (Uso menor por Jerarquía de cultivos). Aplicar en post-emergencia temprana de malas hierbas y post-emergencia del cultivo. |
| | Gramíneas anuales | 0,5 - 1,5 l/ha | | | | (Uso menor por Jerarquía de cultivos). Contra Avena spp. and Lolium rigidum aplicar una dosis de 0,5-1 l/ha. Aplicar en post-emergencia temprana de malas hierbas y post-emergencia del cultivo. |
| | Gramíneas plurianuales | 1,5 - 2 l/ha | | | | (Uso menor por Jerarquía de cultivos). Aplicar en post-emergencia temprana de malas hierbas y post-emergencia del cultivo. |
| Albaricoquero | Gramíneas anuales | 0,5 - 1,5 l/ha | 1 | -- | 200 - 400 l/ha | (Uso menor por Jerarquía de cultivos). Contra Avena spp. and Lolium rigidum aplicar una dosis de 0,5-1 l/ha. Aplicar en post-emergencia temprana de malas hierbas y post-emergencia del cultivo. |
| | Gramíneas plurianuales | 1,5 - 2 l/ha | | | | (Uso menor por Jerarquía de cultivos). Aplicar en post-emergencia temprana de malas hierbas y post-emergencia del cultivo. |
| | Ricio de cereales, Poaceae | 0,5 - 1 l/ha | | | | Aplicar en post-emergencia temprana de malas hierbas y post-emergencia del cultivo. |
| | Gramíneas anuales | 0,5 - 1,5 l/ha | | | | Contra Avena spp. and Lolium rigidum aplicar una dosis de 0,5-1 l/ha. Aplicar en post-emergencia temprana de malas hierbas y post-emergencia del cultivo. |

| | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------|---|----|----------------|---|
| Alfalfa | Gramíneas plurianuales | 1,5 l/ha | 1 | -- | 200 - 400 l/ha | Aplicar en post-emergencia temprana de malas hierbas y post-emergencia del cultivo. |
| | Gramíneas anuales | | | | | |
| Algodonero | Ricio de cereales, Poaceae | 0,75 - 1,2 l/ha | | | | (Uso menor por Jerarquía de cultivos). Aplicar en post-emergencia temprana de malas hierbas y post-emergencia del cultivo. |
| | Gramíneas plurianuales | 1,5 - 2 l/ha | 1 | -- | 200 - 400 l/ha | (Uso menor por Jerarquía de cultivos) En Sorghum halepense aplicar a una dosis de 1 - 1,5 l/ha. Aplicar en post-emergencia temprana de malas hierbas y post-emergencia del cultivo. |
| Alhova, fenogreco | Ricio de cereales, Poaceae | 0,5 - 1 l/ha | | | | Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver condicionamiento general (*). Exclusivamente para alimentación animal. Aplicar en post-emergencia de malas hierbas. BBCH 09-30. |
| | Gramíneas anuales | 0,5 - 1,5 l/ha | | | | Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver condicionamiento general (*). Exclusivamente para alimentación animal. Contra Avena spp. and Lolium rigidum aplicar una dosis de 0,5-1 l/ha. Aplicar en post-emergencia de malas hierbas. BBCH 09-30. |
| | Gramíneas plurianuales | 1,5 l/ha | 1 | -- | 200 - 400 l/ha | Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver condicionamiento general (*). Exclusivamente para alimentación animal. Aplicar en post-emergencia de malas hierbas. BBCH 09-30. |
| Almendro | Gramíneas anuales | 0,5 - 1,5 l/ha | | | | (Uso menor por Jerarquía de cultivos) Contra Avena spp. and Lolium rigidum aplicar una dosis de 0,5-1 l/ha. Aplicar en post-emergencia temprana de malas hierbas y post-emergencia del cultivo hasta prefloración (BBCH 59). |
| | Gramíneas plurianuales | 1,5 - 2 l/ha | 1 | -- | 200 - 400 l/ha | (Uso menor por Jerarquía de cultivos). Aplicar en post-emergencia temprana de malas hierbas y post-emergencia del cultivo hasta prefloración (BBCH 59). |
| Almorta | Ricio de cereales, Poaceae | 0,5 - 1 l/ha | | | | Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver condicionamiento general (*). Exclusivamente para alimentación animal. Aplicar en Post-emergencia de las malas hierbas. BBCH 13-29. |
| | Gramíneas anuales | 0,5 - 1,5 l/ha | | | | Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver condicionamiento general (*). Exclusivamente para alimentación animal. Contra Avena spp. and Lolium rigidum aplicar una dosis de 0,5-1 l/ha. |
| | Gramíneas plurianuales | 1,5 l/ha | 1 | -- | 200 - 400 l/ha | Aplicar en Post-emergencia de las malas hierbas. BBCH 13-29. Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver condicionamiento general (*). Exclusivamente para alimentación animal. |
| Altramuz | Ricio de cereales, Poaceae | 0,5 - 1 l/ha | | | | Aplicar en Post-emergencia de las malas hierbas. BBCH 13-29. |
| | Gramíneas anuales | 0,5 - 1,5 l/ha | | | | (Uso menor por Jerarquía de cultivos) Contra Avena spp. and Lolium rigidum aplicar una dosis de 0,5-1 l/ha. Aplicar en post-emergencia temprana de malas hierbas y post-emergencia del cultivo. |
| | Gramíneas plurianuales | 1,5 - 2 l/ha | 1 | -- | 200 - 400 l/ha | (Uso menor por Jerarquía de cultivos). Aplicar en post-emergencia temprana de malas hierbas y post-emergencia del cultivo. |
| Apionabo | Ricio de cereales, Poaceae | 0,5 - 1 l/ha | | | | Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver condicionamiento general (*). Aplicar en Post-emergencia de las malas hierbas. BBCH 13-29. |
| | Gramíneas anuales | 0,5 - 1,5 l/ha | | | | Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver condicionamiento general (*). Contra Avena spp. and Lolium rigidum aplicar una dosis de 0,5-1 l/ha. |
| | Gramíneas plurianuales | 1,5 l/ha | 1 | -- | 200 - 400 l/ha | Aplicar en Post-emergencia de las malas hierbas. BBCH 13-29. |
| Arbustos y pequeños árboles ornamentales | Gramíneas anuales | 0,5 - 1,5 l/ha | | | | Contra Avena spp. and Lolium rigidum aplicar una dosis de 0,5-1 l/ha. Aplicar en post-emergencia temprana de malas hierbas y post-emergencia del cultivo. |
| | Gramíneas plurianuales | 1,5 - 2 l/ha | 1 | -- | 200 - 400 l/ha | Aplicar en post-emergencia temprana de malas hierbas y post-emergencia del cultivo. |
| Arroz | Arroz salvaje, Oryza sativa | | | | | Aplicar con el suelo húmedo. Inundar de nuevo a las 24-48 h de la aplicación. Dejar al menos 4 días entre la aplicación y la siembra. |
| | Pies de gallina, Echinochloa spp. | 1,2 - 1,5 l/ha | 1 | -- | 200 - 400 l/ha | Aplicar en post-emergencia temprana de malas hierbas y post-emergencia del cultivo. |
| Avellano | Gramíneas anuales | 0,5 - 1,5 l/ha | | | | (Uso menor por Jerarquía de cultivos) Contra Avena spp. and Lolium rigidum aplicar una dosis de 0,5-1 l/ha. Aplicar en post-emergencia temprana de malas hierbas y post-emergencia del cultivo hasta prefloración (BBCH 59). |
| | Gramíneas plurianuales | 1,5 - 2 l/ha | 1 | -- | 200 - 400 l/ha | (Uso menor por Jerarquía de cultivos). Aplicar en post-emergencia temprana de malas hierbas y post-emergencia del cultivo hasta prefloración (BBCH 59). |
| | Ricio de cereales, Poaceae | 0,5 - 1 l/ha | | | | Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver condicionamiento general (*). Aplicar en post-emergencia temprana de malas hierbas y post-emergencia del cultivo. |

| | | | | | | |
|-----------------|----------------------------|----------------|---|----|----------------|--|
| | Gramíneas anuales | 0,5 - 1,5 l/ha | | | | Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver condicionamiento general (*). Contra Avena spp. and Lolium rigidum aplicar una dosis de 0,5-1 l/ha. Aplicar en post-emergencia temprana de malas hierbas y post-emergencia del cultivo. |
| Batata, boniato | Gramíneas plurianuales | 1,5 l/ha | 1 | -- | 200 - 400 l/ha | Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver condicionamiento general (*). Aplicar en post-emergencia temprana de malas hierbas y post-emergencia del cultivo. |
| | Ricio de cereales, Poaceae | 0,5 - 1 l/ha | | | | (Uso menor por Jerarquía de cultivos). Aplicar en post-emergencia temprana de malas hierbas y post-emergencia del cultivo. |
| | Gramíneas anuales | 0,5 - 1,5 l/ha | | | | (Uso menor por Jerarquía de cultivos) Contra Avena spp. and Lolium rigidum aplicar una dosis de 0,5-1 l/ha. Aplicar en post-emergencia temprana de malas hierbas y post-emergencia del cultivo. |
| Berenjena | Gramíneas plurianuales | 1,5 - 2 l/ha | 1 | -- | 200 - 400 l/ha | (Uso menor por Jerarquía de cultivos). Aplicar en post-emergencia temprana de malas hierbas y post-emergencia del cultivo. |
| | Gramíneas anuales | | | | | |
| Brécol | Ricio de cereales, Poaceae | 0,5 l/ha | 1 | -- | 200 - 400 l/ha | (Uso menor por Jerarquía de cultivos). Aplicar en post-emergencia temprana de malas hierbas y post-emergencia del cultivo. |
| | Ricio de cereales, Poaceae | 0,5 - 1 l/ha | | | | (Uso menor por Jerarquía de cultivos). Aplicar en post-emergencia temprana de malas hierbas y post-emergencia del cultivo. |
| | Gramíneas anuales | 0,5 - 1,5 l/ha | | | | (Uso menor por Jerarquía de cultivos) Contra Avena spp. and Lolium rigidum aplicar una dosis de 0,5-1 l/ha. Aplicar en post-emergencia temprana de malas hierbas y post-emergencia del cultivo. |
| Calabaza | Gramíneas plurianuales | 1,5 - 2 l/ha | 1 | -- | 200 - 400 l/ha | (Uso menor por Jerarquía de cultivos). Aplicar en post-emergencia temprana de malas hierbas y post-emergencia del cultivo. |
| | Gramíneas anuales | 0,5 - 1,5 l/ha | | | | Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver condicionamiento general (*). Contra Avena spp. and Lolium rigidum aplicar una dosis de 0,5-1 l/ha. Aplicar en post-emergencia temprana de malas hierbas. BBCH 13-29. |
| Caqui | Gramíneas plurianuales | 1,5 - 2 l/ha | 1 | -- | 200 - 400 l/ha | Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver condicionamiento general (*). Aplicar en post-emergencia temprana de malas hierbas. BBCH 13-29. |
| | Gramíneas anuales | 0,5 - 1,5 l/ha | | | | (Uso menor por Jerarquía de cultivos) Contra Avena spp. and Lolium rigidum aplicar una dosis de 0,5-1 l/ha. Aplicar en post-emergencia temprana de malas hierbas y post-emergencia del cultivo hasta prefloración (BBCH 59). |
| Castaño | Gramíneas plurianuales | 1,5 - 2 l/ha | 1 | -- | 200 - 400 l/ha | (Uso menor por Jerarquía de cultivos). Aplicar en post-emergencia temprana de malas hierbas y post-emergencia del cultivo hasta prefloración (BBCH 59). |
| | Ricio de cereales, Poaceae | 0,5 - 1 l/ha | | | | Aplicar en post-emergencia temprana de malas hierbas y post-emergencia del cultivo. |
| | Gramíneas anuales | 0,5 - 1,5 l/ha | | | | Contra Avena spp. and Lolium rigidum aplicar una dosis de 0,5-1 l/ha. Aplicar en post-emergencia temprana de malas hierbas y post-emergencia del cultivo. |
| Cebolla | Gramíneas plurianuales | 1,5 - 2 l/ha | 1 | -- | 200 - 400 l/ha | Aplicar en post-emergencia temprana de malas hierbas y post-emergencia del cultivo. |
| | Gramíneas anuales | 0,5 - 1,5 l/ha | | | | (Uso menor por Jerarquía de cultivos) Contra Avena spp. and Lolium rigidum aplicar una dosis de 0,5-1 l/ha. Aplicar en post-emergencia temprana de malas hierbas y post-emergencia del cultivo hasta prefloración (BBCH 59). |
| Cerezo | Gramíneas plurianuales | 1,5 - 2 l/ha | 1 | -- | 200 - 400 l/ha | (Uso menor por Jerarquía de cultivos). Aplicar en post-emergencia temprana de malas hierbas y post-emergencia del cultivo hasta prefloración (BBCH 59). |
| | Ricio de cereales, Poaceae | 0,5 - 1 l/ha | | | | (Uso menor por Jerarquía de cultivos). Aplicar en post-emergencia temprana de malas hierbas y post-emergencia del cultivo. |
| | Gramíneas anuales | 0,5 - 1,5 l/ha | | | | (Uso menor por Jerarquía de cultivos) Contra Avena spp. and Lolium rigidum aplicar una dosis de 0,5-1 l/ha. Aplicar en post-emergencia temprana de malas hierbas y post-emergencia del cultivo. |
| Chalote | Gramíneas plurianuales | 1,5 - 2 l/ha | 1 | -- | 200 - 400 l/ha | (Uso menor por Jerarquía de cultivos). Aplicar en post-emergencia temprana de malas hierbas y post-emergencia del cultivo. |
| | Ricio de cereales, Poaceae | 0,5 - 1 l/ha | | | | Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver condicionamiento general (*). Aplicar en post-emergencia temprana de malas hierbas y post-emergencia del cultivo. |
| | Gramíneas anuales | 0,5 - 1,5 l/ha | | | | Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver condicionamiento general (*). Contra Avena spp. and Lolium rigidum aplicar una dosis de 0,5-1 l/ha. Aplicar en post-emergencia temprana de malas hierbas y post-emergencia del cultivo. |
| Chirivía | Gramíneas plurianuales | 1,5 l/ha | 1 | -- | 200 - 400 l/ha | Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver condicionamiento general (*). Aplicar en post-emergencia temprana de malas hierbas y post-emergencia del cultivo. |
| | Gramíneas anuales | 0,5 - 1,5 l/ha | | | | (Uso menor por Jerarquía de cultivos) Contra Avena spp. and Lolium rigidum aplicar una dosis de 0,5-1 l/ha. Aplicar en post-emergencia temprana de malas hierbas y post-emergencia del cultivo hasta prefloración (BBCH 59). |
| Ciruelo | Gramíneas plurianuales | 1,5 - 2 l/ha | 1 | -- | 200 - 400 l/ha | (Uso menor por Jerarquía de cultivos). Aplicar en post-emergencia temprana de malas hierbas y post-emergencia del cultivo hasta prefloración (BBCH 59). |

| | | | | | | |
|--------------------|----------------------------|-----------------|---|----|----------------|--|
| | Gramíneas anuales | 0,5 - 1,5 l/ha | | | | Contra Avena spp. and Lolium rigidum aplicar una dosis de 0,5-1 l/ha. Aplicar en post-emergencia temprana de malas hierbas y post-emergencia del cultivo hasta prefloración (BBCH 51). |
| Cítricos | Gramíneas plurianuales | 1,5 - 2 l/ha | 1 | -- | 200 - 400 l/ha | Aplicar en post-emergencia temprana de malas hierbas y post-emergencia del cultivo hasta prefloración (BBCH 51). |
| | Gramíneas anuales | | | | | |
| Coliflor | Ricio de cereales, Poaceae | 0,5 l/ha | 1 | -- | 200 - 400 l/ha | (Uso menor por Jerarquía de cultivos). Aplicar en post-emergencia temprana de malas hierbas y post-emergencia del cultivo. |
| | Ricio de cereales, Poaceae | 0,5 - 1 l/ha | | | | Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver condicionamiento general (*). Aplicar en post-emergencia temprana de malas hierbas y post-emergencia del cultivo. |
| | Gramíneas anuales | 0,5 - 1,5 l/ha | | | | Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver condicionamiento general (*). Contra Avena spp. and Lolium rigidum aplicar una dosis de 0,5-1 l/ha. |
| Colinabo | Gramíneas plurianuales | 1,5 l/ha | 1 | -- | 200 - 400 l/ha | Aplicar en post-emergencia temprana de malas hierbas y post-emergencia del cultivo. Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver condicionamiento general (*). Aplicar en post-emergencia temprana de malas hierbas y post-emergencia del cultivo. |
| | Ricio de cereales, Poaceae | 0,5 - 1 l/ha | | | | (Uso menor por Jerarquía de cultivos). Aplicar en post-emergencia temprana de malas hierbas y post-emergencia del cultivo. |
| | Gramíneas anuales | 0,5 - 1,5 l/ha | | | | (Uso menor por Jerarquía de cultivos) |
| Colza | Gramíneas plurianuales | 1,5 - 2 l/ha | 1 | -- | 200 - 400 l/ha | Contra Avena spp. and Lolium rigidum aplicar una dosis de 0,5-1 l/ha. Aplicar en post-emergencia temprana de malas hierbas y post-emergencia del cultivo. (Uso menor por Jerarquía de cultivos). |
| | Gramíneas anuales | 0,5 - 1,5 l/ha | | | | Aplicar en post-emergencia temprana de malas hierbas y post-emergencia del cultivo. |
| | Gramíneas plurianuales | 1,5 - 2 l/ha | 1 | -- | 200 - 400 l/ha | Contra Avena spp. and Lolium rigidum aplicar una dosis de 0,5-1 l/ha. Exclusivamente para uso ornamental. Aplicar en post-emergencia temprana de malas hierbas y post-emergencia del cultivo. Exclusivamente para uso ornamental. |
| | Gramíneas anuales | | | | | |
| | Gramíneas plurianuales | | | | | |
| Espárrago | Ricio de cereales, Poaceae | 0,8 - 1,2 l/ha | 1 | -- | 200 - 400 l/ha | (Uso menor por Jerarquía de cultivos). Aplicar en post-emergencia temprana de malas hierbas y post-emergencia del cultivo. |
| | Ricio de cereales, Poaceae | 0,5 - 1 l/ha | | | | Exclusivamente viveros. Aplicar en post-emergencia temprana de malas hierbas y post-emergencia del cultivo. |
| | Gramíneas anuales | 0,5 - 1,5 l/ha | | | | |
| Especies vegetales | Gramíneas plurianuales | 1,5 - 2 l/ha | 1 | -- | 200 - 400 l/ha | Contra Avena spp. and Lolium rigidum aplicar una dosis de 0,5-1 l/ha. Exclusivamente viveros. Aplicar en post-emergencia temprana de malas hierbas y post-emergencia del cultivo. |
| | Gramíneas anuales | 0,5 - 1,5 l/ha | | | | Contra Avena spp. and Lolium rigidum aplicar una dosis de 0,5-1 l/ha. Exclusivamente para uso ornamental. |
| | Gramíneas plurianuales | 1,5 - 2 l/ha | 1 | -- | 200 - 400 l/ha | Aplicar en post-emergencia temprana de malas hierbas y post-emergencia del cultivo. Exclusivamente para uso ornamental. |
| Fronosas | Gramíneas plurianuales | 1,5 - 2 l/ha | 1 | -- | 200 - 400 l/ha | Aplicar en post-emergencia temprana de malas hierbas y post-emergencia del cultivo. |
| | Gramíneas anuales | 0,5 - 1,5 l/ha | | | | Contra Avena spp. and Lolium rigidum aplicar una dosis de 0,5-1 l/ha. Aplicar en post-emergencia temprana de malas hierbas y post-emergencia del cultivo. |
| Frutales de pepita | Gramíneas plurianuales | 1,5 - 2 l/ha | 1 | -- | 200 - 400 l/ha | Aplicar en post-emergencia temprana de malas hierbas y post-emergencia del cultivo. |
| | Ricio de cereales, Poaceae | 0,5 - 1 l/ha | | | | Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver condicionamiento general (*). Aplicar en post-emergencia temprana de malas hierbas y post-emergencia del cultivo. |
| | Gramíneas anuales | 0,5 - 1,5 l/ha | | | | Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver condicionamiento general (*). Contra Avena spp. and Lolium rigidum aplicar una dosis de 0,5-1 l/ha. |
| Garbanzo verde | Gramíneas plurianuales | 1,5 - 2 l/ha | 1 | -- | 200 - 400 l/ha | Aplicar en post-emergencia temprana de malas hierbas y post-emergencia del cultivo. Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver condicionamiento general (*). Aplicar en post-emergencia temprana de malas hierbas y post-emergencia del cultivo. |
| | Ricio de cereales, Poaceae | 0,5 - 1 l/ha | | | | (Uso menor por Jerarquía de cultivos). Aplicar en post-emergencia temprana de malas hierbas y post-emergencia del cultivo. |
| | Gramíneas anuales | 0,5 - 1,5 l/ha | | | | (Uso menor por Jerarquía de cultivos) |
| Garbanzo | Gramíneas plurianuales | 1,5 - 2 l/ha | 1 | -- | 200 - 400 l/ha | Contra Avena spp. and Lolium rigidum aplicar una dosis de 0,5-1 l/ha. Aplicar en post-emergencia temprana de malas hierbas y post-emergencia del cultivo. (Uso menor por Jerarquía de cultivos). |
| | Gramíneas anuales | | | | | Aplicar en post-emergencia temprana de malas hierbas y post-emergencia del cultivo. |
| | Ricio de cereales, Poaceae | 0,75 - 1,2 l/ha | | | | Aplicar en post-emergencia temprana de malas hierbas y post-emergencia del cultivo. |

| | | | | | | |
|------------------------|----------------------------|----------------|---|----|----------------|--|
| Girasol | Gramíneas plurianuales | 1,5 - 2 l/ha | 1 | -- | 200 - 400 l/ha | En Sorghum halepense aplicar a una dosis de 1 - 1,5 l/ha. Aplicar en post-emergencia temprana de malas hierbas y post-emergencia del cultivo. |
| | Ricio de cereales, Poaceae | 0,5 - 1 l/ha | | | | (Uso menor por Jerarquía de cultivos). Aplicar en post-emergencia temprana de malas hierbas y post-emergencia del cultivo. |
| Guisante para grano | Gramíneas anuales | 0,5 - 1,5 l/ha | | | | (Uso menor por Jerarquía de cultivos) Contra Avena spp. and Lolium rigidum aplicar una dosis de 0,5-1 l/ha. Aplicar en post-emergencia temprana de malas hierbas y post-emergencia del cultivo. |
| | Gramíneas plurianuales | 1,5 - 2 l/ha | 1 | -- | 200 - 400 l/ha | (Uso menor por Jerarquía de cultivos). Aplicar en post-emergencia temprana de malas hierbas y post-emergencia del cultivo. |
| Guisante verde | Ricio de cereales, Poaceae | 0,5 - 1 l/ha | | | | Guisante con vaina: Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver condicionamiento general (*). Aplicar en post-emergencia temprana de malas hierbas y post-emergencia del cultivo. |
| | Gramíneas anuales | 0,5 - 1,5 l/ha | | | | Contra Avena spp. and Lolium rigidum aplicar una dosis de 0,5-1 l/ha. Guisante con vaina: Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver condicionamiento general (*). Aplicar en post-emergencia temprana de malas hierbas y post-emergencia del cultivo. |
| Haba para grano | Gramíneas plurianuales | 1,5 - 2 l/ha | 1 | -- | 200 - 400 l/ha | Guisante con vaina: Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver condicionamiento general (*). Aplicar en post-emergencia temprana de malas hierbas y post-emergencia del cultivo. |
| | Ricio de cereales, Poaceae | 0,5 - 1 l/ha | | | | Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver condicionamiento general (*). Aplicar en post-emergencia temprana de malas hierbas y post-emergencia del cultivo. |
| Haba verde | Gramíneas anuales | 0,5 - 1,5 l/ha | | | | Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver condicionamiento general (*). Contra Avena spp. and Lolium rigidum aplicar una dosis de 0,5-1 l/ha. Aplicar en post-emergencia temprana de malas hierbas y post-emergencia del cultivo. |
| | Gramíneas plurianuales | 1,5 - 2 l/ha | 1 | -- | 200 - 400 l/ha | Uso menor por jerarquía de cultivos. Aplicar en post-emergencia temprana de malas hierbas y post-emergencia del cultivo. |
| Judía para grano | Ricio de cereales, Poaceae | 0,5 - 1 l/ha | | | | Uso menor por jerarquía de cultivos. Aplicar en post-emergencia temprana de malas hierbas y post-emergencia del cultivo. |
| | Gramíneas anuales | 0,5 - 1,5 l/ha | | | | Contra Avena spp. and Lolium rigidum aplicar una dosis de 0,5-1 l/ha. Aplicar en post-emergencia temprana de malas hierbas y post-emergencia del cultivo. |
| Judía verde | Gramíneas plurianuales | 1,5 - 2 l/ha | 1 | -- | 200 - 400 l/ha | (Uso menor por Jerarquía de cultivos). Aplicar en post-emergencia temprana de malas hierbas y post-emergencia del cultivo. |
| | Ricio de cereales, Poaceae | 0,5 - 1 l/ha | | | | (Uso menor por Jerarquía de cultivos) Aplicar en post-emergencia temprana de malas hierbas y post-emergencia del cultivo. |
| Leguminosas forrajeras | Gramíneas anuales | 0,5 - 1,5 l/ha | | | | Contra Avena spp. and Lolium rigidum aplicar una dosis de 0,5-1 l/ha. Aplicar en post-emergencia temprana de malas hierbas y post-emergencia del cultivo. |
| | Gramíneas plurianuales | 1,5 l/ha | 1 | -- | 200 - 400 l/ha | (Uso menor por Jerarquía de cultivos). Aplicar en post-emergencia temprana de malas hierbas y post-emergencia del cultivo. |
| Lenteja | Ricio de cereales, Poaceae | 0,5 - 1 l/ha | | | | Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver condicionamiento general (*). Aplicar en post-emergencia de malas hierbas. BBCH 09-30. |
| | Gramíneas anuales | 0,5 - 1,5 l/ha | | | | Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver condicionamiento general (*). Contra Avena spp. and Lolium rigidum aplicar una dosis de 0,5-1 l/ha. Aplicar en post-emergencia temprana de malas hierbas. BBCH 09-30. |
| Melocotonero | Gramíneas plurianuales | 1,5 - 2 l/ha | 1 | -- | 200 - 400 l/ha | Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver condicionamiento general (*). Aplicar en post-emergencia temprana de malas hierbas y post-emergencia del cultivo. |
| | Gramíneas anuales | 0,5 - 1,5 l/ha | | | | (Uso menor por Jerarquía de cultivos). Aplicar en post-emergencia temprana de malas hierbas y post-emergencia del cultivo. |

| | | | | | | |
|------------------------|----------------------------|----------------|---|----|----------------|--|
| Melón | Ricio de cereales, Poaceae | 0,5 - 1 l/ha | | | | Aplicar en post-emergencia temprana de malas hierbas y post-emergencia del cultivo. |
| | Gramíneas anuales | 0,5 - 1,5 l/ha | | | | Contra Avena spp. and Lolium rigidum aplicar una dosis de 0,5-1 l/ha. |
| | Gramíneas plurianuales | 1,5 - 2 l/ha | 1 | -- | 200 - 400 l/ha | Aplicar en post-emergencia temprana de malas hierbas y post-emergencia del cultivo. |
| Nabo | Ricio de cereales, Poaceae | 0,5 - 1 l/ha | | | | Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver condicionamiento general (*). Aplicar en post-emergencia temprana de malas hierbas y post-emergencia del cultivo. |
| | Gramíneas anuales | 0,5 - 1,5 l/ha | | | | Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver condicionamiento general (*). Contra Avena spp. and Lolium rigidum aplicar una dosis de 0,5-1 l/ha. |
| | Gramíneas plurianuales | 1,5 l/ha | 1 | -- | 200 - 400 l/ha | Aplicar en post-emergencia temprana de malas hierbas y post-emergencia del cultivo. Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver condicionamiento general (*). (Uso menor por Jerarquía de cultivos) |
| Nogal | Gramíneas anuales | 0,5 - 1,5 l/ha | | | | Contra Avena spp. and Lolium rigidum aplicar una dosis de 0,5-1 l/ha. |
| | Gramíneas plurianuales | 1,5 - 2 l/ha | 1 | -- | 200 - 400 l/ha | Aplicar en post-emergencia temprana de malas hierbas y post-emergencia del cultivo hasta prefloración (BBCH 59). |
| | Gramíneas anuales | 0,5 - 1,5 l/ha | | | | Aplicar en post-emergencia temprana de malas hierbas y post-emergencia del cultivo hasta prefloración (BBCH 59). |
| Olivo | Gramíneas plurianuales | 1,5 - 2 l/ha | 1 | -- | 200 - 400 l/ha | Aplicar en post-emergencia temprana de malas hierbas y post-emergencia del cultivo hasta prefloración (BBCH 59). |
| | Ricio de cereales, Poaceae | 0,5 - 1 l/ha | | | | Aplicar en post-emergencia temprana de malas hierbas y post-emergencia del cultivo. |
| | Gramíneas anuales | 0,5 - 1,5 l/ha | | | | Contra Avena spp. and Lolium rigidum aplicar una dosis de 0,5-1 l/ha. |
| Ornamentales herbáceas | Gramíneas plurianuales | 1,5 - 2 l/ha | 1 | -- | 200 - 400 l/ha | Aplicar en post-emergencia temprana de malas hierbas y post-emergencia del cultivo. |
| | Gramíneas anuales | 0,5 - 1,5 l/ha | | | | Contra Avena spp. and Lolium rigidum aplicar una dosis de 0,5-1 l/ha. |
| | Gramíneas plurianuales | 1,5 - 2 l/ha | 1 | -- | 200 - 400 l/ha | Aplicar en post-emergencia temprana de malas hierbas y post-emergencia del cultivo. |
| Palmáceas | Gramíneas anuales | 0,5 - 1,5 l/ha | | | | Uso menor por jerarquía de cultivos. Exclusivamente para uso ornamental (no apto para consumo humano). |
| | Gramíneas plurianuales | 1,5 - 2 l/ha | 1 | -- | 200 - 400 l/ha | Contra Avena spp. and Lolium rigidum aplicar una dosis de 0,5-1 l/ha. |
| | Gramíneas anuales | 0,5 - 1,5 l/ha | | | | Aplicar en post-emergencia temprana de malas hierbas y post-emergencia del cultivo. |
| Palmera datilera | Gramíneas plurianuales | 1,5 - 2 l/ha | 1 | -- | 200 - 400 l/ha | Uso menor por jerarquía de cultivos. Exclusivamente para uso ornamental (no apto para consumo humano). |
| | Ricio de cereales, Poaceae | 0,5 - 1 l/ha | | | | Aplicar en post-emergencia temprana de malas hierbas y post-emergencia del cultivo. |
| | Gramíneas anuales | 0,5 - 1,5 l/ha | | | | Contra Avena spp. and Lolium rigidum aplicar una dosis de 0,5-1 l/ha. |
| Patata | Gramíneas plurianuales | 1,5 l/ha | 1 | -- | 200 - 400 l/ha | Aplicar en post-emergencia temprana de malas hierbas y post-emergencia del cultivo. |
| | Gramíneas anuales | 0,5 - 1,5 l/ha | | | | Contra Avena spp. and Lolium rigidum aplicar una dosis de 0,5-1 l/ha. |
| | Gramíneas plurianuales | 1,5 - 2 l/ha | 1 | -- | 200 - 400 l/ha | Aplicar en post-emergencia temprana de malas hierbas y post-emergencia del cultivo hasta prefloración (BBCH 59). |
| Pinos | Gramíneas anuales | 0,5 - 1,5 l/ha | | | | Aplicar en post-emergencia temprana de malas hierbas y post-emergencia del cultivo hasta prefloración (BBCH 59). |
| | Gramíneas plurianuales | 1,5 - 2 l/ha | 1 | -- | 200 - 400 l/ha | Aplicar en post-emergencia temprana de malas hierbas y post-emergencia del cultivo hasta prefloración (BBCH 59). |
| | Gramíneas anuales | 0,5 - 1,5 l/ha | | | | (Uso menor por Jerarquía de cultivos) Contra Avena spp. and Lolium rigidum aplicar una dosis de 0,5-1 l/ha. |
| Pistachero | Gramíneas plurianuales | 1,5 - 2 l/ha | 1 | -- | 200 - 400 l/ha | Aplicar en post-emergencia temprana de malas hierbas y post-emergencia del cultivo hasta prefloración (BBCH 59). |
| | Ricio de cereales, Poaceae | 0,5 - 1 l/ha | | | | Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver condicionamiento general (*). |
| | Gramíneas anuales | 0,5 - 1,5 l/ha | | | | Aplicar en post-emergencia temprana de malas hierbas y post-emergencia del cultivo. |
| Rábano | Gramíneas plurianuales | 1,5 l/ha | 1 | -- | 200 - 400 l/ha | Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver condicionamiento general (*). |
| | Ricio de cereales, Poaceae | 0,5 - 1 l/ha | | | | Aplicar en post-emergencia temprana de malas hierbas y post-emergencia del cultivo. |
| | Gramíneas anuales | 0,5 - 1,5 l/ha | | | | (Uso menor por Jerarquía de cultivos). |

| | | | | | | |
|---------------------|----------------------------|-----------------|---|----|----------------|--|
| | Gramíneas anuales | 0,5 - 1,5 l/ha | | | | (Uso menor por Jerarquía de cultivos) Contra Avena spp. and Lolium rigidum aplicar una dosis de 0,5-1 l/ha. Aplicar en post-emergencia temprana de malas hierbas y post-emergencia del cultivo. |
| Rafz de perejil | Gramíneas plurianuales | 1,5 l/ha | 1 | -- | 200 - 400 l/ha | (Uso menor por Jerarquía de cultivos). Aplicar en post-emergencia temprana de malas hierbas y post-emergencia del cultivo. |
| | Ricio de cereales, Poaceae | 0,5 - 1 l/ha | | | | Aplicar en post-emergencia temprana de malas hierbas y post-emergencia del cultivo. |
| | Gramíneas anuales | 0,5 - 1,5 l/ha | | | | Contra Avena spp. and Lolium rigidum aplicar una dosis de 0,5-1 l/ha. Aplicar en post-emergencia temprana de malas hierbas y post-emergencia del cultivo. |
| Remolacha azucarera | Gramíneas plurianuales | 1,5 - 2 l/ha | 1 | -- | 200 - 400 l/ha | Aplicar en post-emergencia temprana de malas hierbas y post-emergencia del cultivo. |
| | Ricio de cereales, Poaceae | 0,5 - 1 l/ha | | | | (Uso menor por Jerarquía de cultivos). Aplicar en post-emergencia temprana de malas hierbas y post-emergencia del cultivo. |
| | Gramíneas anuales | 0,5 - 1,5 l/ha | | | | (Uso menor por Jerarquía de cultivos) Contra Avena spp. and Lolium rigidum aplicar una dosis de 0,5-1 l/ha. Aplicar en post-emergencia temprana de malas hierbas y post-emergencia del cultivo. |
| Remolacha forrajera | Gramíneas plurianuales | 1,5 - 2 l/ha | 1 | -- | 200 - 400 l/ha | (Uso menor por Jerarquía de cultivos). Aplicar en post-emergencia temprana de malas hierbas y post-emergencia del cultivo. |
| | Gramíneas anuales | | | | | |
| Repollo | Ricio de cereales, Poaceae | 0,5 l/ha | 1 | -- | 200 - 400 l/ha | (Uso menor por Jerarquía de cultivos). Aplicar en post-emergencia temprana de malas hierbas y post-emergencia del cultivo. |
| | Ricio de cereales, Poaceae | 0,5 - 1 l/ha | | | | Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver condicionamiento general (*). Aplicar en post-emergencia temprana de malas hierbas y post-emergencia del cultivo. |
| | Gramíneas anuales | 0,5 - 1,5 l/ha | | | | Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver condicionamiento general (*). Contra Avena spp. and Lolium rigidum aplicar una dosis de 0,5-1 l/ha. Aplicar en post-emergencia temprana de malas hierbas y post-emergencia del cultivo. |
| Salsifí | Gramíneas plurianuales | 1,5 l/ha | 1 | -- | 200 - 400 l/ha | Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver condicionamiento general (*). Aplicar en post-emergencia temprana de malas hierbas y post-emergencia del cultivo. |
| | Ricio de cereales, Poaceae | 0,5 - 1 l/ha | | | | Aplicar en post-emergencia temprana de malas hierbas y post-emergencia del cultivo. |
| | Gramíneas anuales | 0,5 - 1,5 l/ha | | | | Contra Avena spp. and Lolium rigidum aplicar una dosis de 0,5-1 l/ha. Aplicar en post-emergencia temprana de malas hierbas y post-emergencia del cultivo. |
| Sandía | Gramíneas plurianuales | 1,5 - 2 l/ha | 1 | -- | 200 - 400 l/ha | Aplicar en post-emergencia temprana de malas hierbas y post-emergencia del cultivo. |
| | Gramíneas anuales | | | | | |
| | Ricio de cereales, Poaceae | 0,75 - 1,2 l/ha | | | | (Uso menor por Jerarquía de cultivos). Aplicar en post-emergencia temprana de malas hierbas y post-emergencia del cultivo. |
| Soja | Gramíneas plurianuales | 1,5 - 2 l/ha | 1 | -- | 200 - 400 l/ha | (Uso menor por Jerarquía de cultivos) En Sorghum halepense aplicar a dosis de 1 - 1,5 l/ha. Aplicar en post-emergencia temprana de malas hierbas y post-emergencia del cultivo. |
| | Ricio de cereales, Poaceae | 0,5 - 1 l/ha | | | | (Uso menor por Jerarquía de cultivos). Aplicar en post-emergencia temprana de malas hierbas y post-emergencia del cultivo. |
| | Gramíneas anuales | 0,5 - 1,5 l/ha | | | | (Uso menor por Jerarquía de cultivos) Contra Avena spp. and Lolium rigidum aplicar una dosis de 0,5-1 l/ha. Aplicar en post-emergencia temprana de malas hierbas y post-emergencia del cultivo. |
| Tabaco | Gramíneas plurianuales | 1,5 - 2 l/ha | 1 | -- | 200 - 400 l/ha | (Uso menor por Jerarquía de cultivos). Aplicar en post-emergencia temprana de malas hierbas y post-emergencia del cultivo. |
| | Ricio de cereales, Poaceae | 0,5 - 1 l/ha | | | | Aplicar en post-emergencia temprana de malas hierbas y post-emergencia del cultivo. |
| | Gramíneas anuales | 0,5 - 1,5 l/ha | | | | Contra Avena spp. and Lolium rigidum aplicar una dosis de 0,5-1 l/ha. Aplicar en post-emergencia temprana de malas hierbas y post-emergencia del cultivo. |
| Tomate | Gramíneas plurianuales | 1,5 - 2 l/ha | 1 | -- | 200 - 400 l/ha | Aplicar en post-emergencia temprana de malas hierbas y post-emergencia del cultivo. |
| | Ricio de cereales, Poaceae | 0,5 - 1 l/ha | | | | Aplicar en post-emergencia temprana de malas hierbas y post-emergencia del cultivo. |
| | Gramíneas anuales | 0,5 - 1,5 l/ha | | | | Contra Avena spp. and Lolium rigidum aplicar una dosis de 0,5-1 l/ha. Aplicar en post-emergencia temprana de malas hierbas y post-emergencia del cultivo. |
| Veza | Gramíneas plurianuales | 1,5 l/ha | 1 | -- | 200 - 400 l/ha | Aplicar en post-emergencia temprana de malas hierbas y post-emergencia del cultivo. |
| | Ricio de cereales, Poaceae | 0,5 - 1 l/ha | | | | Aplicar en post-emergencia temprana de malas hierbas y post-emergencia del cultivo. |
| | Gramíneas anuales | 0,5 - 1,5 l/ha | | | | Contra Avena spp. and Lolium rigidum aplicar una dosis de 0,5-1 l/ha. Aplicar en post-emergencia temprana de malas hierbas y post-emergencia del cultivo. |
| Vid de mesa | Gramíneas plurianuales | 1,5 - 2 l/ha | 1 | -- | 200 - 400 l/ha | Aplicar en post-emergencia temprana de malas hierbas y post-emergencia del cultivo. |

| | | | | | | |
|---------------------|----------------------------|----------------|---|----|----------------|--|
| Vid de vinificación | Ricio de cereales, Poaceae | 0,5 - 1 l/ha | | | | Aplicar en post-emergencia temprana de malas hierbas y post-emergencia del cultivo. |
| | Gramíneas anuales | 0,5 - 1,5 l/ha | | | | Contra Avena spp. and Lolium rigidum aplicar una dosis de 0,5-1 l/ha. Aplicar en post-emergencia temprana de malas hierbas y post-emergencia del cultivo. |
| | Gramíneas plurianuales | 1,5 - 2 l/ha | 1 | -- | 200 - 400 l/ha | Aplicar en post-emergencia temprana de malas hierbas y post-emergencia del cultivo. |
| Zanahoria | Ricio de cereales, Poaceae | 0,5 - 1 l/ha | | | | Aplicar en post-emergencia temprana de malas hierbas y post-emergencia del cultivo. |
| | Gramíneas anuales | 0,5 - 1,5 l/ha | | | | Contra Avena spp. and Lolium rigidum aplicar una dosis de 0,5-1 l/ha. Aplicar en post-emergencia temprana de malas hierbas y post-emergencia del cultivo. |
| | Gramíneas plurianuales | 1,5 l/ha | 1 | -- | 200 - 400 l/ha | Aplicar en post-emergencia temprana de malas hierbas y post-emergencia del cultivo. |

Plazos de Seguridad (Protección del Consumidor)



| USO | P.S. (días) |
|---|-------------|
| Ajo, Albaricoquero, Apionabo, Berenjena, Brécol, Caqui, Cebolla, Chalote, Chirivía, Coliflor, Colinabo, Espárrago, Frutales de pepita, Melocotonero, Nabo, Rábano, Raíz de perejil, Repollo, Salsifí, Tomate, Vid de mesa, Vid de vinificación, Zanahoria | 30 |
| Altramuz, Batata, boniato, Garbanzo verde, Garbanzo, Guisante para grano, Guisante verde, Haba para grano, Haba verde, Judía para grano, Judía verde, Lenteja, Patata | 40 |
| Alfalfa, Alhova, fenogreco, Almorta, Calabaza, Leguminosas forrajeras, Melón, Remolacha azucarera, Remolacha forrajera, Sandía, Tabaco, Veza | 45 |
| Algodonero, Girasol, Soja | 60 |
| Adormidera, Colza | 90 |
| Almendro, Arbustos y pequeños árboles ornamentales, Arroz, Avellano, Castaño, Cerezo, Ciruelo, Cítricos, Coníferas, Especies vegetales, Frondosas, Nogal, Olivo, Ornamentales herbáceas, Palmáceas, Palmera datilera, Pinos, Pistachero | NO PROCEDE |

Condiciones Generales de Uso



Tratamiento herbicida al aire libre por pulverización foliar.

(*La etiqueta deberá incluir una referencia a la responsabilidad de la persona que utilice el producto fitosanitario con respecto a la eficacia o la fitotoxicidad del uso.

Debe ser aplicado solo, dejando un margen de 3 días entre el tratamiento y la aplicación de otro producto agroquímico.

En la etiqueta se darán las indicaciones oportunas para la correcta aplicación del producto.

Clase de Usuario



Uso profesional agrario en lugares no destinados al público en general.

Mitigación de riesgos en la manipulación



SEGURIDAD DEL APLICADOR

El aplicador utilizará durante la mezcla/carga:

- Guantes de protección química.
- Ropa de protección C1 o tipo 6.
- Ropa de protección parcial de nivel C3 o tipo delantal tipo PB 3 o PB 4.
- Calzado de uso profesional de material polimérico.

Durante la aplicación:

- Guantes de protección química.
- Ropa de protección C1 o tipo 6.
- Calzado de uso profesional de material polimérico.

SEGURIDAD DEL TRABAJADOR

El trabajador utilizará durante la reentrada al cultivo:

- Ropa de protección C1 o ropa de trabajo.
- Calzado cerrado.
- Guantes de protección química (ver medidas adicionales).

NORMATIVA APLICABLE

- Guantes de protección contra productos químicos conforme a la norma UNE-EN ISO 374-1:2016 y su modificación UNE-EN 374-1:2016/A1:2018. Los guantes deben ser reutilizables al manipular el producto concentrado. Para el contacto con el producto diluido o residuo seco, pueden ser reutilizables o desechables. Deben tener la resistencia mecánica suficiente para evitar la rotura. Si se dañan, deben reemplazarse de inmediato.
- Ropa de protección tipo 6: frente a salpicaduras de productos líquidos, conforme a norma UNE-EN13034: 2005 + A1: 2009.
- Ropa de protección C1, C3, tanto de protección completa como parcial, frente a productos fitosanitarios según norma UNE EN ISO 27065: 2017 y su modificación UNE EN ISO 27065: 2017/A1:2019.
- Ropa de protección parcial tipo PB3 con uniones herméticas a los líquidos o de tipo PB4 con uniones herméticas a las pulverizaciones según norma UNE-EN 14605:2005+A1:2009.
- Calzado de uso profesional, al menos botas tobilleras, de caucho u otro material polimérico (clasificación II).
- Ropa de trabajo adecuada: Mono o chaqueta de manga larga y pantalón largo hechos de algodón (≥ 300 g/m²) o de algodón y al menos un 65% de poliéster (≥ 245 g/m²).

Medidas adicionales de la mitigación del riesgo:




- Durante la aplicación con tractor se deberán usar los guantes de protección química únicamente para manipular el equipo de aplicación o superficies contaminadas.
- En la limpieza y mantenimiento del equipo se aplicarán las mismas medidas de protección que en mezcla/carga.
- No entrar en los cultivos tratados hasta que se haya secado la pulverización.
- Evitar el contacto con el follaje húmedo durante la aplicación.
- El uso de guantes de protección química es obligatorio durante los 3 días posteriores a la aplicación para hortalizas bajas, durante 28 días para remolacha y durante todo el ciclo de vida del cultivo para las plantas ornamentales bajas.
- En el caso del algodón, las tareas de cosecha y empaque deben realizarse mecánicamente.
- No complementar la utilización del producto con escarda manual. Sin embargo, en caso de ser necesaria, ésta no se realizará hasta al menos 30 días después de la aplicación accediendo a la zona inundada con botas de protección química extra-largas de clase 2 (de caucho, poliméricas, etc...) y guantes de protección química. El intervalo podrá reducirse a 15 días tras la aplicación y siempre bajo conformidad la Autoridad Competente nacional en materia agronómica.

SPo 2: Lávese toda la ropa de protección después de usarla.

SPo 4: El recipiente debe abrirse al aire libre y en tiempo seco.



Clasificaciones y Etiquetado

| | |
|--|---|
| Clase y categoría de peligro (Humana) | Carcinogenicidad. Categoría 2. Irritación ocular. Categoría 2. Peligro por aspiración. Categoría 1. Toxicidad aguda (inhalación). Categoría 4. |
| Pictograma |  GHS07 (signo de exclamación)  GHS08 (peligro para la salud) |
| Palabra de Advertencia | Peligro |
| Indicaciones de Peligro | EUH 066 -La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel. H332 -Nocivo en caso de inhalación. H319 -Provoca irritación ocular grave. H304 -Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. H351 -Se sospecha que provoca cáncer. |
| Consejos de Prudencia | P302+P352 -EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua y jabón. P305+P351+P338 -EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. P301+P310 -EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico. P304+P340 -EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. P261 -Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. P280 -Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. P331 -NO provocar el vómito. P201+P202 -Solicitar instrucciones especiales antes del uso y no manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad. P271 -Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. |
| Clase y categoría de peligro (Medio Ambiental) | Acuático agudo 1 Acuático crónico 1 |
| Pictograma |  GHS09 (medio ambiente) |
| Palabra de Advertencia | Atención |
| Indicaciones de Peligro | H410 -Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos. |
| Consejos de Prudencia | P501 -Elimínense el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos. P391 -Recoger el vertido. |

Mitigación de riesgos ambientales



SPe 3: Para proteger las plantas no objetivo, respétese sin tratar una banda de seguridad de 5m hasta la zona no cultivada.
 SPe 3: Para proteger los organismos acuáticos, respétese sin tratar una banda de seguridad de 5m hasta las masas de agua superficial.

Cualquier actividad que se realice con el presente preparado deberá tener en cuenta las condiciones establecidas en los artículos 31, 32 y 33 del Real Decreto 1311/2012, por el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios.

Eliminación del producto y/o caldo



SP1: NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE. (No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales/Evítese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos).

Gestión de Envases



Enjuague enérgicamente tres veces cada envase que utilice, vertiendo el agua de lavado al depósito (del pulverizador).

Conforme a lo establecido en el Real Decreto 1055/2022, de 27 de diciembre, de envases y residuos de envases, en la etiqueta deberá figurar la siguiente frase: Deposite los residuos de envases en los puntos de recogida establecidos por los sistemas de responsabilidad ampliada del productor.



Otras Indicaciones reglamentarias

OBSERVACIONES

El componente "Hidrocarburos aromáticos C10-C13, <1% naftaleno (EC 922-153-0)" debe tener un contenido en naftaleno (CAS 91-20-3) < 1% y de cumeno (CAS 98-82-8) < 0,1%.

En cumplimiento del artículo 45 del Reglamento (CE) nº 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2008 sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas (CLP), los usuarios intermedios o importadores de mezclas clasificadas para la salud humana o por sus peligros físicos, deberán enviar la información pertinente para la formulación de medidas preventivas y curativas, en particular para la respuesta sanitaria en caso de urgencia al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (Organismo designado a tal efecto según la Ley 8/2010 de 31 de marzo).

La Orden JUS/288/2021, de 25 de marzo, regula el procedimiento de comunicación de dicha información al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.

Para incluir el teléfono del Servicio de Información Toxicológica en la etiqueta, instrucciones de primeros auxilios, así como en el apartado 1.4 de la Ficha de Datos de Seguridad es obligatorio haber realizado previamente el alta de la ficha toxicológica según el procedimiento mencionado.

Lo que se informa a los efectos dispuestos en el Real Decreto y los Reglamentos antes citados.

INDICACIONES QUE DEBEN FIGURAR EN LA ETIQUETA

Otros componentes además del ingrediente activo técnico:

Hidrocarburos aromáticos C10-C13, <1% naftaleno (EC 922-153-0).

Otras leyendas e indicaciones:

El preparado no se usará en combinación con otros productos.

EUH208: Contiene propaquizafop. Puede provocar una reacción alérgica.

EUH401: A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso.

Condiciones de almacenamiento

P405: Guardar bajo llave.

