

Datos del Producto

Número de Registro: ES-01769 **Estado:** Vigente **Fechas** **Inscripción:** 29/04/2026 **Renovación:** **Caducidad:** 31/05/2028
Nombre Comercial: TEFLIX

Titular

GLOBACHEM N.V.
 Brustem Industriepark, Lichtenberglaan 2019
 BE-3800 SintTruiden
 BÉLGICA

Fabricante

GLOBACHEM N.V.
 Brustem Industriepark, Lichtenberglaan 2019
 BE-3800 SintTruiden
 BÉLGICA

Composición

TEFLUTRIN 1,5% [GR] P/P

Envases

Envases de HDPE con capacidad de 50 g, 100 g, 250 g, 500 g, 1 kg, 5 kg y 10 kg.
 Bolsas de 5 y 10 kg envasadas en Papel/PETP met./PE; y de 20 kg envasadas en Papel/PE.

Usos y Dosis Autorizados

| USO | AGENTE | Dosis | Nº Aplic. | Intervalos | Condic. Especifico |
|--|----------------------------|-------------|-----------|------------|---|
| Ámbito de Aplicación: Agrario - Tipo de Usuario: Profesional - Sistema de Cultivo: Aire libre - Método de Aplicación: Otros (ver condic.) | | | | | |
| | Noctuidos, Noctuidae | | | | (Uso menor por Jerarquía de cultivos) Eficaz contra Agrotis spp., Peridroma spp. y Spodoptera spp. Aplicar antes o durante la siembra en el surco sembrador. |
| | Miriápodos | | | | (Uso menor por Jerarquía de cultivos) Eficaz contra Blaniulus spp. Aplicar antes o durante la siembra en el surco sembrador. |
| | Escarabeidos, Scarabaeidae | | | | (Uso menor por Jerarquía de cultivos) Eficaz contra Rhizotrogus spp., Melolontha spp., Anoxia spp. y Tropinota spp. Aplicar antes o durante la siembra en el surco sembrador. |
| Algodonero | Elatéridos, Elateridae | 3 - 5 Kg/ha | 1 | -- | (Uso menor por Jerarquía de cultivos). Aplicar antes o durante la siembra en el surco sembrador. |
| | Noctuidos, Noctuidae | | | | (Uso menor por Jerarquía de cultivos) Eficaz contra Agrotis spp., Peridroma spp. y Spodoptera spp. Aplicar antes o durante la siembra en el surco sembrador. |
| | Miriápodos | | | | (Uso menor por Jerarquía de cultivos) Eficaz contra Blaniulus spp. Aplicar antes o durante la siembra en el surco sembrador. |
| | Escarabeidos, Scarabaeidae | | | | (Uso menor por Jerarquía de cultivos) Eficaz contra Rhizotrogus spp., Melolontha spp., Anoxia spp. y Tropinota spp. Aplicar antes o durante la siembra en el surco sembrador. |
| Brécol | Elatéridos, Elateridae | 3 - 5 Kg/ha | 1 | -- | (Uso menor por Jerarquía de cultivos). Aplicar antes o durante la siembra en el surco sembrador. |

| | | | | | |
|-----------------|------------------------------------|-------------|---|----|---|
| | Noctuidos, Noctuidae | | | | (Uso menor por Jerarquía de cultivos) Eficaz contra Agrotis spp., Peridroma spp. y Spodoptera spp. Aplicar antes o durante la siembra en el surco sembrador. |
| | Miriápodos | | | | (Uso menor por Jerarquía de cultivos) Eficaz contra Blaniulus spp. Aplicar antes o durante la siembra en el surco sembrador. |
| | Escarabeidos, Scarabaeidae | | | | (Uso menor por Jerarquía de cultivos) Eficaz contra Rhizotrogus spp., Melolontha spp., Anoxia spp. y Tropinota spp. Aplicar antes o durante la siembra en el surco sembrador. |
| Calabaza | Elatéridos, Elateridae | 10 Kg/ha | 1 | -- | (Uso menor por Jerarquía de cultivos). Aplicar antes o durante la siembra en el surco sembrador. |
| Cebolla | Mosca de la cebolla, Delia antiqua | 10 Kg/ha | 1 | -- | Aplicar durante la siembra por incorporación en el suelo en la línea de siembra o plantación. |
| | Noctuidos, Noctuidae | | | | (Uso menor por Jerarquía de cultivos) Eficaz contra Agrotis spp., Peridroma spp. y Spodoptera spp. Aplicar antes o durante la siembra en el surco sembrador. |
| | Miriápodos | | | | (Uso menor por Jerarquía de cultivos) Eficaz contra Blaniulus spp. Aplicar antes o durante la siembra en el surco sembrador. |
| | Escarabeidos, Scarabaeidae | | | | (Uso menor por Jerarquía de cultivos) Eficaz contra Rhizotrogus spp., Melolontha spp., Anoxia spp. y Tropinota spp. Aplicar antes o durante la siembra en el surco sembrador. |
| Col de Bruselas | Elatéridos, Elateridae | 3 - 5 Kg/ha | 1 | -- | (Uso menor por Jerarquía de cultivos). Aplicar antes o durante la siembra en el surco sembrador. |
| | Noctuidos, Noctuidae | | | | (Uso menor por Jerarquía de cultivos) Eficaz contra Agrotis spp., Peridroma spp. y Spodoptera spp. Aplicar antes o durante la siembra en el surco sembrador. |
| | Miriápodos | | | | (Uso menor por Jerarquía de cultivos) Eficaz contra Blaniulus spp. Aplicar antes o durante la siembra en el surco sembrador. |
| | Escarabeidos, Scarabaeidae | | | | (Uso menor por Jerarquía de cultivos) Eficaz contra Rhizotrogus spp., Melolontha spp., Anoxia spp. y Tropinota spp. Aplicar antes o durante la siembra en el surco sembrador. |
| Coliflor | Elatéridos, Elateridae | 3 - 5 Kg/ha | 1 | -- | (Uso menor por Jerarquía de cultivos). Aplicar antes o durante la siembra en el surco sembrador. |
| | Noctuidos, Noctuidae | | | | (Uso menor por Jerarquía de cultivos) Eficaz contra Agrotis spp., Peridroma spp. y Spodoptera spp. Aplicar antes o durante la siembra en el surco sembrador. |
| | Miriápodos | | | | (Uso menor por Jerarquía de cultivos) Eficaz contra Blaniulus spp. Aplicar antes o durante la siembra en el surco sembrador. |
| | Escarabeidos, Scarabaeidae | | | | (Uso menor por Jerarquía de cultivos) Eficaz contra Rhizotrogus spp., Melolontha spp., Anoxia spp. y Tropinota spp. Aplicar antes o durante la siembra en el surco sembrador. |
| Colinabo | Elatéridos, Elateridae | 10 Kg/ha | 1 | -- | (Uso menor por Jerarquía de cultivos). Aplicar antes o durante la siembra en el surco sembrador. |
| | Elatéridos, Elateridae | | | | Aplicar antes o durante la siembra en el surco sembrador. |
| | Noctuidos, Noctuidae | | | | Eficaz contra Agrotis spp., Peridroma spp. y Spodoptera spp. Aplicar antes o durante la siembra en el surco sembrador. |
| | Miriápodos | | | | Eficaz contra Blaniulus spp. Aplicar antes o durante la siembra en el surco sembrador. |
| Girasol | Escarabeidos, Scarabaeidae | 10 Kg/ha | 1 | -- | Eficaz contra Rhizotrogus spp., Melolontha spp., Anoxia spp. y Tropinota spp. Aplicar antes o durante la siembra en el surco sembrador. |
| | Noctuidos, Noctuidae | | | | (Uso menor por Jerarquía de cultivos) Eficaz contra Agrotis spp., Peridroma spp. y Spodoptera spp. Aplicar antes o durante la siembra en el surco sembrador. |
| | Miriápodos | | | | (Uso menor por Jerarquía de cultivos) Eficaz contra Blaniulus spp. Aplicar antes o durante la siembra en el surco sembrador. |
| | Escarabeidos, Scarabaeidae | | | | (Uso menor por Jerarquía de cultivos) Eficaz contra Rhizotrogus spp., Melolontha spp., Anoxia spp. y Tropinota spp. Aplicar antes o durante la siembra en el surco sembrador. |
| Guisante verde | Elatéridos, Elateridae | 3 - 5 Kg/ha | 1 | -- | (Uso menor por Jerarquía de cultivos). Aplicar antes o durante la siembra en el surco sembrador. |
| | Noctuidos, Noctuidae | | | | (Uso menor por Jerarquía de cultivos) Eficaz contra Agrotis spp., Peridroma spp. y Spodoptera spp. Aplicar antes o durante la siembra en el surco sembrador. |

| | | | | | |
|-------------|--|-------------|---|----|---|
| | Miriápodos | | | | (Uso menor por Jerarquía de cultivos) Eficaz contra Blaniulus spp. Aplicar antes o durante la siembra en el surco sembrador. |
| | Escarabeidos, Scarabaeidae | | | | (Uso menor por Jerarquía de cultivos) Eficaz contra Rhizotrogus spp., Melolontha spp., Anoxia spp. y Tropinota spp. Aplicar antes o durante la siembra en el surco sembrador. |
| Judía verde | Elatéridos, Elateridae | 3 - 5 Kg/ha | 1 | -- | (Uso menor por Jerarquía de cultivos). Aplicar antes o durante la siembra en el surco sembrador. |
| | Noctuidos, Noctuidae | | | | (Uso menor por Jerarquía de cultivos) Eficaz contra Agrotis spp., Peridroma spp. y Spodoptera spp. Aplicar antes o durante la siembra en el surco sembrador. |
| | Miriápodos | | | | (Uso menor por Jerarquía de cultivos) Eficaz contra Blaniulus spp. Aplicar antes o durante la siembra en el surco sembrador. |
| | Escarabeidos, Scarabaeidae | | | | (Uso menor por Jerarquía de cultivos) Eficaz contra Rhizotrogus spp., Melolontha spp., Anoxia spp. y Tropinota spp. Aplicar antes o durante la siembra en el surco sembrador. |
| | Diabrotica del maíz, Diabrotica virgifera | | | | |
| | Elatéridos, Elateridae | | | | |
| | Mosca de los sembrados, Delia platura | | | | |
| Maíz dulce | Típulas, Tipulidae | 12 Kg/ha | 1 | -- | (Uso menor por Jerarquía de cultivos). Aplicar antes o durante la siembra en el surco sembrador. |
| | Diabrotica del maíz, Diabrotica virgifera | | | | |
| | Elatéridos, Elateridae | | | | |
| | Mosca de los sembrados, Delia platura | | | | |
| | Típulas, Tipulidae | | | | Aplicar antes o durante la siembra en el surco sembrador. |
| | Noctuidos, Noctuidae | | | | Eficaz contra Agrotis spp., Peridroma spp. y Spodoptera spp. Aplicar antes o durante la siembra en el surco sembrador. |
| | Miriápodos | | | | Eficaz contra Blaniulus spp. Aplicar antes o durante la siembra en el surco sembrador. |
| Maíz | Escarabeidos, Scarabaeidae | 3 - 5 Kg/ha | 1 | -- | Eficaz contra Rhizotrogus spp., Melolontha spp., Anoxia spp. y Tropinota spp. Aplicar antes o durante la siembra en el surco sembrador. |
| | Elatéridos, Elateridae | | | | Aplicar antes o durante la siembra en el surco sembrador. |
| | Noctuidos, Noctuidae | | | | Eficaz contra Agrotis spp., Peridroma spp. y Spodoptera spp. Aplicar antes o durante la siembra en el surco sembrador. |
| | Miriápodos | | | | Eficaz contra Blaniulus spp. Aplicar antes o durante la siembra en el surco sembrador. |
| Melón | Escarabeidos, Scarabaeidae | 10 Kg/ha | 1 | -- | Eficaz contra Rhizotrogus spp., Melolontha spp., Anoxia spp. y Tropinota spp. Aplicar antes o durante la siembra en el surco sembrador. |
| | Noctuidos, Noctuidae | | | | (Uso menor por Jerarquía de cultivos) Eficaz contra Agrotis spp., Peridroma spp. y Spodoptera spp. Aplicar antes o durante la siembra en el surco sembrador. |
| | Miriápodos | | | | (Uso menor por Jerarquía de cultivos) Eficaz contra Blaniulus spp. Aplicar antes o durante la siembra en el surco sembrador. |
| | Escarabeidos, Scarabaeidae | | | | (Uso menor por Jerarquía de cultivos) Eficaz contra Rhizotrogus spp., Melolontha spp., Anoxia spp. y Tropinota spp. Aplicar antes o durante la siembra en el surco sembrador. |
| Nabo | Elatéridos, Elateridae | 3 - 5 Kg/ha | 1 | -- | (Uso menor por Jerarquía de cultivos). Aplicar antes o durante la siembra en el surco sembrador. |
| | Noctuidos, Noctuidae | | | | (Uso menor por Jerarquía de cultivos) Eficaz contra Agrotis spp., Peridroma spp. y Spodoptera spp. Aplicar antes o durante la siembra en el surco sembrador. |
| | Miriápodos | | | | (Uso menor por Jerarquía de cultivos) Eficaz contra Blaniulus spp. Aplicar antes o durante la siembra en el surco sembrador. |
| | Escarabeidos, Scarabaeidae | | | | (Uso menor por Jerarquía de cultivos) Eficaz contra Rhizotrogus spp., Melolontha spp., Anoxia spp. y Tropinota spp. Aplicar antes o durante la siembra en el surco sembrador. |
| Rábano | Elatéridos, Elateridae | 5 Kg/ha | 1 | -- | (Uso menor por Jerarquía de cultivos). Aplicar antes o durante la siembra en el surco sembrador. |

| | | | | | |
|---------------------|--|-------------|---|----|---|
| | Elatéridos, Elateridae | | | | Aplicar antes o durante la siembra en el surco sembrador. |
| | Noctuidos, Noctuidae | | | | Eficaz contra Agrotis spp., Peridroma spp. y Spodoptera spp. Aplicar antes o durante la siembra en el surco sembrador. |
| | Miriápodos | | | | Eficaz contra Blaniulus spp. Aplicar antes o durante la siembra en el surco sembrador. |
| | Escarabeidos, Scarabaeidae | 3 - 5 Kg/ha | | | Eficaz contra Rhizotrogus spp., Melolontha spp., Anoxia spp. y Tropinota spp. Aplicar antes o durante la siembra en el surco sembrador. |
| Remolacha azucarera | Maripaca de la remolacha, Aubeonymus mariaefranciscaae | 6,6 l/ha | 1 | -- | Aplicar antes o durante la siembra en el surco sembrador. |
| | Noctuidos, Noctuidae | | | | (Uso menor por Jerarquía de cultivos) Eficaz contra Agrotis spp., Peridroma spp. y Spodoptera spp. Aplicar antes o durante la siembra en el surco sembrador. |
| | Miriápodos | | | | (Uso menor por Jerarquía de cultivos) Eficaz contra Blaniulus spp. Aplicar antes o durante la siembra en el surco sembrador. |
| | Escarabeidos, Scarabaeidae | | | | (Uso menor por Jerarquía de cultivos) Eficaz contra Rhizotrogus spp., Melolontha spp., Anoxia spp. y Tropinota spp. Aplicar antes o durante la siembra en el surco sembrador. |
| Repollo | Elatéridos, Elateridae | 3 - 5 Kg/ha | 1 | -- | (Uso menor por Jerarquía de cultivos). Aplicar antes o durante la siembra en el surco sembrador. |
| | Elatéridos, Elateridae | | | | Aplicar antes o durante la siembra en el surco sembrador. |
| | Noctuidos, Noctuidae | | | | Eficaz contra Agrotis spp., Peridroma spp. y Spodoptera spp. Aplicar antes o durante la siembra en el surco sembrador. |
| | Miriápodos | | | | Eficaz contra Blaniulus spp. Aplicar antes o durante la siembra en el surco sembrador. |
| Sandía | Escarabeidos, Scarabaeidae | 10 Kg/ha | 1 | -- | Eficaz contra Rhizotrogus spp., Melolontha spp., Anoxia spp. y Tropinota spp. Aplicar antes o durante la siembra en el surco sembrador. |
| | Miriápodos | | | | (Uso menor por Jerarquía de cultivos) Eficaz contra Blaniulus spp. Se realizará como máximo cada 3 años, para evitar riesgo en lombrices. Aplicar antes o durante la siembra en el surco sembrador. |
| | Escarabeidos, Scarabaeidae | | | | (Uso menor por Jerarquía de cultivos) Eficaz contra Rhizotrogus spp., Melolontha spp., Anoxia spp. y Tropinota spp. Se realizará como máximo cada 3 años, para evitar riesgo en lombrices. Aplicar antes o durante la siembra en el surco sembrador. |
| | Típulas, Tipulidae | | | | (Uso menor por Jerarquía de cultivos) Eficaz contra Tipula spp. Se realizará como máximo cada 3 años, para evitar riesgo en lombrices. Aplicar antes o durante la siembra en el surco sembrador. |
| | Diabrotica del maíz, Diabrotica virgifera | | | | |
| | Elatéridos, Elateridae | | | | |
| | Mosca de los sembrados, Delia platura | | | | |
| Sorgo | Noctuidos, Noctuidae | 12,2 Kg/ha | 1 | -- | (Uso menor por Jerarquía de cultivos) Se realizará como máximo cada 3 años, para evitar riesgo en lombrices. Aplicar antes o durante la siembra en el surco sembrador. |
| | Noctuidos, Noctuidae | | | | (Uso menor por Jerarquía de cultivos) Eficaz contra Agrotis spp., Peridroma spp. y Spodoptera spp. Aplicar antes o durante la siembra en el surco sembrador. |
| | Miriápodos | | | | (Uso menor por Jerarquía de cultivos) Eficaz contra Blaniulus spp. Aplicar antes o durante la siembra en el surco sembrador. |
| | Escarabeidos, Scarabaeidae | | | | (Uso menor por Jerarquía de cultivos) Eficaz contra Rhizotrogus spp., Melolontha spp., Anoxia spp. y Tropinota spp. Aplicar antes o durante la siembra en el surco sembrador. |
| Tabaco | Elatéridos, Elateridae | 3 - 5 Kg/ha | 1 | -- | (Uso menor por Jerarquía de cultivos). Aplicar antes o durante la siembra en el surco sembrador. |
| | Elatéridos, Elateridae | | | | Aplicar antes o durante la siembra en el surco sembrador. |
| | Noctuidos, Noctuidae | | | | Eficaz contra Agrotis spp., Peridroma spp. y Spodoptera spp. Aplicar antes o durante la siembra en el surco sembrador. |
| | Miriápodos | | | | Eficaz contra Blaniulus spp. Aplicar antes o durante la siembra en el surco sembrador. |

| | | | | | |
|-----------|----------------------------|-------------|---|----|--|
| Tomate | Escarabeidos, Scarabaeidae | 3 - 5 Kg/ha | 1 | -- | Eficaz contra Rhizotrogus spp., Melolontha spp., Anoxia spp. y Tropinota spp. Aplicar antes o durante la siembra en el surco sembrador. |
| | Elatéridos, Elateridae | | | | Aplicar antes o durante la siembra en el surco sembrador. |
| | Noctuidos, Noctuidae | | | | Eficaz contra Agrotis spp., Peridroma spp. y Spodoptera spp. Aplicar antes o durante la siembra en el surco sembrador. |
| | Miriápodos | | | | Eficaz contra Blaniulus spp. Aplicar antes o durante la siembra en el surco sembrador. |
| Zanahoria | Escarabeidos, Scarabaeidae | 3 - 5 Kg/ha | 1 | -- | Eficaz contra Rhizotrogus spp., Melolontha spp., Anoxia spp. y Tropinota spp. Aplicar antes o durante la siembra en el surco sembrador. |

Plazos de Seguridad (Protección del Consumidor)



| USO | P.S. (días) |
|---|-------------|
| Algodonero, Brécol, Calabaza, Cebolla, Col de Bruselas, Coliflor, Colinabo, Girasol, Guisante verde, Judía verde, Maíz dulce, Maíz, Melón, Nabo, Rábano, Remolacha azucarera, Repollo, Sandía, Sorgo, Tabaco, Tomate, Zanahoria | NO PROCEDE |

Condiciones Generales de Uso



Tratamiento insecticida al aire libre por incorporación al suelo con tractor.

- No se autoriza el uso en superficie, el producto solamente podrá ser aplicado enterrado en suelo.
- No aplicar el producto con existencia de viento en la zona, para evitar riesgo en abejas.
- No ha quedado demostrada la eficacia contra la plaga de Gryllotalpidae, considerada una de las más importantes en la zona mediterránea.

En la etiqueta se darán las indicaciones oportunas para la correcta aplicación del producto.

Clase de Usuario



Uso profesional.

Mitigación de riesgos en la manipulación



SEGURIDAD DEL APLICADOR

El aplicador utilizará durante la mezcla/carga:

- Guantes de protección química.
- Ropa de protección nivel C1 o en su defecto tipo 6.
- Calzado de uso profesional de material polimérico.
- EPR tipo FFP1 o P1.

Durante la aplicación:

- Guantes de protección química.
- Ropa de protección nivel C1 o en su defecto tipo 6.
- Calzado de uso profesional de material polimérico.

SEGURIDAD DEL TRABAJADOR

- Ropa de protección nivel C1 o ropa de trabajo.
- Calzado cerrado.

NORMATIVA APLICABLE



- Guantes de protección contra productos químicos conforme a la norma UNE-EN ISO 374-1:2016 y su modificación UNE-EN ISO 374-1:2016/A1:2018. Los guantes deben ser reutilizables al manipular el producto concentrado. Para el contacto con el producto diluido o residuo seco, pueden ser reutilizables o desechables. Deben tener la resistencia mecánica suficiente para evitar la rotura. Si se dañan, deben reemplazarse de inmediato.
- Ropa de protección química tipo 6: frente a salpicaduras de productos líquidos, conforme a norma UNE-EN 13034: 2005 + A1: 2009.
- Ropa de protección nivel C1, tanto de protección completa como parcial, frente a productos fitosanitarios según norma UNE –EN ISO 27065:2017 y su modificación UNE –EN ISO 27065:2017/A1:2019.
- Calzado de uso profesional, al menos botas tobilleras, de caucho u otro material polimérico (clasificación II).
- Ropa de trabajo adecuada: Mono o chaqueta de manga larga y pantalón largo hechos de algodón (≥ 300 g/m2) o de algodón y al menos un 65% de poliéster (≥ 245 g/m2).
- Equipo de protección respiratoria: Máscara completa conforme a la norma UNE-EN 136:1998, media máscara conforme UNE-EN 140/AC:2000, con filtro P1 contra partículas conforme a la norma UNE-EN 143:2022 o medias máscaras filtrantes de protección contra partículas FFP1 conforme a la norma EN 149:2001+ A1:2010.

Medidas adicionales de mitigación del riesgo:

- Durante la aplicación con tractor se deberán usar los guantes de protección química únicamente para manipular el equipo de aplicación o superficies contaminadas.
- En la limpieza y mantenimiento del equipo se aplicarán las mismas medidas de protección que en mezcla/carga.

Clasificaciones y Etiquetado



| | |
|--|---|
| Clase y categoría de peligro (Humana) | Toxicidad aguda (inhalación). Categoría 4. |
| Pictograma |  GHS07 (signo de exclamación) |
| Palabra de Advertencia | Atención |
| Indicaciones de Peligro | H332 -Nocivo en caso de inhalación. |
| Consejos de Prudencia | P304+P340 -EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. P261 -Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. P280 -Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. |
| Clase y categoría de peligro (Medio Ambiental) | Acuático agudo 1 Acuático crónico 1 |
| Pictograma |  GHS09 (medio ambiente) |
| Palabra de Advertencia | Atención |
| Indicaciones de Peligro | H410 -Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos. |
| Consejos de Prudencia | P501 -Elimínense el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos. P391 -Recoger el vertido. |

Mitigación de riesgos ambientales



SPe 3: Para proteger los organismos acuáticos, respétese sin tratar una banda de seguridad hasta las masas de agua superficial, de:

- 10m, para su uso en maíz dulce, sorgo, judía verde, remolacha azucarera, girasol y tabaco.
- 20m, para su uso en cebolla.
- 5m, para su uso en algodón y guisante verde.
- 20m o 10m con cubierta vegetal, para su uso en zanahoria, rábano, nabo y colinabo.
- 10m con cubierta vegetal, para su uso en coliflor, brécol, col de Bruselas, repollo, tomate, melón, sandía y calabaza.

SPe 3: Para proteger los artrópodos no objetivos, respétese sin tratar una banda de seguridad de 5m hasta la zona no cultivada.

SPe 5: Para proteger a las aves y los mamíferos, el producto debe incorporarse completamente al suelo.

SPe 6: Para proteger a las aves y los mamíferos, recójase todo derrame accidental.

SPe 8: Peligroso para las abejas/Para proteger a las abejas y otros insectos polinizadores, no aplicar en floración de los cultivos/No usar donde las abejas estén en pecoreo activo/Retirar o cubrir las colmenas durante la aplicación/No aplicar cuando haya malas hierbas en floración/Retirar las malas hierbas antes de la floración/No aplicar durante los 10 días anteriores a la floración.

Cualquier actividad que se realice con el presente preparado deberá tener en cuenta las condiciones establecidas en los artículos 31, 32 y 33 del Real Decreto 1311/2012, por el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios.

Eliminación del producto y/o caldo



SP1: NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE. (No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales/Evítese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos).

Gestión de Envases



Conforme a lo establecido en el Real Decreto 1055/2022, de 27 de diciembre, de envases y residuos de envases, en la etiqueta deberá figurar la siguiente frase: Deposite los residuos de envases en los puntos de recogida establecidos por los sistemas de responsabilidad ampliada del productor.

Otras Indicaciones reglamentarias



OBSERVACIONES (esta información no tiene que figurar en la etiqueta)

En cumplimiento del artículo 45 del Reglamento (CE) nº 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2008 sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas (CLP), los usuarios intermedios o importadores de mezclas clasificadas para la salud humana o por sus peligros físicos, deberán enviar la información pertinente para la formulación de medidas preventivas y curativas, en particular para la respuesta sanitaria en caso de urgencia al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (Organismo designado a tal efecto según la Ley 8/2010 de 31 de marzo).

La Orden JUS/288/2021, de 25 de marzo, regula el procedimiento de comunicación de dicha información al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.

Para incluir el teléfono del Servicio de Información Toxicológica en la etiqueta, instrucciones de primeros auxilios, así como en el apartado 1.4 de la Ficha de Datos de Seguridad es obligatorio haber realizado previamente el alta de la ficha toxicológica según el procedimiento mencionado.

Lo que se informa a los efectos dispuestos en el Real Decreto y los Reglamentos antes citados.

INDICACIONES QUE DEBEN FIGURAR EN LA ETIQUETA

EUH401: A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso.