

 GOBIERNO DE ESPAÑA		 MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN		ES-02077			SECRETARIA GENERAL DE RECURSOS AGRARIOS Y SEGURIDAD ALIMENTARIA		
				EINA			DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD DE LA PRODUCCIÓN AGROALIMENTARIA Y BIENESTAR ANIMAL		
Melocotonero	Pulgón verde, Myzus persicae	5 - 6 l/ha	Máx. 2	7 días	800 - 1000 l/ha	Incluye nectarino. Aplicar durante BBCH 70-95.			
Naranja	Pulgón del algodón, Aphis gossypii	5 - 6 l/ha	Máx. 2	7 días	800 - 1000 l/ha	Aplicar durante BBCH 70-95.			
	Mosca blanca algodonosa, Aleurothrixus floccosus	8 - 10 l/ha	Máx. 3						
Peral	Pulgón verde del manzano, Aphis pomi	5 - 6 l/ha	Máx. 2	7 días	800 - 1000 l/ha	Aplicar durante BBCH 70-95.			
	Psila del peral, Cacopsylla pyri	8 - 10 l/ha	Máx. 3						
Toronja, pomelo	Pulgón del algodón, Aphis gossypii	5 - 6 l/ha	Máx. 2	7 días	800 - 1000 l/ha	(Uso menor por jerarquía de cultivos). Aplicar durante BBCH 70-95.			
	Mosca blanca algodonosa, Aleurothrixus floccosus	8 - 10 l/ha	Máx. 3						
Ámbito de Aplicación: Agrario - Tipo de Usuario: No Profesional - Sistema de Cultivo: Invernadero - Método de Aplicación: Manual con mochila									
Calabacín	Áfidos, pulgones, Aphididae	5 - 6 l/ha	Máx. 2	7 días	800 - 1000 l/ha	Exclusivamente en estructuras cerradas (invernaderos profesionales de alta y baja tecnología). Aplicar durante BBCH 13-89.			
	Mosca blanca, Bemisia tabaci	8 - 10 l/ha	Máx. 3						
	Mosca blanca, Trialeurodes vaporariorum								
Calabaza	Áfidos, pulgones, Aphididae	5 - 6 l/ha	Máx. 2	7 días	800 - 1000 l/ha	(Uso menor por jerarquía de cultivos). Exclusivamente en estructuras cerradas (invernaderos profesionales de alta y baja tecnología). Aplicar durante BBCH 13-89.			
	Mosca blanca, Bemisia tabaci	8 - 10 l/ha	Máx. 3						
	Mosca blanca, Trialeurodes vaporariorum								
Melón	Áfidos, pulgones, Aphididae	5 - 6 l/ha	Máx. 2	7 días	800 - 1000 l/ha	Exclusivamente en estructuras cerradas (invernaderos profesionales de alta y baja tecnología). Aplicar durante BBCH 13-89.			
	Mosca blanca, Bemisia tabaci	8 - 10 l/ha	Máx. 3						
	Mosca blanca, Trialeurodes vaporariorum								
Pepino	Áfidos, pulgones, Aphididae	5 - 6 l/ha	Máx. 2	7 días	800 - 1000 l/ha	(Uso menor por jerarquía de cultivos). Exclusivamente en estructuras cerradas (invernaderos profesionales de alta y baja tecnología). Aplicar durante BBCH 13-89.			
	Mosca blanca, Bemisia tabaci	8 - 10 l/ha	Máx. 3						
	Mosca blanca, Trialeurodes vaporariorum								
Sandía	Áfidos, pulgones, Aphididae	5 - 6 l/ha	Máx. 2	7 días	800 - 1000 l/ha	Exclusivamente en estructuras cerradas (invernaderos profesionales de alta y baja tecnología). Aplicar durante BBCH 13-89.			
	Mosca blanca, Bemisia tabaci	8 - 10 l/ha	Máx. 3						
	Mosca blanca, Trialeurodes vaporariorum								
Solanáceas (excepto patata)	Áfidos, pulgones, Aphididae	5 - 6 l/ha	Máx. 3	7 días	800 - 1000 l/ha	Exclusivamente en estructuras cerradas (invernaderos profesionales de alta y baja tecnología). Uso exclusivo en tomate, pimiento, berenjena, okra, bayas de Goji, alquequenjes. Aplicar durante BBCH 13-89.			
	Mosca blanca, Bemisia tabaci	8 - 10 l/ha							
	Mosca blanca, Trialeurodes vaporariorum								
Ámbito de Aplicación: Agrario - Tipo de Usuario: Profesional - Sistema de Cultivo: Aire libre - Método de Aplicación: Manual con lanza o pistola									
Caqui	Mosca blanca, Dialeurodes citri	8 - 10 l/ha	Máx. 3	7 días	800 - 1000 l/ha	(Uso menor por jerarquía de cultivos). Aplicar durante BBCH 70-95.			
Lima	Pulgón del algodón, Aphis gossypii	5 - 6 l/ha	Máx. 2	7 días	800 - 1000 l/ha	(Uso menor por jerarquía de cultivos). Aplicar durante BBCH 70-95.			
	Mosca blanca algodonosa, Aleurothrixus floccosus	8 - 10 l/ha	Máx. 3						
Mandarino (incluido clementino e híbridos)	Pulgón del algodón, Aphis gossypii	5 - 6 l/ha	Máx. 2	7 días	800 - 1000 l/ha	Aplicar durante BBCH 70-95.			
Manzano	Pulgón verde del manzano, Aphis pomi	5 - 6 l/ha	Máx. 2	7 días	800 - 1000 l/ha	Aplicar durante BBCH 70-95.			

Melocotonero	Pulgón verde, Myzus persicae	5 - 6 l/ha	Máx. 2	7 días	800 - 1000 l/ha	Incluye nectarino. Aplicar durante BBCH 70-95.
Naranja	Pulgón del algodón, Aphis gossypii	5 - 6 l/ha	Máx. 2	7 días	800 - 1000 l/ha	Aplicar durante BBCH 70-95.
	Mosca blanca algodonosa, Aleurothrixus floccosus	8 - 10 l/ha	Máx. 3			
Peral	Pulgón verde del manzano, Aphis pomi	5 - 6 l/ha	Máx. 2	7 días	800 - 1000 l/ha	Aplicar durante BBCH 70-95.
	Psila del peral, Cacopsylla pyri	8 - 10 l/ha	Máx. 3			
Toronja, pomelo	Pulgón del algodón, Aphis gossypii	5 - 6 l/ha	Máx. 2	7 días	800 - 1000 l/ha	(Uso menor por jerarquía de cultivos). Aplicar durante BBCH 70-95.
	Mosca blanca algodonosa, Aleurothrixus floccosus	8 - 10 l/ha	Máx. 3			
Ámbito de Aplicación: Agrario - Tipo de Usuario: Profesional - Sistema de Cultivo: Aire libre - Método de Aplicación: Manual con mochila						
Caqui	Mosca blanca, Dialeurodes citri	8 - 10 l/ha	Máx. 3	7 días	800 - 1000 l/ha	(Uso menor por jerarquía de cultivos). Aplicar durante BBCH 70-95.
Lima	Pulgón del algodón, Aphis gossypii	5 - 6 l/ha	Máx. 2	7 días	800 - 1000 l/ha	(Uso menor por jerarquía de cultivos). Aplicar durante BBCH 70-95.
	Mosca blanca algodonosa, Aleurothrixus floccosus	8 - 10 l/ha	Máx. 3			
Mandarino (incluido clementino e híbridos)	Pulgón del algodón, Aphis gossypii	5 - 6 l/ha	Máx. 2	7 días	800 - 1000 l/ha	Aplicar durante BBCH 70-95.
Manzano	Pulgón verde del manzano, Aphis pomi	5 - 6 l/ha	Máx. 2	7 días	800 - 1000 l/ha	Aplicar durante BBCH 70-95.
Melocotonero	Pulgón verde, Myzus persicae	5 - 6 l/ha	Máx. 2	7 días	800 - 1000 l/ha	Incluye nectarino. Aplicar durante BBCH 70-95.
Naranja	Pulgón del algodón, Aphis gossypii	5 - 6 l/ha	Máx. 2	7 días	800 - 1000 l/ha	Aplicar durante BBCH 70-95.
	Mosca blanca algodonosa, Aleurothrixus floccosus	8 - 10 l/ha	Máx. 3			
Peral	Pulgón verde del manzano, Aphis pomi	5 - 6 l/ha	Máx. 2	7 días	800 - 1000 l/ha	Aplicar durante BBCH 70-95.
	Psila del peral, Cacopsylla pyri	8 - 10 l/ha	Máx. 3			
Toronja, pomelo	Pulgón del algodón, Aphis gossypii	5 - 6 l/ha	Máx. 2	7 días	800 - 1000 l/ha	(Uso menor por jerarquía de cultivos). Aplicar durante BBCH 70-95.
	Mosca blanca algodonosa, Aleurothrixus floccosus	8 - 10 l/ha	Máx. 3			
Ámbito de Aplicación: Agrario - Tipo de Usuario: Profesional - Sistema de Cultivo: Aire libre - Método de Aplicación: Pulverización normal con tractor						
Caqui	Mosca blanca, Dialeurodes citri	8 - 10 l/ha	Máx. 3	7 días	800 - 1000 l/ha	(Uso menor por jerarquía de cultivos). Aplicar durante BBCH 70-95.
Lima	Pulgón del algodón, Aphis gossypii	5 - 6 l/ha	Máx. 2	7 días	800 - 1000 l/ha	(Uso menor por jerarquía de cultivos). Aplicar durante BBCH 70-95.
	Mosca blanca algodonosa, Aleurothrixus floccosus	8 - 10 l/ha	Máx. 3			
Mandarino (incluido clementino e híbridos)	Pulgón del algodón, Aphis gossypii	5 - 6 l/ha	Máx. 2	7 días	800 - 1000 l/ha	Aplicar durante BBCH 70-95.
Manzano	Pulgón verde del manzano, Aphis pomi	5 - 6 l/ha	Máx. 2	7 días	800 - 1000 l/ha	Aplicar durante BBCH 70-95.
Melocotonero	Pulgón verde, Myzus persicae	5 - 6 l/ha	Máx. 2	7 días	800 - 1000 l/ha	Incluye nectarino. Aplicar durante BBCH 70-95.
Naranja	Pulgón del algodón, Aphis gossypii	5 - 6 l/ha	Máx. 2	7 días	800 - 1000 l/ha	Aplicar durante BBCH 70-95.
	Mosca blanca algodonosa, Aleurothrixus floccosus	8 - 10 l/ha	Máx. 3			
Peral	Pulgón verde del manzano, Aphis pomi	5 - 6 l/ha	Máx. 2	7 días	800 - 1000 l/ha	Aplicar durante BBCH 70-95.
	Psila del peral, Cacopsylla pyri	8 - 10 l/ha	Máx. 3			
Toronja, pomelo	Pulgón del algodón, Aphis gossypii	5 - 6 l/ha	Máx. 2	7 días	800 - 1000 l/ha	(Uso menor por jerarquía de cultivos). Aplicar durante BBCH 70-95.
	Mosca blanca algodonosa, Aleurothrixus floccosus	8 - 10 l/ha	Máx. 3			



GOBIERNO DE ESPAÑA



MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

ES-02077

EINA

SECRETARIA GENERAL DE RECURSOS AGRARIOS Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD DE LA PRODUCCIÓN AGROALIMENTARIA Y BIENESTAR ANIMAL

Ámbito de Aplicación: Agrario - Tipo de Usuario: Profesional - Sistema de Cultivo: Invernadero - Método de Aplicación: Carretilla						
Calabacín	Áfidos, pulgones, Aphididae	5 - 6 l/ha	Máx. 2	7 días	800 - 1000 l/ha	Exclusivamente en estructuras cerradas (invernaderos profesionales de alta y baja tecnología). Aplicar durante BBCH 13-89.
	Mosca blanca, Bemisia tabaci					
	Mosca blanca, Trialeurodes vaporariorum	8 - 10 l/ha	Máx. 3			
Calabaza	Áfidos, pulgones, Aphididae	5 - 6 l/ha	Máx. 2	7 días	800 - 1000 l/ha	(Uso menor por jerarquía de cultivos). Exclusivamente en estructuras cerradas (invernaderos profesionales de alta y baja tecnología). Aplicar durante BBCH 13-89.
	Mosca blanca, Bemisia tabaci					
	Mosca blanca, Trialeurodes vaporariorum	8 - 10 l/ha	Máx. 3			
Melón	Áfidos, pulgones, Aphididae	5 - 6 l/ha	Máx. 2	7 días	800 - 1000 l/ha	Exclusivamente en estructuras cerradas (invernaderos profesionales de alta y baja tecnología). Aplicar durante BBCH 13-89.
	Mosca blanca, Bemisia tabaci					
	Mosca blanca, Trialeurodes vaporariorum	8 - 10 l/ha	Máx. 3			
Pepino	Áfidos, pulgones, Aphididae	5 - 6 l/ha	Máx. 2	7 días	800 - 1000 l/ha	(Uso menor por jerarquía de cultivos). Exclusivamente en estructuras cerradas (invernaderos profesionales de alta y baja tecnología). Aplicar durante BBCH 13-89.
	Mosca blanca, Bemisia tabaci					
	Mosca blanca, Trialeurodes vaporariorum	8 - 10 l/ha	Máx. 3			
Sandía	Áfidos, pulgones, Aphididae	5 - 6 l/ha	Máx. 2	7 días	800 - 1000 l/ha	Exclusivamente en estructuras cerradas (invernaderos profesionales de alta y baja tecnología). Aplicar durante BBCH 13-89.
	Mosca blanca, Bemisia tabaci					
	Mosca blanca, Trialeurodes vaporariorum	8 - 10 l/ha	Máx. 3			
Solanáceas (excepto patata)	Áfidos, pulgones, Aphididae	5 - 6 l/ha	Máx. 2	7 días	800 - 1000 l/ha	Exclusivamente en estructuras cerradas (invernaderos profesionales de alta y baja tecnología). Uso exclusivo en tomate, pimiento, berenjena, okra, bayas de Goji, alquequenjes. Aplicar durante BBCH 13-89.
	Mosca blanca, Bemisia tabaci					
	Mosca blanca, Trialeurodes vaporariorum	8 - 10 l/ha	Máx. 3			
Ámbito de Aplicación: Agrario - Tipo de Usuario: Profesional - Sistema de Cultivo: Invernadero - Método de Aplicación: Manual con lanza o pistola						
Calabacín	Áfidos, pulgones, Aphididae	5 - 6 l/ha	Máx. 2	7 días	800 - 1000 l/ha	Exclusivamente en estructuras cerradas (invernaderos profesionales de alta y baja tecnología). Aplicar durante BBCH 13-89.
	Mosca blanca, Bemisia tabaci					
	Mosca blanca, Trialeurodes vaporariorum	8 - 10 l/ha	Máx. 3			
Calabaza	Áfidos, pulgones, Aphididae	5 - 6 l/ha	Máx. 2	7 días	800 - 1000 l/ha	(Uso menor por jerarquía de cultivos). Exclusivamente en estructuras cerradas (invernaderos profesionales de alta y baja tecnología). Aplicar durante BBCH 13-89.
	Mosca blanca, Bemisia tabaci					
	Mosca blanca, Trialeurodes vaporariorum	8 - 10 l/ha	Máx. 3			
Melón	Áfidos, pulgones, Aphididae	5 - 6 l/ha	Máx. 2	7 días	800 - 1000 l/ha	Exclusivamente en estructuras cerradas (invernaderos profesionales de alta y baja tecnología). Aplicar durante BBCH 13-89.
	Mosca blanca, Bemisia tabaci					
	Mosca blanca, Trialeurodes vaporariorum	8 - 10 l/ha	Máx. 3			
Pepino	Áfidos, pulgones, Aphididae	5 - 6 l/ha	Máx. 2	7 días	800 - 1000 l/ha	(Uso menor por jerarquía de cultivos). Exclusivamente en estructuras cerradas (invernaderos profesionales de alta y baja tecnología). Aplicar durante BBCH 13-89.
	Mosca blanca, Bemisia tabaci					
	Mosca blanca, Trialeurodes vaporariorum	8 - 10 l/ha	Máx. 3			

Sandía	Áfidos, pulgones, Aphididae	5 - 6 l/ha	Máx. 2	7 días	800 - 1000 l/ha	Exclusivamente en estructuras cerradas (invernaderos profesionales de alta y baja tecnología). Aplicar durante BBCH 13-89.
	Mosca blanca, Bemisia tabaci					
	Mosca blanca, Trialeurodes vaporariorum	8 - 10 l/ha	Máx. 3			
Solanáceas (excepto patata)	Áfidos, pulgones, Aphididae	5 - 6 l/ha	Máx. 2	7 días	800 - 1000 l/ha	Exclusivamente en estructuras cerradas (invernaderos profesionales de alta y baja tecnología). Uso exclusivo en tomate, pimiento, berenjena, okra, bayas de Goji, alquequenjes. Aplicar durante BBCH 13-89.
	Mosca blanca, Bemisia tabaci					
	Mosca blanca, Trialeurodes vaporariorum	8 - 10 l/ha	Máx. 3			
Ámbito de Aplicación: Agrario - Tipo de Usuario: Profesional - Sistema de Cultivo: Invernadero - Método de Aplicación: Manual con mochila						
Calabacín	Áfidos, pulgones, Aphididae	5 - 6 l/ha	Máx. 2	7 días	800 - 1000 l/ha	Exclusivamente en estructuras cerradas (invernaderos profesionales de alta y baja tecnología). Aplicar durante BBCH 13-89.
	Mosca blanca, Bemisia tabaci					
	Mosca blanca, Trialeurodes vaporariorum	8 - 10 l/ha	Máx. 3			
Calabaza	Áfidos, pulgones, Aphididae	5 - 6 l/ha	Máx. 2	7 días	800 - 1000 l/ha	(Uso menor por jerarquía de cultivos). Exclusivamente en estructuras cerradas (invernaderos profesionales de alta y baja tecnología). Aplicar durante BBCH 13-89.
	Mosca blanca, Bemisia tabaci					
	Mosca blanca, Trialeurodes vaporariorum	8 - 10 l/ha	Máx. 3			
Melón	Áfidos, pulgones, Aphididae	5 - 6 l/ha	Máx. 2	7 días	800 - 1000 l/ha	Exclusivamente en estructuras cerradas (invernaderos profesionales de alta y baja tecnología). Aplicar durante BBCH 13-89.
	Mosca blanca, Bemisia tabaci					
	Mosca blanca, Trialeurodes vaporariorum	8 - 10 l/ha	Máx. 3			
Pepino	Áfidos, pulgones, Aphididae	5 - 6 l/ha	Máx. 2	7 días	800 - 1000 l/ha	(Uso menor por jerarquía de cultivos). Exclusivamente en estructuras cerradas (invernaderos profesionales de alta y baja tecnología). Aplicar durante BBCH 13-89.
	Mosca blanca, Bemisia tabaci					
	Mosca blanca, Trialeurodes vaporariorum	8 - 10 l/ha	Máx. 3			
Sandía	Áfidos, pulgones, Aphididae	5 - 6 l/ha	Máx. 2	7 días	800 - 1000 l/ha	Exclusivamente en estructuras cerradas (invernaderos profesionales de alta y baja tecnología). Aplicar durante BBCH 13-89.
	Mosca blanca, Bemisia tabaci					
	Mosca blanca, Trialeurodes vaporariorum	8 - 10 l/ha	Máx. 3			
Solanáceas (excepto patata)	Áfidos, pulgones, Aphididae	5 - 6 l/ha	Máx. 2	7 días	800 - 1000 l/ha	Exclusivamente en estructuras cerradas (invernaderos profesionales de alta y baja tecnología). Uso exclusivo en tomate, pimiento, berenjena, okra, bayas de Goji, alquequenjes. Aplicar durante BBCH 13-89.
	Mosca blanca, Bemisia tabaci					
	Mosca blanca, Trialeurodes vaporariorum	8 - 10 l/ha	Máx. 3			

Plazos de Seguridad (Protección del Consumidor)	
USO	P.S. (días)
Caqui, Lima, Mandarino (incluido clementino e híbridos), Manzano, Melocotonero, Naranja, Peral, Toronja, pomelo, Calabacín, Calabaza, Melón, Pepino, Sandía, Solanáceas (excepto patata)	1





GOBIERNO DE ESPAÑA



MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

ES-02077

EINA

SECRETARIA GENERAL DE RECURSOS AGRARIOS Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD DE LA PRODUCCIÓN AGROALIMENTARIA Y BIENESTAR ANIMAL

Condiciones Generales de Uso

Tratamiento insecticida al aire libre e invernadero mediante pulverización foliar según el cuadro de usos autorizados.

En la etiqueta se darán las indicaciones oportunas para la correcta utilización del producto.

Clase de Usuario

Uso profesional.
Uso no profesional.

Mitigación de riesgos en la manipulación

SEGURIDAD DEL APLICADOR

Uso profesional:

El aplicador utilizará durante la mezcla/carga:

- Guantes de protección química.

- Ropa de protección nivel C1 o en su defecto tipo 6.

- Ropa de protección parcial de nivel C3, o en su defecto ropa de protección parcial tipo delantal PB3 o PB4.

- Calzado de uso profesional de material polimérico.

Durante la aplicación:

- Guantes de protección química.

- Ropa de protección nivel C1 o en su defecto tipo 6.

- Calzado de uso profesional de material polimérico.

SEGURIDAD DEL TRABAJADOR

El trabajador utilizará en la reentrada:

- Ropa de protección nivel C1 o ropa de trabajo.

- Calzado cerrado.

NORMATIVA APLICABLE A LOS EPIS

☐ Guantes de protección contra productos químicos, según UNE-EN 374-1:2016 y su modificación UNE-EN ISO 374-1:2016/A1:2018. Los guantes deben ser reutilizables al manipular el producto concentrado. Para el contacto con el producto diluido o residuo seco, podrán ser reutilizables o desechables. Deben tener la resistencia mecánica suficiente para evitar la rotura. Si se dañan, deben reemplazarse de inmediato.

☐ Ropa de protección química tipo 6: frente a salpicaduras de productos líquidos, conforme a norma UNE-EN 13034:2005+A1:2009.

☐ Ropa de protección: nivel C1, C3, tanto de protección completa como parcial, frente a productos fitosanitarios según norma UNE-EN ISO 27065:2017 y su modificación UNE EN ISO 27065: 2017/A1:2019.

☐ Ropa de protección parcial tipo PB3 con uniones herméticas a los líquidos o de tipo PB4 con uniones herméticas a las pulverizaciones según norma UNE-EN 14605:2005+A1:2009.

☐ Calzado de uso profesional, al menos botas tobilleras, de caucho u otro material polimérico (clasificación II).

☐ Ropa de trabajo adecuada: Mono o chaqueta de manga larga y pantalón largo hechos de algodón (≥ 300 g/m2) o de algodón y al menos un 65% de poliéster (≥ 245 g/m2).

Medidas adicionales de mitigación del riesgo para uso profesional al aire libre:

☐ Durante la aplicación con tractor se deberán usar los guantes de protección química únicamente para manipular el equipo de aplicación o superficies contaminadas.

☐ En la limpieza y mantenimiento del equipo se aplicarán las mismas medidas de protección que en mezcla/carga.

☐ Evitar el contacto con el follaje húmedo durante la aplicación

☐ No entrar en los cultivos tratados hasta que se haya secado la pulverización.

Medidas adicionales de mitigación del riesgo para uso profesional en invernadero:

☐ En la limpieza y mantenimiento del equipo se aplicarán las mismas medidas de protección que en mezcla/carga.

☐ Evitar el contacto con el follaje húmedo durante la aplicación.

☐ No entrar en los cultivos tratados hasta que se haya secado la pulverización.

Medidas adicionales de mitigación del riesgo para uso no profesional al aire libre e invernadero:

☐ No entrar en contacto con las áreas tratadas hasta que se haya secado la pulverización.

☐ Se recomienda el uso de guantes de protección química durante el manejo del producto.

☐ En el caso de que sea necesario realizar tareas de mantenimiento en los cultivos tratados, se recomienda ropa de manga larga, pantalón largo y calzado cerrado.

Spo5: Ventilar las zonas/ los invernaderos tratados (bien/ durante un tiempo especificado/ hasta que se haya secado la pulverización) antes de volver a entrar.

Página 6 de 8

86422 - 2026212

Clasificaciones y Etiquetado	
Clase y categoría de peligro (Humana)	Irritación cutánea. Categoría 2. Irritación ocular. Categoría 2. Toxicidad específica en determinados órganos (exposición única). Categoría 3.
Pictograma	 GHS07 (signo de exclamación)
Palabra de Advertencia	Atención
Indicaciones de Peligro	H315 -Provoca irritación cutánea. H319 -Provoca irritación ocular grave. H335 -Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de Prudencia	P302+P352 -EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua y jabón. P305+P351+P338 -EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. P261 -Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. P280 -Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. P102 -Mantener fuera del alcance de los niños.
Clase y categoría de peligro (Medio Ambiental)	Acuático crónico 3
Pictograma	
Palabra de Advertencia	
Indicaciones de Peligro	H412 -Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.
Consejos de Prudencia	P501 -Elimínense el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos. P273 -Evitar su liberación al medio ambiente.



Mitigación de riesgos ambientales

SPE 3: Para proteger los organismos acuáticos, respétese sin tratar una banda de seguridad de 5 metros hasta las masas de agua superficial.

SPE 3: Para proteger los organismos acuáticos, respétese sin tratar una banda de seguridad hasta las masas de agua superficial de:

-10m con cubierta vegetal, cuando se realizan 2 aplicaciones de 6 l/ha en naranjo, toronja/pomelo, mandarino, melocotonero, nectarino, manzano y peral.
-20m con cubierta vegetal, cuando se realizan 3 aplicaciones de 10 l/ha en caqui, naranjo, toronja/pomelo y peral .

Cualquier actividad que se realice con el presente preparado deberá tener en cuenta las condiciones establecidas en los artículos 31, 32 y 33 del Real Decreto 1311/2012, por el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios.



Eliminación del producto y/o caldo

SP1: NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE. (No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales/Evítese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos).



Gestión de Envases

Enjuague energicamente tres veces cada envase que utilice, vertiendo el agua de lavado al depósito (del pulverizador).

Conforme a lo establecido en el Real Decreto 1055/2022, de 27 de diciembre, de envases y residuos de envases, en la etiqueta deberá figurar la siguiente frase: Deposite los residuos de envases en los puntos de recogida establecidos por los sistemas de responsabilidad ampliada del productor.



Otras Indicaciones reglamentarias

OBSERVACIONES (esta información no tiene que figurar en la etiqueta).

En cumplimiento del artículo 45 del Reglamento (CE) nº 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2008 sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas (CLP), los usuarios intermedios o importadores de mezclas clasificadas para la salud humana o por sus peligros físicos, deberán enviar la información pertinente para la formulación de medidas preventivas y curativas, en particular para la respuesta sanitaria en caso de urgencia al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (Organismo designado a tal efecto según la Ley 8/2010 de 31 de marzo).

La Orden JUS/288/2021, de 25 de marzo, regula el procedimiento de comunicación de dicha información al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.

Para incluir el teléfono del Servicio de Información Toxicológica en la etiqueta, instrucciones de primeros auxilios, así como en el apartado 1.4 de la Ficha de Datos de Seguridad es obligatorio haber realizado previamente el alta de la ficha toxicológica según el procedimiento mencionado.

Lo que se informa a los efectos dispuestos en el Real Decreto y los Reglamentos antes citados.

INDICACIONES QUE DEBEN FIGURAR EN LA ETIQUETA

Otras leyendas e indicaciones.

Autorizado para uso no profesional
EUH208: Contiene 1,2-benzisotiazol-3-(2H)-ona (CAS 2634-33-5). Puede provocar una reacción alérgica.
EUH401: A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso.