

		GOBIERNO DE ESPAÑA				MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN		ES-02086			PHYTOSOAP 43			SECRETARIA GENERAL DE RECURSOS AGRARIOS Y SEGURIDAD ALIMENTARIA			DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD DE LA PRODUCCIÓN AGROALIMENTARIA Y BIENESTAR ANIMAL		
Naranja	Pulgón del algodón, Aphis gossypii	5 - 6 l/ha	Máx. 2	7 días	800 - 1000 l/ha	Aplicar durante BBCH 70-95.													
	Mosca blanca alodonosa, Aleurothrixus floccosus	8 - 10 l/ha	Máx. 3																
Peral	Pulgón verde del manzano, Aphis pomi	5 - 6 l/ha	Máx. 2	7 días	800 - 1000 l/ha	Aplicar durante BBCH 70-95.													
	Psila del peral, Cacopsylla pyri	8 - 10 l/ha	Máx. 3																
Toronja, pomelo	Pulgón del algodón, Aphis gossypii	5 - 6 l/ha	Máx. 2	7 días	800 - 1000 l/ha	(Uso menor por jerarquía de cultivos). Aplicar durante BBCH 70-95.													
	Mosca blanca alodonosa, Aleurothrixus floccosus	8 - 10 l/ha	Máx. 3																
Ámbito de Aplicación: Agrario - Tipo de Usuario: No Profesional - Sistema de Cultivo: Invernadero - Método de Aplicación: Manual con mochila																			
Calabacín	Áfidos, pulgones, Aphididae	5 - 6 l/ha	Máx. 2	7 días	800 - 1000 l/ha	Exclusivamente en estructuras cerradas (invernaderos profesionales de alta y baja tecnología). Aplicar durante BBCH 13-89.													
	Mosca blanca, Bemisia tabaci																		
	Mosca blanca, Trialeurodes vaporariorum	8 - 10 l/ha	Máx. 3	7 días	800 - 1000 l/ha	(Uso menor por jerarquía de cultivos). Exclusivamente en estructuras cerradas (invernaderos profesionales de alta y baja tecnología). Aplicar durante BBCH 13-89.													
	Áfidos, pulgones, Aphididae	5 - 6 l/ha	Máx. 2																
Calabaza	Mosca blanca, Bemisia tabaci			7 días	800 - 1000 l/ha	Exclusivamente en estructuras cerradas (invernaderos profesionales de alta y baja tecnología). Aplicar durante BBCH 13-89.													
	Mosca blanca, Trialeurodes vaporariorum	8 - 10 l/ha	Máx. 3																
	Áfidos, pulgones, Aphididae	5 - 6 l/ha	Máx. 2	7 días	800 - 1000 l/ha	Exclusivamente en estructuras cerradas (invernaderos profesionales de alta y baja tecnología). Aplicar durante BBCH 13-89.													
	Mosca blanca, Bemisia tabaci																		
Melón	Mosca blanca, Trialeurodes vaporariorum	8 - 10 l/ha	Máx. 3	7 días	800 - 1000 l/ha	Exclusivamente en estructuras cerradas (invernaderos profesionales de alta y baja tecnología). Aplicar durante BBCH 13-89.													
	Áfidos, pulgones, Aphididae	5 - 6 l/ha	Máx. 2																
	Mosca blanca, Bemisia tabaci			7 días	800 - 1000 l/ha	Exclusivamente en estructuras cerradas (invernaderos profesionales de alta y baja tecnología). Aplicar durante BBCH 13-89.													
	Mosca blanca, Trialeurodes vaporariorum	8 - 10 l/ha	Máx. 3																
Pepino	Áfidos, pulgones, Aphididae	5 - 6 l/ha	Máx. 2	7 días	800 - 1000 l/ha	Exclusivamente en estructuras cerradas (invernaderos profesionales de alta y baja tecnología). Aplicar durante BBCH 13-89.													
	Mosca blanca, Bemisia tabaci																		
	Mosca blanca, Trialeurodes vaporariorum	8 - 10 l/ha	Máx. 3	7 días	800 - 1000 l/ha	Exclusivamente en estructuras cerradas (invernaderos profesionales de alta y baja tecnología). Aplicar durante BBCH 13-89.													
	Áfidos, pulgones, Aphididae	5 - 6 l/ha	Máx. 2																
Sandía	Mosca blanca, Bemisia tabaci			7 días	800 - 1000 l/ha	Exclusivamente en estructuras cerradas (invernaderos profesionales de alta y baja tecnología). Aplicar durante BBCH 13-89.													
	Mosca blanca, Trialeurodes vaporariorum	8 - 10 l/ha	Máx. 3																
	Áfidos, pulgones, Aphididae	5 - 6 l/ha	Máx. 2	7 días	800 - 1000 l/ha	Exclusivamente en estructuras cerradas (invernaderos profesionales de alta y baja tecnología). Aplicar durante BBCH 13-89.													
	Mosca blanca, Bemisia tabaci																		
Solanáceas (excepto patata)	Mosca blanca, Trialeurodes vaporariorum	8 - 10 l/ha	Máx. 3	7 días	800 - 1000 l/ha	Exclusivamente en estructuras cerradas (invernaderos profesionales de alta y baja tecnología). Uso exclusivo en tomate, pimiento, berenjena, okra, bayas de Goji, alquequenjes. Aplicar durante BBCH 13-89.													
	Áfidos, pulgones, Aphididae	5 - 6 l/ha	Máx. 2																
Ámbito de Aplicación: Agrario - Tipo de Usuario: Profesional - Sistema de Cultivo: Aire libre - Método de Aplicación: Manual con lanza o pistola																			
Caqui	Mosca blanca, Dialeurodes citri	8 - 10 l/ha	Máx. 3	7 días	800 - 1000 l/ha	(Uso menor por jerarquía de cultivos). Aplicar durante BBCH 70-95.													
Lima	Pulgón del algodón, Aphis gossypii	5 - 6 l/ha	Máx. 2	7 días	800 - 1000 l/ha	(Uso menor por jerarquía de cultivos). Aplicar durante BBCH 70-95.													
	Mosca blanca alodonosa, Aleurothrixus floccosus	8 - 10 l/ha	Máx. 3																
Mandarino (incluido clementino e híbridos)	Pulgón del algodón, Aphis gossypii	5 - 6 l/ha	Máx. 2	7 días	800 - 1000 l/ha	Aplicar durante BBCH 70-95.													
Manzano	Pulgón verde del manzano, Aphis pomi	5 - 6 l/ha	Máx. 2	7 días	800 - 1000 l/ha	Aplicar durante BBCH 70-95.													
Melocotonero	Pulgón verde, Myzus persicae	5 - 6 l/ha	Máx. 2	7 días	800 - 1000 l/ha	Incluye nectarino. Aplicar durante BBCH 70-95.													



Naranja	Pulgón del algodón, Aphis gossypii	5 - 6 l/ha	Máx. 2	7 días	800 - 1000 l/ha	Aplicar durante BBCH 70-95.
	Mosca blanca algodonosa, Aleurothrixus floccosus	8 - 10 l/ha	Máx. 3			
Peral	Pulgón verde del manzano, Aphis pomi	5 - 6 l/ha	Máx. 2	7 días	800 - 1000 l/ha	Aplicar durante BBCH 70-95.
	Psila del peral, Cacopsylla pyri	8 - 10 l/ha	Máx. 3			
Toronja, pomelo	Pulgón del algodón, Aphis gossypii	5 - 6 l/ha	Máx. 2	7 días	800 - 1000 l/ha	(Uso menor por jerarquía de cultivos). Aplicar durante BBCH 70-95.
	Mosca blanca algodonosa, Aleurothrixus floccosus	8 - 10 l/ha	Máx. 3			
Ámbito de Aplicación: Agrario - Tipo de Usuario: Profesional - Sistema de Cultivo: Aire libre - Método de Aplicación: Manual con mochila						
Caqui	Mosca blanca, Dialeurodes citri	8 - 10 l/ha	Máx. 3	7 días	800 - 1000 l/ha	(Uso menor por jerarquía de cultivos). Aplicar durante BBCH 70-95.
Lima	Pulgón del algodón, Aphis gossypii	5 - 6 l/ha	Máx. 2	7 días	800 - 1000 l/ha	(Uso menor por jerarquía de cultivos). Aplicar durante BBCH 70-95.
	Mosca blanca algodonosa, Aleurothrixus floccosus	8 - 10 l/ha	Máx. 3			
Mandarino (incluido clementino e híbridos)	Pulgón del algodón, Aphis gossypii	5 - 6 l/ha	Máx. 2	7 días	800 - 1000 l/ha	Aplicar durante BBCH 70-95.
Manzano	Pulgón verde del manzano, Aphis pomi	5 - 6 l/ha	Máx. 2	7 días	800 - 1000 l/ha	Aplicar durante BBCH 70-95.
Melocotonero	Pulgón verde, Myzus persicae	5 - 6 l/ha	Máx. 2	7 días	800 - 1000 l/ha	Incluye nectarino. Aplicar durante BBCH 70-95.
Naranja	Pulgón del algodón, Aphis gossypii	5 - 6 l/ha	Máx. 2	7 días	800 - 1000 l/ha	Aplicar durante BBCH 70-95.
	Mosca blanca algodonosa, Aleurothrixus floccosus	8 - 10 l/ha	Máx. 3			
Peral	Pulgón verde del manzano, Aphis pomi	5 - 6 l/ha	Máx. 2	7 días	800 - 1000 l/ha	Aplicar durante BBCH 70-95.
	Psila del peral, Cacopsylla pyri	8 - 10 l/ha	Máx. 3			
Toronja, pomelo	Pulgón del algodón, Aphis gossypii	5 - 6 l/ha	Máx. 2	7 días	800 - 1000 l/ha	(Uso menor por jerarquía de cultivos). Aplicar durante BBCH 70-95.
	Mosca blanca algodonosa, Aleurothrixus floccosus	8 - 10 l/ha	Máx. 3			
Ámbito de Aplicación: Agrario - Tipo de Usuario: Profesional - Sistema de Cultivo: Aire libre - Método de Aplicación: Pulverización normal con tractor						
Caqui	Mosca blanca, Dialeurodes citri	8 - 10 l/ha	Máx. 3	7 días	800 - 1000 l/ha	(Uso menor por jerarquía de cultivos). Aplicar durante BBCH 70-95.
Lima	Pulgón del algodón, Aphis gossypii	5 - 6 l/ha	Máx. 2	7 días	800 - 1000 l/ha	(Uso menor por jerarquía de cultivos). Aplicar durante BBCH 70-95.
	Mosca blanca algodonosa, Aleurothrixus floccosus	8 - 10 l/ha	Máx. 3			
Mandarino (incluido clementino e híbridos)	Pulgón del algodón, Aphis gossypii	5 - 6 l/ha	Máx. 2	7 días	800 - 1000 l/ha	Aplicar durante BBCH 70-95.
Manzano	Pulgón verde del manzano, Aphis pomi	5 - 6 l/ha	Máx. 2	7 días	800 - 1000 l/ha	Aplicar durante BBCH 70-95.
Melocotonero	Pulgón verde, Myzus persicae	5 - 6 l/ha	Máx. 2	7 días	800 - 1000 l/ha	Incluye nectarino. Aplicar durante BBCH 70-95.
Naranja	Pulgón del algodón, Aphis gossypii	5 - 6 l/ha	Máx. 2	7 días	800 - 1000 l/ha	Aplicar durante BBCH 70-95.
	Mosca blanca algodonosa, Aleurothrixus floccosus	8 - 10 l/ha	Máx. 3			
Peral	Pulgón verde del manzano, Aphis pomi	5 - 6 l/ha	Máx. 2	7 días	800 - 1000 l/ha	Aplicar durante BBCH 70-95.
	Psila del peral, Cacopsylla pyri	8 - 10 l/ha	Máx. 3			
Toronja, pomelo	Pulgón del algodón, Aphis gossypii	5 - 6 l/ha	Máx. 2	7 días	800 - 1000 l/ha	(Uso menor por jerarquía de cultivos). Aplicar durante BBCH 70-95.
	Mosca blanca algodonosa, Aleurothrixus floccosus	8 - 10 l/ha	Máx. 3			
Ámbito de Aplicación: Agrario - Tipo de Usuario: Profesional - Sistema de Cultivo: Invernadero - Método de Aplicación: Carretilla						
	Áfidos, pulgones, Aphididae	5 - 6 l/ha	Máx. 2			

 GOBIERNO DE ESPAÑA		 MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN		ES-02086		PHYTOSOAP 43		SECRETARIA GENERAL DE RECURSOS AGRARIOS Y SEGURIDAD ALIMENTARIA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD DE LA PRODUCCIÓN AGROALIMENTARIA Y BIENESTAR ANIMAL	
Calabacín	Mosca blanca, Bemisia tabaci							Exclusivamente en estructuras cerradas (invernaderos profesionales de alta y baja tecnología). Aplicar durante BBCH 13-89.	
	Mosca blanca, Trialeurodes vaporariorum	8 - 10 l/ha	Máx. 3	7 días	800 - 1000 l/ha				
Calabaza	Áfidos, pulgones, Aphididae	5 - 6 l/ha	Máx. 2					(Uso menor por jerarquía de cultivos). Exclusivamente en estructuras cerradas (invernaderos profesionales de alta y baja tecnología). Aplicar durante BBCH 13-89.	
	Mosca blanca, Bemisia tabaci								
Calabaza	Mosca blanca, Trialeurodes vaporariorum	8 - 10 l/ha	Máx. 3	7 días	800 - 1000 l/ha				
	Áfidos, pulgones, Aphididae	5 - 6 l/ha	Máx. 2						
Melón	Mosca blanca, Bemisia tabaci							Exclusivamente en estructuras cerradas (invernaderos profesionales de alta y baja tecnología). Aplicar durante BBCH 13-89.	
	Mosca blanca, Trialeurodes vaporariorum	8 - 10 l/ha	Máx. 3	7 días	800 - 1000 l/ha				
Pepino	Áfidos, pulgones, Aphididae	5 - 6 l/ha	Máx. 2					(Uso menor por jerarquía de cultivos). Exclusivamente en estructuras cerradas (invernaderos profesionales de alta y baja tecnología). Aplicar durante BBCH 13-89.	
	Mosca blanca, Bemisia tabaci								
Pepino	Mosca blanca, Trialeurodes vaporariorum	8 - 10 l/ha	Máx. 3	7 días	800 - 1000 l/ha				
	Áfidos, pulgones, Aphididae	5 - 6 l/ha	Máx. 2						
Sandía	Mosca blanca, Bemisia tabaci							Exclusivamente en estructuras cerradas (invernaderos profesionales de alta y baja tecnología). Aplicar durante BBCH 13-89.	
	Mosca blanca, Trialeurodes vaporariorum	8 - 10 l/ha	Máx. 3	7 días	800 - 1000 l/ha				
Solanáceas (excepto patata)	Áfidos, pulgones, Aphididae	5 - 6 l/ha	Máx. 2					Exclusivamente en estructuras cerradas (invernaderos profesionales de alta y baja tecnología). Uso exclusivo en tomate, pimiento, berenjena, okra, bayas de Goji, alquequenjes. Aplicar durante BBCH 13-89.	
	Mosca blanca, Bemisia tabaci								
Solanáceas (excepto patata)	Mosca blanca, Trialeurodes vaporariorum	8 - 10 l/ha	Máx. 3	7 días	800 - 1000 l/ha				
	Ámbito de Aplicación: Agrario - Tipo de Usuario: Profesional - Sistema de Cultivo: Invernadero - Método de Aplicación: Manual con lanza o pistola								
Calabacín	Áfidos, pulgones, Aphididae	5 - 6 l/ha	Máx. 2					Exclusivamente en estructuras cerradas (invernaderos profesionales de alta y baja tecnología). Aplicar durante BBCH 13-89.	
	Mosca blanca, Bemisia tabaci								
Calabacín	Mosca blanca, Trialeurodes vaporariorum	8 - 10 l/ha	Máx. 3	7 días	800 - 1000 l/ha				
	Áfidos, pulgones, Aphididae	5 - 6 l/ha	Máx. 2						
Calabaza	Mosca blanca, Bemisia tabaci							(Uso menor por jerarquía de cultivos). Exclusivamente en estructuras cerradas (invernaderos profesionales de alta y baja tecnología). Aplicar durante BBCH 13-89.	
	Mosca blanca, Trialeurodes vaporariorum	8 - 10 l/ha	Máx. 3	7 días	800 - 1000 l/ha				
Melón	Áfidos, pulgones, Aphididae	5 - 6 l/ha	Máx. 2					Exclusivamente en estructuras cerradas (invernaderos profesionales de alta y baja tecnología). Aplicar durante BBCH 13-89.	
	Mosca blanca, Bemisia tabaci								
Melón	Mosca blanca, Trialeurodes vaporariorum	8 - 10 l/ha	Máx. 3	7 días	800 - 1000 l/ha				
	Áfidos, pulgones, Aphididae	5 - 6 l/ha	Máx. 2						
Pepino	Mosca blanca, Bemisia tabaci							(Uso menor por jerarquía de cultivos). Exclusivamente en estructuras cerradas (invernaderos profesionales de alta y baja tecnología). Aplicar durante BBCH 13-89.	
	Mosca blanca, Trialeurodes vaporariorum	8 - 10 l/ha	Máx. 3	7 días	800 - 1000 l/ha				
Pepino	Áfidos, pulgones, Aphididae	5 - 6 l/ha	Máx. 2						
	Mosca blanca, Bemisia tabaci								

Sandía	Mosca blanca, Bemisia tabaci					
	Mosca blanca, Trialeurodes vaporariorum	8 - 10 l/ha	Máx. 3	7 días	800 - 1000 l/ha	Exclusivamente en estructuras cerradas (invernaderos profesionales de alta y baja tecnología). Aplicar durante BBCH 13-89.
Solanáceas (excepto patata)	Áfidos, pulgones, Aphididae	5 - 6 l/ha	Máx. 2			
	Mosca blanca, Bemisia tabaci					
	Mosca blanca, Trialeurodes vaporariorum	8 - 10 l/ha	Máx. 3	7 días	800 - 1000 l/ha	Exclusivamente en estructuras cerradas (invernaderos profesionales de alta y baja tecnología). Uso exclusivo en tomate, pimiento, berenjena, okra, bayas de Goji, alquequenjes. Aplicar durante BBCH 13-89.
Ámbito de Aplicación: Agrario - Tipo de Usuario: Profesional - Sistema de Cultivo: Invernadero - Método de Aplicación: Manual con mochila						
Calabacín	Áfidos, pulgones, Aphididae	5 - 6 l/ha	Máx. 2			
	Mosca blanca, Bemisia tabaci					
	Mosca blanca, Trialeurodes vaporariorum	8 - 10 l/ha	Máx. 3	7 días	800 - 1000 l/ha	Exclusivamente en estructuras cerradas (invernaderos profesionales de alta y baja tecnología). Aplicar durante BBCH 13-89.
Calabaza	Áfidos, pulgones, Aphididae	5 - 6 l/ha	Máx. 2			
	Mosca blanca, Bemisia tabaci					
	Mosca blanca, Trialeurodes vaporariorum	8 - 10 l/ha	Máx. 3	7 días	800 - 1000 l/ha	(Uso menor por jerarquía de cultivos). Exclusivamente en estructuras cerradas (invernaderos profesionales de alta y baja tecnología). Aplicar durante BBCH 13-89.
Melón	Áfidos, pulgones, Aphididae	5 - 6 l/ha	Máx. 2			
	Mosca blanca, Bemisia tabaci					
	Mosca blanca, Trialeurodes vaporariorum	8 - 10 l/ha	Máx. 3	7 días	800 - 1000 l/ha	Exclusivamente en estructuras cerradas (invernaderos profesionales de alta y baja tecnología). Aplicar durante BBCH 13-89.
Pepino	Áfidos, pulgones, Aphididae	5 - 6 l/ha	Máx. 2			
	Mosca blanca, Bemisia tabaci					
	Mosca blanca, Trialeurodes vaporariorum	8 - 10 l/ha	Máx. 3	7 días	800 - 1000 l/ha	(Uso menor por jerarquía de cultivos). Exclusivamente en estructuras cerradas (invernaderos profesionales de alta y baja tecnología). Aplicar durante BBCH 13-89.
Sandía	Áfidos, pulgones, Aphididae	5 - 6 l/ha	Máx. 2			
	Mosca blanca, Bemisia tabaci					
	Mosca blanca, Trialeurodes vaporariorum	8 - 10 l/ha	Máx. 3	7 días	800 - 1000 l/ha	Exclusivamente en estructuras cerradas (invernaderos profesionales de alta y baja tecnología). Aplicar durante BBCH 13-89.
Solanáceas (excepto patata)	Áfidos, pulgones, Aphididae	5 - 6 l/ha	Máx. 2			
	Mosca blanca, Bemisia tabaci					
	Mosca blanca, Trialeurodes vaporariorum	8 - 10 l/ha	Máx. 3	7 días	800 - 1000 l/ha	Exclusivamente en estructuras cerradas (invernaderos profesionales de alta y baja tecnología). Uso exclusivo en tomate, pimiento, berenjena, okra, bayas de Goji, alquequenjes. Aplicar durante BBCH 13-89.

Plazos de Seguridad (Protección del Consumidor)	
USO	P.S. (días)
Caqui, Lima, Mandarino (incluido clementino e híbridos), Manzano, Melocotonero, Naranja, Peral, Toronja, pomelo, Calabacín, Calabaza, Melón, Pepino, Sandía, Solanáceas (excepto patata)	1

Condiciones Generales de Uso
Tratamiento insecticida al aire libre e invernadero mediante pulverización foliar según el cuadro de usos autorizados. En la etiqueta se darán las indicaciones oportunas para la correcta utilización del producto.

Clase de Usuario
Uso profesional. Uso no profesional.



Mitigación de riesgos en la manipulación
SEGURIDAD DEL APLICADOR Uso profesional: El aplicador utilizará durante la mezcla/carga: - Guantes de protección química. - Ropa de protección nivel C1 o en su defecto tipo 6. - Ropa de protección parcial de nivel C3, o en su defecto ropa de protección parcial tipo delantal PB3 o PB4. - Calzado de uso profesional de material polimérico. Durante la aplicación: - Guantes de protección química. - Ropa de protección nivel C1 o en su defecto tipo 6. - Calzado de uso profesional de material polimérico. SEGURIDAD DEL TRABAJADOR El trabajador utilizará en la reentrada: - Ropa de protección nivel C1 o ropa de trabajo. - Calzado cerrado. NORMATIVA APLICABLE A LOS EPIS ☐ Guantes de protección contra productos químicos, según UNE-EN 374-1:2016 y su modificación UNE-EN ISO 374-1:2016/A1:2018. Los guantes deben ser reutilizables al manipular el producto concentrado. Para el contacto con el producto diluido o residuo seco, podrán ser reutilizables o desechables. Deben tener la resistencia mecánica suficiente para evitar la rotura. Si se dañan, deben reemplazarse de inmediato. ☐ Ropa de protección química tipo 6: frente a salpicaduras de productos líquidos, conforme a norma UNE-EN 13034:2005+A1:2009. ☐ Ropa de protección: nivel C1, C3, tanto de protección completa como parcial, frente a productos fitosanitarios según norma UNE-EN ISO 27065:2017 y su modificación UNE EN ISO 27065: 2017/A1:2019. ☐ Ropa de protección parcial tipo PB3 con uniones herméticas a los líquidos o de tipo PB4 con uniones herméticas a las pulverizaciones según norma UNE-EN 14605:2005+A1:2009. ☐ Calzado de uso profesional, al menos botas tobilleras, de caucho u otro material polimérico (clasificación II). ☐ Ropa de trabajo adecuada: Mono o chaqueta de manga larga y pantalón largo hechos de algodón (≥ 300 g/m2) o de algodón y al menos un 65% de poliéster (≥ 245 g/m2). Medidas adicionales de mitigación del riesgo para uso profesional al aire libre: ☐ Durante la aplicación con tractor se deberán usar los guantes de protección química únicamente para manipular el equipo de aplicación o superficies contaminadas. ☐ En la limpieza y mantenimiento del equipo se aplicarán las mismas medidas de protección que en mezcla/carga. ☐ Evitar el contacto con el follaje húmedo durante la aplicación ☐ No entrar en los cultivos tratados hasta que se haya secado la pulverización. Medidas adicionales de mitigación del riesgo para uso profesional en invernadero: ☐ En la limpieza y mantenimiento del equipo se aplicarán las mismas medidas de protección que en mezcla/carga. ☐ Evitar el contacto con el follaje húmedo durante la aplicación. ☐ No entrar en los cultivos tratados hasta que se haya secado la pulverización. Medidas adicionales de mitigación del riesgo para uso no profesional al aire libre e invernadero: ☐ No entrar en contacto con las áreas tratadas hasta que se haya secado la pulverización. ☐ Se recomienda el uso de guantes de protección química durante el manejo del producto. ☐ En el caso de que sea necesario realizar tareas de mantenimiento en los cultivos tratados, se recomienda ropa de manga larga, pantalón largo y calzado cerrado. Spo5: Ventilar las zonas/ los invernaderos tratados (bien/ durante un tiempo especificado/ hasta que se haya secado la pulverización) antes de volver a entrar.



Otras Indicaciones reglamentarias

OBSERVACIONES (esta información no tiene que figurar en la etiqueta).
En cumplimiento del artículo 45 del Reglamento (CE) nº 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2008 sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas (CLP), los usuarios intermedios o importadores de mezclas clasificadas para la salud humana o por sus peligros físicos, deberán enviar la información pertinente para la formulación de medidas preventivas y curativas, en particular para la respuesta sanitaria en caso de urgencia al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (Organismo designado a tal efecto según la Ley 8/2010 de 31 de marzo).
La Orden JUS/288/2021, de 25 de marzo, regula el procedimiento de comunicación de dicha información al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.
Para incluir el teléfono del Servicio de Información Toxicológica en la etiqueta, instrucciones de primeros auxilios, así como en el apartado 1.4 de la Ficha de Datos de Seguridad es obligatorio haber realizado previamente el alta de la ficha toxicológica según el procedimiento mencionado.
Lo que se informa a los efectos dispuestos en el Real Decreto y los Reglamentos antes citados.

INDICACIONES QUE DEBEN FIGURAR EN LA ETIQUETA
Otras leyendas e indicaciones.
Autorizado para uso no profesional
EUH208: Contiene 1,2-benzisotiazol-3-(2H)-ona (CAS 2634-33-5). Puede provocar una reacción alérgica.
EUH401: A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso.