

		GOBIERNO DE ESPAÑA		MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN		ES-01839		FLURICO		SECRETARIA GENERAL DE RECURSOS AGRARIOS Y SEGURIDAD ALIMENTARIA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD DE LA PRODUCCIÓN AGROALIMENTARIA Y BIENESTAR ANIMAL	
Colinabo	Noctuidos, Noctuidae		10 Kg/ha	1	--	(Uso menor por jerarquía de cultivos) Contra Agrotis spp., Peridroma spp. y Spodoptera spp. Antes o durante el momento de la siembra.					
	Miriápodos					(Uso menor por jerarquía de cultivos) Contra Blaniulus spp. Antes o durante el momento de la siembra.					
	Escarabeidos, Scarabaeidae					(Uso menor por jerarquía de cultivos) Contra Rhizotrogus spp., Melolontha spp., Anoxia spp. y Tropinota spp. Antes o durante el momento de la siembra.					
	Elatéridos, Elateridae					(Uso menor por jerarquía de cultivos). Antes o durante el momento de la siembra.					
	Elatéridos, Elateridae					Antes o durante el momento de la siembra.					
Girasol	Elatéridos, Elateridae		10 Kg/ha	1	--	Antes o durante el momento de la siembra.					
	Noctuidos, Noctuidae					Contra Agrotis spp., Peridroma spp. y Spodoptera spp. Antes o durante el momento de la siembra.					
	Miriápodos					Contra Blaniulus spp. Antes o durante el momento de la siembra.					
	Escarabeidos, Scarabaeidae					Contra Rhizotrogus spp., Melolontha spp., Anoxia spp. y Tropinota spp. Antes o durante el momento de la siembra.					
	Escarabeidos, Scarabaeidae					(Uso menor por jerarquía de cultivos) Contra Agrotis spp., Peridroma spp. y Spodoptera spp. Antes o durante el momento de la siembra.					
Guisante verde	Noctuidos, Noctuidae		3 - 5 Kg/ha	1	--	(Uso menor por jerarquía de cultivos) Contra Agrotis spp., Peridroma spp. y Spodoptera spp. Antes o durante el momento de la siembra.					
	Miriápodos					(Uso menor por jerarquía de cultivos) Contra Blaniulus spp. Antes o durante el momento de la siembra.					
	Escarabeidos, Scarabaeidae					(Uso menor por jerarquía de cultivos) Contra Rhizotrogus spp., Melolontha spp., Anoxia spp. y Tropinota spp. Antes o durante el momento de la siembra.					
	Elatéridos, Elateridae					(Uso menor por jerarquía de cultivos). Antes o durante el momento de la siembra.					
	Elatéridos, Elateridae					Antes o durante el momento de la siembra.					
Haba verde	Noctuidos, Noctuidae		3 - 5 Kg/ha	1	--	(Uso menor por jerarquía de cultivos) Contra Agrotis spp., Peridroma spp. y Spodoptera spp. Antes o durante el momento de la siembra.					
	Miriápodos					(Uso menor por jerarquía de cultivos) Contra Blaniulus spp. Antes o durante el momento de la siembra.					
	Escarabeidos, Scarabaeidae					(Uso menor por jerarquía de cultivos) Contra Rhizotrogus spp., Melolontha spp., Anoxia spp. y Tropinota spp. Antes o durante el momento de la siembra.					
	Elatéridos, Elateridae					(Uso menor por jerarquía de cultivos). Antes o durante el momento de la siembra.					
	Elatéridos, Elateridae					Antes o durante el momento de la siembra.					
Hortalizas del género Brassica	Miriápodos		3 - 5 Kg/ha	1	--	(Uso menor por jerarquía de cultivos) Incluye brécol, coliflor, col de Bruselas y repollo. Contra Blaniulus spp. Antes o durante el momento de la siembra.					
	Escarabeidos, Scarabaeidae					(Uso menor por jerarquía de cultivos) Incluye brécol, coliflor, col de Bruselas y repollo. Contra Rhizotrogus spp., Melolontha spp., Anoxia spp. y Tropinota spp. Antes o durante el momento de la siembra					
	Elatéridos, Elateridae					(Uso menor por jerarquía de cultivos) Incluye brécol, coliflor, col de Bruselas y repollo. Antes o durante el momento de la siembra					
	Noctuidos, Noctuidae					(Uso menor por jerarquía de cultivos) Incluye: brécol, coliflor, col de Bruselas y repollo. Contra Agrotis spp., Peridroma spp. y Spodoptera spp. Antes o durante el momento de la siembra					
	Noctuidos, Noctuidae					(Uso menor por jerarquía de cultivos) Contra Agrotis spp., Peridroma spp. y Spodoptera spp. Antes o durante el momento de la siembra.					
Judía verde	Miriápodos		3 - 5 Kg/ha	1	--	(Uso menor por jerarquía de cultivos) Contra Blaniulus spp. Antes o durante el momento de la siembra.					
	Escarabeidos, Scarabaeidae					(Uso menor por jerarquía de cultivos) Contra Rhizotrogus spp., Melolontha spp., Anoxia spp. y Tropinota spp. Antes o durante el momento de la siembra.					
	Elatéridos, Elateridae					(Uso menor por jerarquía de cultivos). Antes o durante el momento de la siembra.					
	Elatéridos, Elateridae					Antes o durante el momento de la siembra.					
	Elatéridos, Elateridae					Antes o durante el momento de la siembra.					
	Noctuidos, Noctuidae					(Uso menor por jerarquía de cultivos) Se realizará como máximo cada 3 años, para evitar riesgo en lombrices. Contra Agrotis spp., Peridroma spp. y Spodoptera spp. Antes o durante el momento de la siembra.					
	Miriápodos					(Uso menor por jerarquía de cultivos) Se realizará como máximo cada 3 años, para evitar riesgo en lombrices. Contra Blaniulus spp. Antes o durante el momento de la siembra.					
	Escarabeidos, Scarabaeidae					(Uso menor por jerarquía de cultivos) Se realizará como máximo cada 3 años, para evitar riesgo en lombrices. Contra Rhizotrogus spp., Melolontha spp., Anoxia spp. y Tropinota spp. Antes o durante el momento de la siembra.					
	Escarabeidos, Scarabaeidae					(Uso menor por jerarquía de cultivos) Se realizará como máximo cada 3 años, para evitar riesgo en lombrices. Contra Rhizotrogus spp., Melolontha spp., Anoxia spp. y Tropinota spp. Antes o durante el momento de la siembra.					
	Típulas, Tipulidae					(Uso menor por jerarquía de cultivos) Se realizará como máximo cada 3 años, para evitar riesgo en lombrices. Contra Tipula spp. Antes o durante el momento de la siembra.					
	Diabrotica del maíz, Diabrotica virgifera										

 GOBIERNO DE ESPAÑA		MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN		ES-01839 FLURICO		SECRETARIA GENERAL DE RECURSOS AGRARIOS Y SEGURIDAD ALIMENTARIA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD DE LA PRODUCCIÓN AGROALIMENTARIA Y BIENESTAR ANIMAL
Maíz dulce	Elatéridos, Elateridae					
	Mosca de los sembrados, Delia platura	12,2 Kg/ha	1	--	(Uso menor por jerarquía de cultivos) Se realizará como máximo cada 3 años, para evitar riesgo en lombrices. Antes o durante el momento de la siembra.	
Maíz	Diabrotica del maíz, Diabrotica virgifera					
	Elatéridos, Elateridae					
	Mosca de los sembrados, Delia platura					Antes o durante el momento de la siembra.
	Noctuidos, Noctuidae					Contra Agrotis spp., Peridroma spp. y Spodoptera spp. Antes o durante el momento de la siembra.
	Miriápodos					Contra Blaniulus spp. Antes o durante el momento de la siembra.
	Escarabeidos, Scarabaeidae					Contra Rhizotrogus spp., Melolontha spp., Anoxia spp. y Tropinota spp. Antes o durante el momento de la siembra.
	Típulas, Tipulidae	3 - 5 Kg/ha	1	--		Contra Tipula spp. Antes o durante el momento de la siembra.
Melón	Elatéridos, Elateridae					Antes o durante el momento de la siembra.
	Noctuidos, Noctuidae					Contra Agrotis spp., Peridroma spp. y Spodoptera spp. Antes o durante el momento de la siembra.
	Miriápodos					Contra Blaniulus spp. Antes o durante el momento de la siembra.
	Escarabeidos, Scarabaeidae	10 Kg/ha	1	--		Contra Rhizotrogus spp., Melolontha spp., Anoxia spp. y Tropinota spp. Antes o durante el momento de la siembra.
	Noctuidos, Noctuidae					(Uso menor por jerarquía de cultivos) Contra Agrotis spp., Peridroma spp. y Spodoptera spp. Antes o durante el momento de la siembra.
Nabo	Miriápodos					(Uso menor por jerarquía de cultivos) Contra Blaniulus spp. Antes o durante el momento de la siembra.
	Escarabeidos, Scarabaeidae					(Uso menor por jerarquía de cultivos) Contra Rhizotrogus spp., Melolontha spp., Anoxia spp. y Tropinota spp. Antes o durante el momento de la siembra.
	Elatéridos, Elateridae	3 - 5 Kg/ha	1	--		(Uso menor por jerarquía de cultivos). Antes o durante el momento de la siembra.
	Noctuidos, Noctuidae					(Uso menor por jerarquía de cultivos) Contra Agrotis spp., Peridroma spp. y Spodoptera spp. Antes o durante el momento de la siembra.
	Miriápodos					(Uso menor por jerarquía de cultivos) Contra Blaniulus spp. Antes o durante el momento de la siembra.
Rábano	Escarabeidos, Scarabaeidae					(Uso menor por jerarquía de cultivos) Contra Rhizotrogus spp., Melolontha spp., Anoxia spp. y Tropinota spp. Antes o durante el momento de la siembra.
	Elatéridos, Elateridae	5 Kg/ha	2	30 días		(Uso menor por jerarquía de cultivos). Antes o durante el momento de la siembra.
	Noctuidos, Noctuidae					Contra Agrotis spp., Peridroma spp. y Spodoptera spp. Antes o durante el momento de la siembra.
	Miriápodos					Contra Blaniulus spp. Antes o durante el momento de la siembra.
	Escarabeidos, Scarabaeidae	3 - 5 Kg/ha				Contra Rhizotrogus spp., Melolontha spp., Anoxia spp. y Tropinota spp. Antes o durante el momento de la siembra.
Remolacha azucarera	Maripaca de la remolacha, Aubeonymus mariaefranciscae	6,6 Kg/ha	1	--		Antes o durante el momento de la siembra.
	Noctuidos, Noctuidae					Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver Otras Indicaciones reglamentarias (*). Contra Agrotis spp., Peridroma spp. y Spodoptera spp. Antes o durante el momento de la siembra.
	Miriápodos					Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver Otras Indicaciones reglamentarias (*). Contra Blaniulus spp. Antes o durante el momento de la siembra.
	Escarabeidos, Scarabaeidae					Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver Otras Indicaciones reglamentarias (*). Contra Rhizotrogus spp., Melolontha spp., Anoxia spp. y Tropinota spp. Antes o durante el momento de la siembra.
	Elatéridos, Elateridae	3 - 5 Kg/ha				

Condiciones Generales de Uso

Tratamiento insecticida al aire libre por pulverización con tractor. Aplicar directamente al suelo mediante maquinaria apropiada, bien antes o durante el momento de la siembra, de modo que el producto quede incorporado completamente al suelo. No se autoriza el uso en superficie, el producto solamente podrá ser aplicado enterrado en suelo. No aplicar el producto con existencia de viento en la zona, para evitar riesgo en abejas. No ha quedado demostrada la eficacia contra la plaga de Gryllotalpidae, considerada una de las más importantes en la zona mediterránea.

En la etiqueta se darán las indicaciones oportunas para la correcta aplicación del producto.



Clase de Usuario

Uso profesional.



Mitigación de riesgos en la manipulación

SEGURIDAD DEL APLICADOR:

El aplicador deberá utilizar durante la mezcla/carga:

- Guantes de protección química.
- Ropa de protección nivel C1 o equivalente.
- Calzado de uso profesional de material polimérico.
- EPR tipo FFP1 o P1.

El aplicador deberá utilizar durante la aplicación:

- Guantes de protección química.
- Ropa de protección nivel C1 o equivalente.
- Calzado de uso profesional de material polimérico.

SEGURIDAD DEL TRABAJADOR:

El trabajador utilizará durante la reentrada a los cultivos:

- Ropa de protección C1 o ropa de trabajo.
- Calzado cerrado.

NORMATIVA APLICABLE A LOS EPIS:

- Guantes de protección contra productos químicos según UNE-EN 374-1:2016 y su modificación UNE-EN 374-1:2016/A1:2018. Los guantes deben ser reutilizables al manipular el producto concentrado. Para el contacto con el producto diluido o residuo seco, pueden ser reutilizables o desechables. Deben tener la resistencia mecánica suficiente para evitar la rotura. Si se dañan, deben reemplazarse de inmediato.
- Ropa de protección: nivel C1, C2, C3, de protección completa, frente a productos fitosanitarios, según norma UNE-EN ISO 27065:2017 y su modificación UNE EN ISO 27065: 2017/A1:2019.
- Calzado de uso profesional, al menos botas tobilleras, de caucho u otro material polimérico (clasificación II).
- Ropa de trabajo adecuada: Mono o chaqueta de manga larga y pantalón largo hechos de algodón (≥ 300 g/m2) o de algodón y al menos un 65% de poliéster (≥ 245 g/m2).
- Equipo de protección respiratoria: Máscara completa conforme a la norma UNE-EN 136:1998, media máscara conforme UNE-EN 140/AC:2000, con filtro P1 contra partículas conforme a la norma UNE-EN 143:2022 o medias máscaras filtrantes de protección contra partículas FFP1 conforme a la norma EN 149:2001+ A1:2010.

Medidas adicionales de la mitigación del riesgo:

- Durante la aplicación con tractor se deberán usar los guantes de protección química únicamente para manipular el equipo de aplicación o superficies contaminadas.
- En la limpieza y mantenimiento del equipo se aplicarán las mismas medidas de protección que en mezcla/carga.

SPo2: Lávese toda la ropa de protección después de usarla.



Otras Indicaciones reglamentarias

OBSERVACIONES (esta información no tiene que figurar en la etiqueta).

En cumplimiento del artículo 45 del Reglamento (CE) nº 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2008 sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas (CLP), los usuarios intermedios o importadores de mezclas clasificadas para la salud humana o por sus peligros físicos, deberán enviar la información pertinente para la formulación de medidas preventivas y curativas, en particular para la respuesta sanitaria en caso de urgencia al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (Organismo designado a tal efecto según la Ley 8/2010 de 31 de marzo).

La Orden JUS/288/2021, de 25 de marzo, regula el procedimiento de comunicación de dicha información al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.

Para incluir el teléfono del Servicio de Información Toxicológica en la etiqueta, instrucciones de primeros auxilios, así como en el apartado 1.4 de la Ficha de Datos de Seguridad es obligatorio haber realizado previamente el alta de la ficha toxicológica según el procedimiento mencionado.

Lo que se informa a los efectos dispuestos en el Real Decreto y los Reglamentos antes citados.

INDICACIONES QUE DEBEN FIGURAR EN LA ETIQUETA.

Otras leyendas e indicaciones.

EUH401: A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso.

(*) La etiqueta deberá incluir una referencia a la responsabilidad de la persona que utilice el producto fitosanitario con respecto a la eficacia o la fitotoxicidad del uso.