

**Datos del Producto**

**Número de Registro:** ES-01159 **Estado:**  Vigente **Fechas** **Inscripción:** 29/07/2020 **Renovación:** **Caducidad:** 31/08/2026  
**Nombre Comercial:** ELIREX ONE

**Titular**

**DE SANGOSSE S.A.S.**  
 BONNEL - CS 10005  
 F-47480 PontDuCasse  
 FRANCIA

**Fabricante**

**DE SANGOSSE S.A.S.**  
 BONNEL - CS 10005  
 F-47480 PontDuCasse  
 FRANCIA

**Composición**

METALDEHIDO 2,5% [GB] P/P

**Envases**

Bote de plástico HDPE de 3 a 5 kg.Saco de papel multicapa de 5 a 25 kg.Sacos de polipropileno tejido de 5 a 25 kg.

**Usos y Dosis Autorizados**

USO	AGENTE	Dosis	Nº Aplic.	Intervalos	Vol. Caldo	Condic. Especifico
Alcachofa	Babosas, limacos					
	Caracoles	5 Kg/ha	1-4	5 días	No procede	Aplicar entre BBCH 00-39 en todo el terreno.
Arbustos frutales	Babosas, limacos					
	Caracoles	5 Kg/ha	1-4	5 días	No procede	Aplicar entre BBCH 00-69 en todo el terreno o en la línea de cultivo.
Arbustos y pequeños árboles ornamentales	Caracoles					Uso al aire libre e invernadero. Incluye plantas para producción de flor. Aplicar entre BBCH 00-99 en todo el terreno.
	Babosas, limacos	5 Kg/ha	1-4	5 días	No procede	Uso al aire libre e invernadero. incluye plantas para producción de flor. Aplicar entre BBCH 00-99 en todo el terreno.
Cereales de invierno / primavera	Babosas, limacos					
	Caracoles	4 - 5 Kg/ha	1-4	5 días	No procede	Aplicar entre BBCH 00-29. Si se aplica en línea de siembra o en mezcla con las semillas aplicar a una dosis de 4 kg/ha y si se aplica en campo abierto aplicar una dosis de 5 kg/ha.
Céspedes	Babosas, limacos					
	Caracoles	4 - 5 Kg/ha	1-4	5 días	No procede	Aplicar entre BBCH 00-99. Si se aplica en línea de siembra o en mezcla con las semillas aplicar a una dosis de 4 kg/ha y si se aplica en campo abierto aplicar una dosis de 5 kg/ha.

Cítricos	Babosas, limacos Caracoles	5 Kg/ha	1-4	5 días	No procede	Aplicar entre BBCH 00-69 en todo el terreno o en la línea de cultivo.
Espinacas y similares	Babosas, limacos Caracoles	5 Kg/ha	1-4	5 días	No procede	Uso al aire libre e invernadero. Aplicar entre BBCH 00-41 en todo el terreno.
Fresal	Babosas, limacos Caracoles	5 Kg/ha	1-4	5 días	No procede	Uso al aire libre, invernadero y cultivo protegido. Aplicar entre BBCH 00-69 en todo el terreno o en la línea de cultivo.
Frutales de cáscara	Babosas, limacos Caracoles	5 Kg/ha	1-4	5 días	No procede	Aplicar entre BBCH 00-69 en todo el terreno o en la línea de cultivo.
Frutales de hueso	Babosas, limacos Caracoles	5 Kg/ha	1-4	5 días	No procede	Aplicar entre BBCH 00-69 en todo el terreno o en la línea de cultivo.
Frutales de pepita	Babosas, limacos				NO APLICA	
	Caracoles	5 Kg/ha	1-4	5 días	No procede	Aplicar entre BBCH 00-69 en todo el terreno o en la línea de cultivo.
Hierbas aromáticas y flores comestibles	Babosas, limacos Caracoles	5 Kg/ha	1-4	5 días	No procede	Uso al aire libre e invernadero. Aplicar entre BBCH 00-41 en todo el terreno.
Hortalizas del género Brassica	Babosas, limacos Caracoles	5 Kg/ha	1-4	5 días	No procede	Aplicar al aire libre entre el BBCH 00 y antes del BBCH 41 en todo el terreno.
Lechuga y similares	Babosas, limacos Caracoles	5 Kg/ha	1-4	5 días	No procede	Uso al aire libre e invernadero. Aplicar entre BBCH 00-41 en todo el terreno.
Leguminosas de grano	Babosas, limacos Caracoles	5 Kg/ha	1-4	5 días	No procede	Aplicar entre BBCH 00-15 en todo el terreno.
Leguminosas verdes (frescas)	Babosas, limacos Caracoles	5 Kg/ha	1-4	5 días	No procede	Aplicar entre BBCH 00-15 en todo el terreno.
Maíz dulce	Babosas, limacos					
	Caracoles	4 - 5 Kg/ha	1-4	5 días	No procede	Aplicar entre BBCH 00-15. Si se aplica en línea de siembra en el surco aplicar a una dosis de 4 kg/ha y si se aplica en campo abierto aplicar una dosis de 5 kg/ha.
Maíz	Babosas, limacos					
	Caracoles	4 - 5 Kg/ha	1-4	5 días	No procede	Aplicar entre BBCH 00-15. Si se aplica en línea de siembra en el surco aplicar a una dosis de 4 kg/ha y si se aplica en campo abierto aplicar una dosis de 5 kg/ha.
Mijo	Babosas, limacos					
	Caracoles	4 - 5 Kg/ha	1-4	5 días	No procede	Aplicar entre BBCH 00-15. Si se aplica en línea de siembra en el surco aplicar a una dosis de 4 kg/ha y si se aplica en campo abierto aplicar una dosis de 5 kg/ha.
Nabo	Babosas, limacos					
	Caracoles	4 - 5 Kg/ha	1-4	5 días	No procede	Aplicar entre BBCH 00-15. Si se aplica en línea de siembra en el surco aplicar a una dosis de 4 kg/ha y si se aplica en campo abierto aplicar una dosis de 5 kg/ha.
	Babosas, limacos					

Oleaginosas	Caracoles	4 - 5 Kg/ha	1-4	5 días	No procede	Excepto cacahuete. Aplicar entre BBCH 00-17. Si se aplica en línea de siembra o en mezcla de semillas aplicar a una dosis de 4 kg/ha y si se aplica en campo abierto aplicar una dosis de 5 kg/ha.
Ornamentales herbáceas	Caracoles					Uso al aire libre e invernadero. Incluye plantas para producción de flor. Aplicar entre BBCH 00-99 en todo el terreno.
	Babosas, limacos	5 Kg/ha	1-4	5 días	No procede	Uso al aire libre e invernadero. Incluye plantas para producción de flor. Aplicar entre BBCH 00-99 en todo el terreno.
Pastos y praderas	Caracoles	4 - 5 Kg/ha	1-4	5 días	No procede	Aplicar entre BBCH 00-15. Si se aplica en línea de siembra o en mezcla con las semillas aplicar a una dosis de 4 kg/ha y si se aplica en campo abierto aplicar una dosis de 5 kg/ha.
	Babosas, limacos					
Patata	Caracoles	5 Kg/ha	1-4	5 días	No procede	Uso al aire libre. Aplicar desde BBCH 00-97, desde la plantación hasta el final de la senescencia.
	Babosas, limacos					
Remolacha azucarera	Caracoles	4 - 5 Kg/ha	1-4	5 días	No procede	Aplicar entre BBCH 00-15. Si se aplica en línea de siembra en el surco aplicar a una dosis de 4 kg/ha y si se aplica en campo abierto aplicar una dosis de 5 kg/ha.
	Babosas, limacos					
Remolacha forrajera	Caracoles	4 - 5 Kg/ha	1-4	5 días	No procede	Aplicar entre BBCH 00-15. Si se aplica en línea de siembra en el surco aplicar a una dosis de 4 kg/ha y si se aplica en campo abierto aplicar una dosis de 5 kg/ha.
	Babosas, limacos					
Sorgo	Caracoles	4 - 5 Kg/ha	1-4	5 días	No procede	Aplicar entre BBCH 00-15. Si se aplica en línea de siembra en el surco aplicar a una dosis de 4 kg/ha y si se aplica en campo abierto aplicar una dosis de 5 kg/ha.
	Babosas, limacos					
Vid	Caracoles	5 Kg/ha	1-4	5 días	No procede	Aplicar entre BBCH 00-69 en todo el terreno o en la línea de cultivo.
	Babosas, limacos					

**Plazos de Seguridad (Protección del Consumidor)**



USO	P.S. (días)
Patata	7
Pastos y praderas	49
Alcachofa, Arbustos frutales, Arbustos y pequeños árboles ornamentales, Cereales de invierno / primavera, Céspedes, Cítricos, Espinacas y similares, Fresal, Frutales de cáscara, Frutales de hueso, Frutales de pepita, Hierbas aromáticas y flores comestibles, Hortalizas del género Brassica, Lechuga y similares, Leguminosas de grano, Leguminosas verdes (frescas), Maíz dulce, Maíz, Mijo, Nabo, Oleaginosas, Ornamentales herbáceas, Remolacha azucarera, Remolacha forrajera, Sorgo, Vid	NO PROCEDE

**Condiciones Generales de Uso**



Molusquicida de uso profesional en cultivos y plantaciones agrícolas al aire libre (mediante aplicación mecánica o manual) y en invernadero (mediante aplicación manual) de acuerdo con los condicionamientos específicos. El producto se distribuye de mediante aplicación mecánica y manual al aire libre y aplicación manual en invernadero. La dosis total de producto utilizado no debe superar los 28 kg/ha por cultivo (700 g de metaldehído/ha/cultivo). Las aplicaciones tardías de gránulos en plantas desarrolladas pueden traducirse en la aparición inoportuna de gránulos sobre o entre las hojas. Se debe prestar especial atención para evitar que esto se produzca en los cultivos destinados a consumo. En la etiqueta se darán las instrucciones necesarias para la correcta aplicación del producto. Los usos autorizados en invernadero o cultivo protegido para este producto han sido solicitados con anterioridad al 1 de junio de 2022, y por tanto no han sido evaluados de acuerdo con los nuevos criterios de evaluación de sistemas de cultivo, en consonancia con las conclusiones del Southern Member States Steering Committee (SMS SC) y los criterios de EFSA Journal 2014; 12(3): 3615

**Clase de Usuario**



Uso profesional.

### Mitigación de riesgos en la manipulación



#### SEGURIDAD DEL APLICADOR:

El aplicador utilizará guantes de protección química, ropa de protección química tipo 5 (ofrece protección al cuerpo completo contra partículas sólidas suspendidas en el aire) y calzado resistente durante la mezcla carga y aplicación el operario.

#### SEGURIDAD DEL TRABAJADOR:

Durante la reentrada el trabajador utilizará ropa de trabajo adecuada ( Mono o chaqueta de manga larga y pantalón largo hechos de algodón (> 300 g/m2) o de algodón y poliéster (> 200 g/m2) y calzado resistente.)

#### Medidas adicionales de mitigación del riesgo:

- Durante la aplicación con tractor se deberán usar los guantes de protección química únicamente para manipular el equipo de aplicación o superficies contaminadas.
- En la limpieza y mantenimiento del equipo se aplicarán las mismas medidas de protección que en carga y aplicación.

### Clasificaciones y Etiquetado



Clase y categoría de peligro (Humana)	
Pictograma	
Palabra de Advertencia	
Indicaciones de Peligro	
Consejos de Prudencia	P262 -Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa.
Clase y categoría de peligro (Medio Ambiental)	
Pictograma	
Palabra de Advertencia	
Indicaciones de Peligro	
Consejos de Prudencia	

### Mitigación de riesgos ambientales



SPE 6: Para proteger las aves y los mamíferos salvajes, elimine los derrames.

Cualquier actividad que se realice con el presente preparado deberá tener en cuenta las condiciones establecidas en los artículos 31, 32 y 33 del Real Decreto 1311/2012, por el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios.

### Eliminación del producto y/o caldo



SP1: NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE. (No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales/Evítese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos).

### Gestión de Envases



Conforme a lo establecido en el R.D. 1416/2001, de 14 de diciembre, sobre envases de productos fitosanitarios, en la etiqueta deberá figurar la siguiente frase: Entregar los envases vacíos o residuos de envases bien en los puntos de recogida establecidos por los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada (SIG) o directamente en el punto de venta donde se hubiera adquirido si dichos envases se han puesto en el mercado a través de un sistema de depósito, devolución y retorno.

### Otras Indicaciones reglamentarias



Otras leyendas e indicaciones.

EUH401: A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso.

EUH210: Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.