

### Datos del Producto

Número de Registro: 12455 Estado:  Vigente Fechas Inscripción: 09/07/1977 Renovación: 28/10/2016 Caducidad: 31/07/2026

Nombre Comercial: AZUFRE MICRONIZADO P-300/80

#### Titular

**AZUFRERA Y FERTILIZANTES PALLARÈS S.A.**

Av.Europa, 1-7 Polg. Ind. Constantí

43120 Constant

(Tarragona)

ESPAÑA

#### Fabricante

**AZUFRERA Y FERTILIZANTES PALLARÈS S.A.**

Av.Europa, 1-7 Polg. Ind. Constantí

43120 Constant

(Tarragona)

ESPAÑA

### Composición

AZUFRE 80% [DP] P/P

### Envases

Bolsas de aluminio de 1 Kg.  
Sacos de papel (3capas)+PE (1capa) de 5, 10, 20 y 25 kg.  
Big bag de 250, 500 y 600 kg.

### Usos y Dosis Autorizados

USO	AGENTE	Dosis	Nº Aplic.	Intervalos	Condic. Especifico
Aguacate	Ácaros				(Uso menor autorizado por procedimiento nacional) Se puede aplicar en todos los estadios de desarrollo del cultivo. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*)
	Erysiphe spp.	20 Kg/ha	Máx. 3	7-10 días	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional) Se puede aplicar en todos los estadios de desarrollo del cultivo. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*)
Almendro	Ácaros				(Uso menor autorizado por procedimiento nacional) Se puede aplicar en todos los estadios de desarrollo del cultivo. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*)
	Oídio del rosal, Podosphaera pannosa	20 Kg/ha	Máx. 3	7-10 días	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional) Se puede aplicar en todos los estadios de desarrollo del cultivo. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*)
Arbustos y pequeños árboles ornamentales	Ácaros				Se puede aplicar en todos los estadios de desarrollo del cultivo.
	Erysiphe spp.	20 Kg/ha	Máx. 3	7-10 días	Se puede aplicar en todos los estadios de desarrollo del cultivo.
Avellano	Ácaros				(Uso menor autorizado por procedimiento nacional) Se puede aplicar durante todo el ciclo de cultivo, excepto durante el periodo floración (BBCH 60-69) para evitar aplicar durante el pecoreo de las abejas. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*)
	Oídios, Erysiphaceae	20 Kg/ha	Máx. 3	7-10 días	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional) Se puede aplicar durante todo el ciclo de cultivo, excepto durante el periodo floración (BBCH 60-69) para evitar aplicar durante el pecoreo de las abejas. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*)
	Ácaros				

Berenjena	Oídio del tomate, <i>Oidium neolycopersici</i>	20 - 30 Kg/ha	Máx. 3	5-10 días	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional) Se puede aplicar en todos los estadios de desarrollo del cultivo. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*)
	Ácaros				
Calabaza	Oídio de las cucurbitáceas, <i>Podosphaera xanthii</i>	20 - 30 Kg/ha	Máx. 3	5-10 días	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional) Se puede aplicar en todos los estadios de desarrollo del cultivo. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*)
	Ácaros				
Castaño	Oídios, Erysiphaceae	20 Kg/ha	Máx. 3	7-10 días	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional) Se puede aplicar durante todo el ciclo de cultivo, excepto durante el periodo floración (BBCH 60-69) para evitar aplicar durante el pecoreo de las abejas. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*)
	Ácaros				
Melón	Oídio, <i>Podosphaera fuliginea</i>	20 - 30 Kg/ha	Máx. 3	5-10 días	Se puede aplicar en todos los estadios de desarrollo del cultivo.
	Ácaros				
Nogal	Oídios, Erysiphaceae	20 Kg/ha	Máx. 3	7-10 días	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional) Se puede aplicar durante todo el ciclo de cultivo, excepto durante el periodo floración (BBCH 60-69) para evitar aplicar durante el pecoreo de las abejas. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*)
	Ácaros				
Pacano, nuez de pecán	Oídios, Erysiphaceae	20 Kg/ha	Máx. 3	7-10 días	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional) Se puede aplicar durante todo el ciclo de cultivo, excepto durante el periodo floración (BBCH 60-69) para evitar aplicar durante el pecoreo de las abejas. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*)
	Ácaros				
Pepinillo	Oídio de las cucurbitáceas, <i>Podosphaera xanthii</i>	20 - 30 Kg/ha	Máx. 3	5-10 días	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional) Se puede aplicar en todos los estadios de desarrollo del cultivo. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*)
	Ácaros				
Pepino	Oídio de las cucurbitáceas, <i>Podosphaera xanthii</i>	20 - 30 Kg/ha	Máx. 3	5-10 días	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional) Se puede aplicar en todos los estadios de desarrollo del cultivo. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*)
	Ácaros				
Pistachero	Oídios, Erysiphaceae	20 Kg/ha	Máx. 3	7-10 días	(Uso menor autorizado por procedimiento nacional) Se puede aplicar durante todo el ciclo de cultivo, excepto durante el periodo floración (BBCH 60-69) para evitar aplicar durante el pecoreo de las abejas. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*)
	Ácaros				
Sandía	Oídio de las cucurbitáceas, <i>Podosphaera xanthii</i>	20 - 30 Kg/ha	Máx. 3	5-10 días	Se puede aplicar en todos los estadios de desarrollo del cultivo.
	Ácaros				
Tomate	Oídio del tomate, <i>Oidium neolycopersici</i>	20 - 30 Kg/ha	Máx. 3	5-10 días	Se puede aplicar en todos los estadios de desarrollo del cultivo.
	Ácaros				
Vid	Oídio de la vid, <i>Erysiphe necator</i>	20 - 30 Kg/ha	Máx. 5	10 días	Aplicar durante BBCH 15-89 realizando una única aplicación durante BBCH 15-19.

**Plazos de Seguridad (Protección del Consumidor)**



USO	P.S. (días)
Vid	1
Aguacate, Almendro, Arbustos y pequeños árboles ornamentales, Avellano, Berenjena, Calabaza, Castaño, Melón, Nogal, Pacano, nuez de pecán, Pepinillo, Pepino, Pistachero, Sandía, Tomate	NO PROCEDE

### Condiciones Generales de Uso



Tratamiento fungicida/acaricida al aire libre por espolvoreo con tractor.- No efectuar tratamientos a temperaturas demasiado elevadas.- No aplicar aceites minerales durante los 21 días anteriores o posteriores a la aplicación del azufre.- Aplicar especialmente en las zonas en que por las bajas temperaturas resulte conveniente reforzar la acción del azufre.- No aplicar en cultivos cuyos frutos sean destinados a conserva. En la etiqueta se darán las instrucciones necesarias para la correcta aplicación del producto, asimismo se informará de la probabilidad de aparición de resistencias y se propondrán las estrategias de prevención y manejo de resistencias.

### Clase de Usuario



Uso profesional agrario.

### Mitigación de riesgos en la manipulación



#### SEGURIDAD DEL APLICADOR

El aplicador utilizará durante la carga y aplicación: guantes de protección química + ropa de protección tipo 5 + calzado de protección frente a productos químicos + protección ocular + EPR tipo FFP1 o P1.

#### SEGURIDAD DEL TRABAJADOR

El trabajador utilizará durante la reentrada al cultivo: ropa de protección nivel C1 o ropa de trabajo + calzado cerrado.

#### NORMATIVA APLICABLE:


- Guantes de protección contra productos químicos conforme a la norma UNE-EN ISO-374-1:2016/A1:2018. Los guantes pueden ser reutilizables o desechables y deben tener la resistencia mecánica que requiera la actividad a realizar. En caso de rotura, deberán ser reemplazados inmediatamente.
- Ropa de protección tipo 5 para uso contra partículas sólidas según norma UNE EN ISO 13982-1:2005/A1:2011.
- Ropa de protección nivel C1, tanto de protección completa como parcial, frente a productos fitosanitarios según norma UNE –EN –ISO 27065: 2017/A1:2019.
- Calzado de protección frente a productos químicos, al menos botas tobilleras, de caucho u otro material polimérico (clasificación II).
- Ropa de trabajo adecuada: Mono o chaqueta de manga larga y pantalón largo hechos de algodón (> 300 g/m2) o de algodón y poliéster (> 200 g/m2).
- Protección ocular: Gafa de protección de montura integral según norma UNE-EN 166:2002.
- Equipo de protección respiratoria: media máscara conforme UNE-EN 140/AC:2000, con filtro P1 contra partículas conforme a la norma UNE-EN 143:2022 o medias máscaras filtrantes de protección contra partículas tipo FFP1 conforme a la norma UNE-EN 149:2001+ A1:2010.

#### Medidas adicionales de mitigación del riesgo:

- Durante la aplicación con tractor se deberán usar los guantes de protección química únicamente para manipular el equipo de aplicación o superficies contaminadas.
- Si la aplicación se realiza con cabina cerrada, el uso de EPR y de protección ocular no será necesario durante la misma.
- En la limpieza y mantenimiento del equipo se aplicarán las mismas medidas de protección que en la carga.
- Se recomienda el uso de equipo de protección respiratoria (EPR) FFP1 o similar (conforme a la norma UNE-EN 149:2001+A1:2010), y guantes de protección química (conforme a la norma UNE-EN ISO-374-1:2016/A1:2018) durante las tareas de reentrada que puedan implicar movimiento de follaje.

### Clasificaciones y Etiquetado



Clase y categoría de peligro (Humana)	Irritación cutánea. Categoría 2.
Pictograma	 GHS07 (signo de exclamación)
Palabra de Advertencia	Atención
Indicaciones de Peligro	H315 -Provoca irritación cutánea.
Consejos de Prudencia	P302+P352 -EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua y jabón. P261 -Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. P280 -Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
Clase y categoría de peligro (Medio Ambiental)	
Pictograma	
Palabra de Advertencia	
Indicaciones de Peligro	
Consejos de Prudencia	

### Mitigación de riesgos ambientales

Para proteger a los mamíferos rumiantes, no aplicar en suelos cercanos a zonas donde pasten rumiantes.

SPE 3: Para proteger a los organismos acuáticos, respétese sin tratar una banda de seguridad de 5m hasta las masas de agua superficial.

SPE 3: Para proteger a los artrópodos no objetivo, respétese sin tratar una banda de seguridad hasta la zona no cultivada, de:

- 10m en vid, y tomate, berenjena, calabaza, pepino, pepinillo, arbustos y pequeños árboles ornamentales, aguacate, almendro, avellano, nogal, pistachero, castaño, y pacano/ nuez de pecán >50 cm.

- 5m en melón, sandía, tomate, berenjena, calabaza, pepino, pepinillo, arbustos y pequeños árboles ornamentales, aguacate, almendro, avellano, nogal, pistachero, castaño, y pacano/ nuez de pecán <50 cm.

SPE 8: Peligroso para las abejas. /Para proteger las abejas y otros insectos polinizadores, no aplicar durante la floración de los cultivos. /No utilizar donde haya abejas en pecoreo activo. /No aplicar cuando las malas hierbas estén en floración.

Cualquier actividad que se realice con el presente preparado deberá tener en cuenta las condiciones establecidas en los artículos 31, 32 y 33 del Real Decreto 1311/2012, por el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios.



### Eliminación del producto y/o caldo

SP1: NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE. (No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales/Evítese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos).



### Gestión de Envases

Conforme a lo establecido en el Real Decreto 1055/2022, de 27 de diciembre, de envases y residuos de envases, en la etiqueta deberá figurar la siguiente frase: Deposite los residuos de envases en los puntos de recogida establecidos por los sistemas de responsabilidad ampliada del productor.



### Otras Indicaciones reglamentarias

OBSERVACIONES:

En cumplimiento del artículo 45 del Reglamento (CE) nº 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2008 sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas (CLP), los usuarios intermedios o importadores de mezclas clasificadas para la salud humana o por sus peligros físicos, deberán enviar la información pertinente para la formulación de medidas preventivas y curativas, en particular para la respuesta sanitaria en caso de urgencia al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (Organismo designado a tal efecto según la Ley 8/2010 de 31 de marzo).

La Orden JUS/288/2021, de 25 de marzo, regula el procedimiento de comunicación de dicha información al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.

Para incluir el teléfono del Servicio de Información Toxicológica en la etiqueta, instrucciones de primeros auxilios, así como en el apartado 1.4 de la Ficha de Datos de Seguridad es obligatorio haber realizado previamente el alta de la ficha toxicológica según el procedimiento mencionado.

Lo que se informa a los efectos dispuestos en el Real Decreto y los Reglamentos antes citados.

INDICACIONES QUE DEBEN FIGURAR EN ETIQUETA:

EUH401: A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso.

(\* Con respecto a los usos menores en esta propuesta de autorización; berenjena, calabaza, pepino, pepinillo, aguacate, almendro, avellano, nogal, pistachero, castaño, y pacano/ nuez de pecán, tal y como se comenta en el tercer párrafo del artículo 51.5 del reglamento (CE) 1107/2009, "La publicación oficial o, en su caso, la etiqueta incluirá una referencia a la responsabilidad de la persona que utilice el producto fitosanitario en relación con los fallos de eficacia o con la fitotoxicidad del producto para el que se haya concedido el uso menor. La ampliación del uso menor figurará de manera separada en la etiqueta."

