

Datos del Producto									
Número de Registro:		19548		Estado:		☒ Vigente		Fechas	
Inscripción:		24/10/1994		Renovación:		14/11/2016		Caducidad:	
31/07/2027									
Nombre Comercial:									
TOPIK 24 EC									
Titular					Fabricante				
<div>ADAMA Agriculture España S.A.</div> <div>C/ Ramírez de Arellano N.º 29-2ª</div> <div>28043 Madrid</div> <div>(Madrid)</div> <div>ESPAÑA</div>					<div>ADAMA Agricultural Solutions Ltd.</div> <div>Golan Street, Airport City</div> <div>7019900 POB298</div> <div>ISRAEL</div>				
Composición									
<div>CLODINAFOP-PROPARGIL 24% [EC] P/V</div> <div>Este producto contiene en su composición el antídoto cloquintocet-mexil en una proporción del 5,55% p/p.</div>									
Envases									
<div>Botellas de plástico de tamaño inferior a 5 l (cualquier diámetro de boca) y entre 5 y 20 l (diámetro de boca >= 45 mm).</div>									

Usos y Dosis Autorizados			
USO	AGENTE	Dosis	Condic. Especifico
Trigo	Avenas locas, Avena spp.	170 - 200 cc/ha	Aplicar en postemergencia del cultivo, desde el estado de 3 hojas hasta el final del ahijamiento de las malas hierbas, según el grado de infestación, estado de desarrollo de las malas hierbas y las condiciones ambientales. Exclusivamente contra Lolium multiflorum. Aplicar en postemergencia del cultivo, desde el estado de 3 hojas hasta el final del ahijamiento de las malas hierbas, según el grado de infestación, estado de desarrollo de las malas hierbas y las condiciones ambientales.
	Cola de zorro, Alopecurus myosuroides	200 - 250 cc/ha	
	Alpistes, Phalaris spp. (especies anuales)	225 - 300 cc/ha	
	Alpistes, Phalaris spp. (especies plurianuales)		
	Vallico, Lolium rigidum		
	Vallicos, Lolium spp. (especies plurianuales)	300 - 350 cc/ha	
Triticale	Avenas locas, Avena spp.	170 - 200 cc/ha	Aplicar en postemergencia del cultivo, desde el estado de 3 hojas hasta el final del ahijamiento de las malas hierbas, según el grado de infestación, estado de desarrollo de las malas hierbas y las condiciones ambientales. Exclusivamente contra Lolium multiflorum. Aplicar en postemergencia del cultivo, desde el estado de 3 hojas hasta el final del ahijamiento de las malas hierbas, según el grado de infestación, estado de desarrollo de las malas hierbas y las condiciones ambientales.
	Cola de zorro, Alopecurus myosuroides	200 - 250 cc/ha	
	Alpistes, Phalaris spp. (especies anuales)	225 - 300 cc/ha	
	Alpistes, Phalaris spp. (especies plurianuales)		
	Vallico, Lolium rigidum		
	Vallicos, Lolium spp. (especies plurianuales)	300 - 350 cc/ha	

Plazos de Seguridad (Protección del Consumidor)	
USO	P.S. (días)
Trigo, Triticale	NP

Condiciones Generales de Uso

Controla malas hierbas en postemergencia.
Aplicar con tractor en pulverización normal, en mezcla con un mojante no iónico o con aceite a l/ha.
No aplicar sobre cultivos de deficiente desarrollo, ni en cultivos diferentes al trigo o triticale.
Es conveniente asesorarse por los Servicios Técnicos de la Empresa para dosificar correctamente de acuerdo con las malas hierbas a destruir y en el caso de mezclar con herbicidas de hoja ancha.
En la etiqueta se darán las indicaciones necesarias para la correcta utilización del producto.

Clase de Usuario

Uso reservado a agricultores y aplicadores profesionales.

Mitigación de riesgos en la manipulación

El aplicador deberá utilizar guantes de protección durante la mezcla, carga, aplicación y al manipular el equipo de aplicación o superficies contaminadas.
No entrar al cultivo hasta que el producto esté seco.
SPo 2: Lávese toda la ropa de protección después de usarla.

