



|                     |                        |              |   |    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------|------------------------|--------------|---|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Berza , col         | Gramíneas anuales      | 1 - 2,5 l/ha | 1 | -- | 200 - 400 l/ha | (Uso menor por jerarquía).Tratar hasta pre-floración.                                                                                                                                                                                                                                    |
|                     | Gramíneas plurianuales | 2 - 3,8 l/ha |   |    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Brécol              | Gramíneas anuales      | 1 - 2,5 l/ha | 1 | -- | 200 - 400 l/ha | (Uso menor por jerarquía).Tratar hasta pre-floración.                                                                                                                                                                                                                                    |
|                     | Gramíneas plurianuales | 2 - 3,8 l/ha |   |    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Cebolla             | Gramíneas anuales      | 1 - 2,5 l/ha | 1 | -- | 200 - 400 l/ha | Aplicar desde BBCH 11 (estadio de gancho) hasta BBCH 39 (fin del crecimiento longitudinal).                                                                                                                                                                                              |
|                     | Gramíneas plurianuales | 2 - 3,8 l/ha |   |    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Chalote             | Gramíneas anuales      | 1 - 2,5 l/ha | 1 | -- | 200 - 400 l/ha | (Uso menor por jerarquía).Aplicar desde BBCH 11 (estadio de gancho) hasta BBCH 39 (fin del crecimiento longitudinal).                                                                                                                                                                    |
|                     | Gramíneas plurianuales | 2 - 2,5 l/ha |   |    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Cítricos            | Gramíneas anuales      | 1 - 2,5 l/ha | 1 | -- | 200 - 400 l/ha | Aplicar antes del BBCH 70 (formación del fruto).                                                                                                                                                                                                                                         |
|                     | Gramíneas plurianuales | 2 - 3,8 l/ha |   |    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Coliflor            | Gramíneas anuales      | 1 - 2,5 l/ha | 1 | -- | 200 - 400 l/ha | (Uso menor por jerarquía).Tratar hasta pre-floración.                                                                                                                                                                                                                                    |
|                     | Gramíneas plurianuales | 2 - 3,8 l/ha |   |    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Colza               | Gramíneas anuales      | 1 - 3 l/ha   | 1 | -- | 200 - 400 l/ha | (Uso menor por jerarquía).Aplicar desde BBCH 11 (1a hoja, desplegada) hasta BBCH 41 (la vaina de la hoja bandera se alarga).                                                                                                                                                             |
|                     | Gramíneas plurianuales | 2 - 3 l/ha   |   |    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Coníferas           | Gramíneas anuales      | 1 - 2,5 l/ha | 1 | -- | 200 - 400 l/ha | Exclusivamente para uso ornamental.<br>Aplicar en post-emergencia o post-trasplante.                                                                                                                                                                                                     |
|                     | Gramíneas plurianuales | 2 - 3 l/ha   |   |    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Espinaca            | Gramíneas anuales      |              | 1 | -- | 200 - 400 l/ha | (Uso menor por jerarquía).Aplicar desde BBCH 11 (Desarrollo de la 1a hoja o par de hojas verdaderas o verticilo) hasta BBCH 39 (el tallo o la roseta han alcanzado el máximo de la longitud o el grosor final).                                                                          |
|                     | Gramíneas plurianuales | 1 - 2 l/ha   |   |    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Frondosas           | Gramíneas anuales      | 1 - 2,5 l/ha | 1 | -- | 200 - 400 l/ha | Exclusivamente para uso ornamental.<br>Aplicar en post-emergencia o post-trasplante.                                                                                                                                                                                                     |
|                     | Gramíneas plurianuales | 2 - 3 l/ha   |   |    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Frutales de cáscara | Gramíneas anuales      | 1 - 2,5 l/ha | 1 | -- | 200 - 400 l/ha | Realizar la aplicación antes del BBCH 70 (formación del fruto).                                                                                                                                                                                                                          |
|                     | Gramíneas plurianuales | 2 - 3,8 l/ha |   |    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Frutales de hueso   | Gramíneas anuales      | 1 - 2,5 l/ha | 1 | -- | 200 - 400 l/ha | En melocotonero y nectarino el PS es de 30 días. Para el resto (cerezo, ciruelo, endrino, albaricoquero) habrá que realizar la aplicación antes del BBCH 70 (formación del fruto) y el PS no procede.<br>En el caso del endrino únicamente para tratamientos a plantaciones comerciales. |
|                     | Gramíneas plurianuales | 2 - 3,8 l/ha |   |    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Frutales de pepita  | Gramíneas anuales      | 1 - 2,5 l/ha | 1 | -- | 200 - 400 l/ha |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                     | Gramíneas plurianuales | 2 - 3,8 l/ha |   |    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Garbanzo            | Gramíneas anuales      | 1 - 3 l/ha   | 1 | -- | 200 - 400 l/ha | (Uso menor por jerarquía).Aplicar desde BBCH 11 (Desarrollo de la 1a hoja o par de hojas verdaderas o verticilo) hasta BBCH 39 (fin del crecimiento longitudinal).                                                                                                                       |
|                     | Gramíneas plurianuales | 2 - 3 l/ha   |   |    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Girasol             | Gramíneas anuales      | 1 - 1,2 l/ha | 1 | -- | 200 - 400 l/ha | Aplicar desde BBCH 11 (1er par de hojas desplegadas) hasta BBCH 39 (9 o más entrenudos alargados visiblemente).                                                                                                                                                                          |
| Guisante para grano | Gramíneas anuales      | 1 - 3 l/ha   | 1 | -- | 200 - 400 l/ha | (Uso menor por jerarquía).Aplicar desde BBCH 11 (1er par de hojas desplegadas) hasta BBCH 39 (9 o más entrenudos alargados visiblemente).                                                                                                                                                |
|                     | Gramíneas plurianuales | 2 - 3 l/ha   |   |    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Guisante verde      | Gramíneas anuales      | 1 - 2,5 l/ha | 1 | -- | 200 - 400 l/ha | (Uso menor por jerarquía).Aplicar desde BBCH 11 (1er par de hojas desplegadas) hasta recolección.                                                                                                                                                                                        |
|                     | Gramíneas plurianuales | 2 - 3,8 l/ha |   |    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                        |                        |              |   |    |                |                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------|------------------------|--------------|---|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Haba para grano        | Gramíneas anuales      | 1 - 2,5 l/ha | 1 | -- | 200 - 400 l/ha | (Uso menor por jerarquía).Aplicar desde BBCH 11 (Desarrollo de la 1a hoja o par de hojas verdaderas o verticilo) hasta BBCH 39 (fin del crecimiento longitudinal).                                 |
|                        | Gramíneas plurianuales | 2 - 2,5 l/ha |   |    |                |                                                                                                                                                                                                    |
| Haba verde             | Gramíneas anuales      | 1 - 2,5 l/ha | 1 | -- | 200 - 400 l/ha | (Uso menor por jerarquía).Aplicar desde BBCH 11 (Desarrollo de la 1a hoja o par de hojas verdaderas o verticilo) hasta BBCH 39 (fin del crecimiento longitudinal).                                 |
|                        | Gramíneas plurianuales | 2 - 2,5 l/ha |   |    |                |                                                                                                                                                                                                    |
| Judía para grano       | Gramíneas anuales      | 1 - 3 l/ha   | 1 | -- | 200 - 400 l/ha | (Uso menor por jerarquía).Aplicar desde BBCH 11 (Desarrollo de la 1a hoja o par de hojas verdaderas o verticilo) hasta BBCH 39 (fin del crecimiento longitudinal).                                 |
|                        | Gramíneas plurianuales | 2 - 3 l/ha   |   |    |                |                                                                                                                                                                                                    |
| Judía verde            | Gramíneas anuales      | 1 - 2,5 l/ha | 1 | -  | 200 - 400 l/ha | (Uso menor por jerarquía).Aplicar desde BBCH 11 (Desarrollo de la 1a hoja o par de hojas verdaderas o verticilo) hasta BBCH 39 (fin del crecimiento longitudinal).                                 |
|                        | Gramíneas plurianuales | 2 - 2,5 l/ha |   |    |                |                                                                                                                                                                                                    |
| Lenteja                | Gramíneas anuales      | 1 - 3 l/ha   | 1 | -- | 200 - 400 l/ha | (Uso menor por jerarquía).Aplicar desde BBCH 11 (Desarrollo de la 1a hoja o par de hojas verdaderas o verticilo) hasta BBCH 39 (el tallo ha alcanzado el máximo de la longitud o el grosor final). |
|                        | Gramíneas plurianuales | 2 - 3,8 l/ha |   |    |                |                                                                                                                                                                                                    |
| Ornamentales herbáceas | Gramíneas anuales      | 1 - 2,5 l/ha | 1 | -- | 200 - 400 l/ha | Aplicar en post-emergencia.                                                                                                                                                                        |
|                        | Gramíneas plurianuales | 2 - 3,8 l/ha |   |    |                |                                                                                                                                                                                                    |
| Patata                 | Gramíneas anuales      | 1 - 2,5 l/ha | 1 | -- | 200 - 400 l/ha | Aplicar desde BBCH 11 (1a hoja del tallo principal, desplegada (> 4 cm)) hasta BBCH 39 (cobertura del cultivo finalizada: casi 90 % de las plantas se tocan entre las hileras).                    |
|                        | Gramíneas plurianuales | 2 - 3,8 l/ha |   |    |                |                                                                                                                                                                                                    |
| Remolacha azucarera    | Gramíneas anuales      | 1 - 2 l/ha   | 1 | -- | 200 - 400 l/ha | Aplicar desde BBCH 13 (3a hoja verdadera desplegada) hasta BBCH 39 (desarrollo de las partes vegetativas cosechables).                                                                             |
|                        | Gramíneas plurianuales | 2 l/ha       |   |    |                |                                                                                                                                                                                                    |
| Soja                   | Gramíneas anuales      | 1 - 2 l/ha   | 1 | -- | 200 - 400 l/ha | (Uso menor por jerarquía).Aplicar desde BBCH 13 (hoja trifoliar desplegada en el 3er nudo) hasta BBCH 39 (desarrollo de las partes vegetativas cosechables).                                       |
|                        | Gramíneas plurianuales | 2 - 3,8 l/ha |   |    |                |                                                                                                                                                                                                    |
| Tabaco                 | Gramíneas anuales      | 1 - 2,5 l/ha | 1 | -- | 200 - 400 l/ha | (Uso menor por jerarquía).Aplicar hasta BBCH 41 (la vaina de la hoja bandera se alarga).                                                                                                           |
|                        | Gramíneas plurianuales | 2 - 3,8 l/ha |   |    |                |                                                                                                                                                                                                    |
| Tomate                 | Gramíneas anuales      | 1 - 2,5 l/ha | 1 | -- | 200 - 400 l/ha | Aplicar en BBCH <70 (formación de fruto).                                                                                                                                                          |
|                        | Gramíneas plurianuales | 2 - 3,8 l/ha |   |    |                |                                                                                                                                                                                                    |
| Trébol                 | Gramíneas anuales      | 1 - 2,5 l/ha | 1 | -- | 200 - 400 l/ha | (Uso menor por jerarquía).Aplicar hasta el BBCH 40 (Se inicia el desarrollo de las partes vegetativas cosechables de la planta).                                                                   |
|                        | Gramíneas plurianuales | 2 - 3 l/ha   |   |    |                |                                                                                                                                                                                                    |
| Veza                   | Gramíneas anuales      | 1 - 2,5 l/ha | 1 | -- | 200 - 400 l/ha | Aplicar antes del BBCH 40 (inicio del desarrollo de las partes vegetativas cosechables).                                                                                                           |
|                        | Gramíneas plurianuales | 2 - 3,8 l/ha |   |    |                |                                                                                                                                                                                                    |
| Vid                    | Gramíneas anuales      | 1 - 3 l/ha   | 1 | -- | 200 - 400 l/ha | Aplicar hasta BBCH 85 (ablandamiento de las bayas).                                                                                                                                                |
|                        | Gramíneas plurianuales | 2 - 3 l/ha   |   |    |                |                                                                                                                                                                                                    |
| Zanahoria              | Gramíneas anuales      | 1 - 2,5 l/ha | 1 | -- | 200 - 400 l/ha | Aplicar desde BBCH 11 (Desarrollo de la 1a hoja o par de hojas verdaderas o verticilo) hasta BBCH 39 (fin del crecimiento longitudinal).                                                           |
|                        | Gramíneas plurianuales | 2 - 2,5 l/ha |   |    |                |                                                                                                                                                                                                    |



| Clasificaciones y Etiquetado                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Clase y categoría de peligro (Humana)          | Irritación cutánea. Categoría 2.<br>Irritación ocular. Categoría 2.<br>Peligro por aspiración. Categoría 1.<br>Toxicidad específica en determinados órganos (exposición única). Categoría 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Pictograma                                     |  GHS07 (signo de exclamación)<br> GHS08 (peligro para la salud)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Palabra de Advertencia                         | Peligro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Indicaciones de Peligro                        | H315 -Provoca irritación cutánea.<br>H319 -Provoca irritación ocular grave.<br>H336 -Puede provocar somnolencia o vértigo.<br><br>H304 -Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Consejos de Prudencia                          | P302+P352 -EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua y jabón.<br>P305+P351+P338 -EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.<br>P301+P330+P331 -EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.<br>P261 -Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.<br>P280 -Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.<br>P102 -Mantener fuera del alcance de los niños. |
| Clase y categoría de peligro (Medio Ambiental) | Acuático agudo 1<br>Acuático crónico 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Pictograma                                     |  GHS09 (medio ambiente)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Palabra de Advertencia                         | Atención                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Indicaciones de Peligro                        | H410 -Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Consejos de Prudencia                          | P501 -Elimínense el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos.<br>P391 -Recoger el vertido.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

Mitigación de riesgos ambientales

Para proteger las aguas subterráneas:

- Limitar dosis para uso patata a 188 g s.a./ha en tratamiento contra las gramíneas plurianuales.

Para proteger plantas no objetivo:

- Realizar la aplicación dirigida al suelo

Para proteger mamíferos que se alimentan de lombrices:

- Restringir la dosis máxima a 190 g s.a./ha en aquellos usos cuya dosis máxima sea de 200 g s.a./ha.

Se deben indicar en la etiqueta las siguientes frases de mitigación del riesgo:

SPe 3: Para proteger a los organismos acuáticos, respétese sin tratar una banda de seguridad de 5 m hasta las masas de agua superficial.SPe 3: Para proteger las plantas no objetivo, respétese sin tratar una banda de seguridad de 15 metros hasta la zona no cultivada.

Cualquier actividad que se realice con este producto deberá tener en cuenta las condiciones establecidas en los artículos 31, 32 y 33 del Real Decreto 1311/2012, por el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios.

Eliminación del producto y/o caldo

SP1: NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE. (No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales/Evítese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos).

Gestión de Envases

Enjuague enérgicamente tres veces cada envase que utilice, vertiendo el agua de lavado al depósito (del pulverizador).  
Conforme a lo establecido en el Real Decreto 1416/2001, de 14 de diciembre, sobre envases de productos fitosanitarios, en la etiqueta deberá figurar la siguiente frase: Entregar los envases vacíos o residuos de envases bien en los puntos de recogida establecidos por los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada (SIG) o directamente en el punto de venta donde se hubiera adquirido si dichos envases se han puesto en el mercado a través de un sistema de depósito, devolución y retorno.

Otras Indicaciones reglamentarias

Autorizado para parques y jardines según las especificaciones recogidas en el Real Decreto 1311/2012 de 14 de septiembre.  
EUH401: A fin de evitar riesgos para las personas y el medioambiente, siga las instrucciones de uso.  
OBSERVACIONES:  
En la etiqueta se hará constar que "contiene nafta disolvente del petróleo, nº CAS: 64742-94-5". La nafta disolvente del petróleo con nº de CAS 64742-94-5 debe tener un contenido en naftaleno menor de 1%.  
En la etiqueta de este producto se deberá incluir la leyenda "autorizado su uso para jardinería exterior doméstica", en caracteres preferentemente visibles.  
Para los usos en jardinería exterior doméstica y en aquellas zonas destinadas al uso público en general, se deberá cumplir con las especificaciones recogidas en el Real Decreto 1311/2012 por el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios.

