

Datos del Producto											
Número de Registro: 24998		Estado: ☒ Vigente		Fechas		Inscripción: 10/12/2008		Renovación:		Caducidad: 30/11/2026	
Nombre Comercial:		FENOVA SUPER									

Titular	Fabricante
<div>FMC Agricultural Solutions S.A.U.</div> <div>P.º Castellana 257, 5º</div> <div>28046 Madrid</div> <div>(Madrid)</div> <div>ESPAÑA</div>	<div>CHEMINOVA A/S</div> <div>ThyborØnvej 78</div> <div>7673 RNLAND</div> <div>(HarboRe)</div> <div>DINAMARCA</div>

Composición
FENOXAPROP-P-ETIL 6,9% [EW] P/V

Envases
Botellas de plástico de 100 ml (ciámetro de boca 32-42 mm), 250 ml, 500 ml y 1 l (diámetro de boca 32-54,7 mm) y garrafas de plástico de 5,10 y 25 l (diámetro de boca 42-54,7 mm).



Usos y Dosis Autorizados			
USO	AGENTE	Dosis	Condic. Especifico
Cebada	Alpistes, Phalaris spp. (especies anuales)	1 - 1,1 l/ha	
	Alpistes, Phalaris spp. (especies plurianuales)		
	Avenas locas, Avena spp.		
	Cola de zorro, Alopecurus myosuroides		
Centeno	Alpistes, Phalaris spp. (especies anuales)	1 - 1,1 l/ha	
	Alpistes, Phalaris spp. (especies plurianuales)		
	Avenas locas, Avena spp.		
	Cola de zorro, Alopecurus myosuroides		
Trigo	Alpistes, Phalaris spp. (especies anuales)	1 - 1,1 l/ha	
	Alpistes, Phalaris spp. (especies plurianuales)		
	Avenas locas, Avena spp.		
	Cola de zorro, Alopecurus myosuroides		
Triticale	Alpistes, Phalaris spp. (especies anuales)	1 - 1,1 l/ha	
	Alpistes, Phalaris spp. (especies plurianuales)		
	Avenas locas, Avena spp.		
	Cola de zorro, Alopecurus myosuroides		

Plazos de Seguridad (Protección del Consumidor)	
USO	P.S. (días)
Cebada, Centeno, Trigo, Triticale	NP



Condiciones Generales de Uso

Aplicar mediante pulverización a baja presión en una sólo aplicación a la dosis de 1-1,1 l/ha utilizando un volumen de caldo de 200-300 l/ha.
La aplicación se realizará en post-emergencia del cultivo (BBCH 13-29) contra malas hierbas gramíneas en post-emergencia (desde el estado de 2 hojas hasta el inicio del ahijado para Phalaris y hasta final de ahijado para el resto), cuando las hierbas se encuentren en actividad. No aplicar cuando el cultivo se encuentre en estado de desarrollo deficiente ni en situaciones de sequía prolongada.
Evitar que el caldo llegue a otros cultivos.
Lluvias posteriores a las 3 horas desde que se realizó el tratamiento no afectan a su eficacia, tampoco afectan las fuertes oscilaciones de temperatura entre el día y la noche así como las heladas matinales.
Si las heladas se mantienen durante el día y la noche y varios días consecutivos, se detiene la actividad vegetativa y, por tanto, la del producto.

Clase de Usuario

Uso reservado a agricultores y aplicadores profesionales.

