





|                                                                                                                                                  |                                                                                   |           |   |        |   |                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|--------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Frutales de pepita                                                                                                                               | Moteado o roña del peral, Venturia pyrina                                         | 100 ml/m2 | 5 | 8 días | - | Incluye manzano, peral (incluye nashi), membrillero y níspero, níspero del Japón. Aplicar durante BBCH 07-89.                                                              |
| Grosellero                                                                                                                                       | Podosphaera spp.                                                                  | 100 ml/m2 | 5 | 7 días | - | Uso menor por jerarquía de cultivos. Uso exclusivo en grosellero negro y grosellero rojo. Eficaz contra Podosphaera sp. y Sphaerotheca sp. Aplicar durante BBCH 10-87.     |
| Hierbas aromáticas y flores comestibles                                                                                                          | Oídios, Erysiphaceae                                                              | 60 ml/m2  | 6 | 7 días | - | Aplicar durante BBCH 10-89.                                                                                                                                                |
| Hortalizas de hoja                                                                                                                               | Oídio, Golovinomyces cichoracearum                                                | 60 ml/m2  | 6 | 7 días | - | Exclusivamente para producción de semillas. Aplicar durante BBCH 10-89.                                                                                                    |
| Ornamentales herbáceas                                                                                                                           | Oídios, Erysiphaceae                                                              | 60 ml/m2  | 6 | 7 días | - | Incluye tratamientos en ornamentales florales o de flor al aire libre para producción de semillas. Aplicar durante BBCH 10-89 (estadio de flores, follaje joven y maduro). |
| Pepinillo                                                                                                                                        | Oídio, Golovinomyces cichoracearum                                                | 60 ml/m2  | 6 | 7 días | - | Uso menor por jerarquía de cultivos. Aplicar durante BBCH 10-89.                                                                                                           |
|                                                                                                                                                  | Oídio, Podosphaera fuliginea                                                      |           |   |        |   |                                                                                                                                                                            |
| Pepino                                                                                                                                           | Oídio, Podosphaera fuliginea                                                      | 60 ml/m2  | 6 | 7 días | - | Uso menor por jerarquía de cultivos. Aplicar durante BBCH 10-89.                                                                                                           |
|                                                                                                                                                  | Oídio, Golovinomyces cichoracearum                                                |           |   |        |   |                                                                                                                                                                            |
| Pimiento                                                                                                                                         | Erysiphe spp.                                                                     | 60 ml/m2  | 6 | 7 días | - | Aplicar durante BBCH 10-89.                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                  | Oídio, oidiosis, Leveillula taurica                                               |           |   |        |   |                                                                                                                                                                            |
| Rosales                                                                                                                                          | Oídio del rosal, Podosphaera pannosa                                              | 100 ml/m2 | 5 | 7 días | - | Aplicar en BBCH 41-49 (hojas) y BBCH 51-59 (capullos de las flores).                                                                                                       |
| Tomate                                                                                                                                           | Erysiphe spp.                                                                     | 60 ml/m2  | 6 | 7 días | - | Aplicar durante BBCH 10-89.                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                  | Oídio, oidiosis, Leveillula taurica                                               |           |   |        |   |                                                                                                                                                                            |
| Vid de mesa                                                                                                                                      | Oídio de la vid, Erysiphe necator                                                 | 100 ml/m2 | 5 | 7 días | - | Aplicar durante BBCH 15-89.                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                  | Podredumbre gris, Botrytis cinerea                                                |           |   | 8 días |   | Aplicar durante BBCH 61-89.                                                                                                                                                |
| Vid de vinificación                                                                                                                              | Oídio de la vid, Erysiphe necator                                                 | 100 ml/m2 | 5 | 7 días | - | Aplicar durante BBCH 15-89.                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                  | Podredumbre gris, Botrytis cinerea                                                |           |   | 8 días |   | Aplicar durante BBCH 61-89.                                                                                                                                                |
| Ámbito de Aplicación: No Agrario - Tipo de Usuario: No Profesional - Sistema de Cultivo: Invernadero - Método de Aplicación: Otros (ver condic.) |                                                                                   |           |   |        |   |                                                                                                                                                                            |
| Arbustos y pequeños árboles ornamentales                                                                                                         | Oídios, Erysiphaceae                                                              | 100 ml/m2 | 5 | 7 días | - | Aplicar durante BBCH 10-89 (follaje joven).                                                                                                                                |
| Berenjena                                                                                                                                        | Erysiphe spp.                                                                     | 60 ml/m2  | 6 | 7 días | - | Uso menor por jerarquía de cultivos. Aplicar durante BBCH 10-89.                                                                                                           |
|                                                                                                                                                  | Oídio, oidiosis, Leveillula taurica                                               |           |   |        |   |                                                                                                                                                                            |
| Calabacín                                                                                                                                        | Oídio, Golovinomyces cichoracearum                                                | 60 ml/m2  | 6 | 7 días | - | Aplicar durante BBCH 10-89.                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                  | Oídio, Podosphaera fuliginea                                                      |           |   |        |   |                                                                                                                                                                            |
| Fresal                                                                                                                                           | Oídio de la fresa, Podosphaera aphanis<br>Oídio del lúpulo, Podosphaera macularis | 60 ml/m2  | 6 | 8 días | - | Aplicar durante BBCH 10-85.                                                                                                                                                |
| Hierbas aromáticas y flores comestibles                                                                                                          | Oídios, Erysiphaceae                                                              | 60 ml/m2  | 6 | 7 días | - | Aplicar durante BBCH 10-89.                                                                                                                                                |
| Hortalizas de hoja                                                                                                                               | Oídio, Golovinomyces cichoracearum                                                | 60 ml/m2  | 6 | 7 días | - | Exclusivamente para producción de semillas. Aplicar durante BBCH 10-89.                                                                                                    |
| Ornamentales herbáceas                                                                                                                           | Oídios, Erysiphaceae                                                              | 60 ml/m2  | 6 | 7 días | - | Incluye tratamientos en ornamentales florales o de flor al aire libre para producción de semillas. Aplicar durante BBCH 10-89 (estadio de flores, follaje joven y maduro). |
| Pepinillo                                                                                                                                        | Oídio, Golovinomyces cichoracearum<br>Oídio, Podosphaera fuliginea                | 60 ml/m2  | 6 | 7 días | - | Uso menor por jerarquía de cultivos. Aplicar durante BBCH 10-89.                                                                                                           |



Mitigación de riesgos ambientales

SPe 3: Para proteger los organismos acuáticos, respétese sin tratar una banda de seguridad de 5m hasta las masas de agua superficial.

Cualquier actividad que se realice con este producto deberá tener en cuenta las condiciones establecidas en los artículos 31, 32 y 33 del Real Decreto 1311/2012, por el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios.



Eliminación del producto y/o caldo

SP1: NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE. (No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales/Evítese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos).



Gestión de Envases

Conforme a lo establecido en el Real Decreto 1055/2022, de 27 de diciembre, de envases y residuos de envases, en la etiqueta deberá figurar la siguiente frase: Deposite los residuos de envases en los puntos de recogida establecidos por los sistemas de responsabilidad ampliada del productor.



Otras Indicaciones reglamentarias

OBSERVACIONES:

En cumplimiento del artículo 45 del Reglamento (CE) nº 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2008 sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas (CLP), los usuarios intermedios o importadores de mezclas clasificadas para la salud humana o por sus peligros físicos, deberán enviar la información pertinente para la formulación de medidas preventivas y curativas, en particular para la respuesta sanitaria en caso de urgencia al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (Organismo designado a tal efecto según la Ley 8/2010 de 31 de marzo).

La Orden JUS/288/2021, de 25 de marzo, regula el procedimiento de comunicación de dicha información al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.

Para incluir el teléfono del Servicio de Información Toxicológica en la etiqueta, instrucciones de primeros auxilios, así como en el apartado 1.4 de la Ficha de Datos de Seguridad es obligatorio haber realizado previamente el alta de la ficha toxicológica según el procedimiento mencionado.

Lo que se informa a los efectos dispuestos en el Real Decreto y los Reglamentos antes citados.

INDICACIONES QUE DEBEN FIGURAR EN LA ETIQUETA:

Autorizado para uso no profesional.

EUH401: A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso.

