

Datos del Producto											
Número de Registro:		ES-01166	Estado:	☒ Vigente	Fechas	Inscripción:	28/09/2020	Renovación:	14/11/2025	Caducidad:	31/10/2036
Nombre Comercial:		MALLEN									

Titular	Fabricante
<div>CERTIS BELCHIM B.V.</div> <div>Stadsplateau 16</div> <div>3521AZ Utrecht</div> <div>PAÍSES BAJOS</div>	<div>AGRONATURALIS LTD.</div> <div>Suite 2, Crown House, 2 Southampton Road</div> <div>BH24 1HY Ringwood</div> <div>(Hampshire)</div> <div>REINO UNIDO</div>

Composición
HIDROGENOCARBONATO DE POTASIO 85% [SG] P/P

Envases
Sacos de papel de 5 kg (multicapa papel kraft/PE). Sacos de plástico de 5 kg, 10 kg y 20kg (multicapa PET/PE).

Usos y Dosis Autorizados						
USO	AGENTE	Dosis	Nº Aplic.	Intervalos	Vol. Caldo	Condic. Especifico
Ámbito de Aplicación: Agrario - Tipo de Usuario: Profesional - Sistema de Cultivo: Aire libre - Método de Aplicación: Manual con lanza o pistola						
Acedera	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "Otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Adormidera	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Ajedrea	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Albahaca	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Alforfón	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Algarrobas, alverja	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Algodonero	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Almorta	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.

Alpiste	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Altramuz forrajero	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Altramuz	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Angélica	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Borraja	Podredumbre blanca, Sclerotinia sclerotiorum	5 Kg/ha	2	7 días	150 - 400 l/ha	(Uso menor por jerarquía de cultivos). Aplicar durante BBCH 55-69.
Cacahuete	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Camelina	Fusariosis, Fusarium spp.				100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
	Podredumbre blanca, Sclerotinia sclerotiorum	5 Kg/ha	2	7 días	150 - 400 l/ha	(Uso menor por jerarquía de cultivos). Aplicar durante BBCH 55-69.
Caña de azúcar	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Cáñamo	Fusariosis, Fusarium spp.				100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
	Podredumbre blanca, Sclerotinia sclerotiorum	5 Kg/ha	2	7 días	150 - 400 l/ha	(Uso menor por jerarquía de cultivos). Aplicar durante BBCH 55-69.
Cártamo	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Cebollino	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Cilantro	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Colza	Fusariosis, Fusarium spp.				100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
	Podredumbre blanca, Sclerotinia sclerotiorum	5 Kg/ha	2	7 días	150 - 400 l/ha	(Uso menor por jerarquía de cultivos). Aplicar durante BBCH 55-69.
Eneldo	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Esparceta	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Estevia	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Estragón	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Garbanzo verde	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Garbanzo	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Guisante para grano	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Guisante proteaginoso /forrajero	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Guisante verde	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.

Haba forrajera	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Haba para grano	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Haba verde	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Hierba limón	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Hisopo	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Judía forrajera	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Judía para grano	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Judía verde	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Lavandas	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Lenteja verde	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Lenteja	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Levístico	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Lino	Fusariosis, Fusarium spp.				100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
	Podredumbre blanca, Sclerotinia sclerotiorum	5 Kg/ha	2	7 días	150 - 400 l/ha	(Uso menor por jerarquía de cultivos). Aplicar durante BBCH 55-69.
Lotos, cuernecillos	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Maíz dulce	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Mejorana	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Melisa	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Mentas incluida hierbabuena	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Mijo	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Mostaza, mostaza blanca	Fusariosis, Fusarium spp.				100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
	Podredumbre blanca, Sclerotinia sclerotiorum	5 Kg/ha	2	7 días	150 - 400 l/ha	(Uso menor por jerarquía de cultivos). Aplicar durante BBCH 55-69.
Orégano	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Panizo, moha	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.

Perejil	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Perifollo	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Quinoa	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Raíces de achicoria (industrial)	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Remolacha de mesa	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Remolacha forrajera	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Romero	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Ruda	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Salvia	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Sésamo, ajonjolí	Fusariosis, Fusarium spp.				100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
	Podredumbre blanca, Sclerotinia sclerotiorum	5 Kg/ha	2	7 días	150 - 400 l/ha	(Uso menor por jerarquía de cultivos). Aplicar durante BBCH 55-69.
Soja	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Sorgo	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Tabaco	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Teff	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Tomillo	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Trébol	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Trigo	Roya amarilla del trigo, Puccinia striiformis Roya parda del trigo, Puccinia triticina Septoriosis de las espigas del trigo, Parastagonospora nodorum					
	Septoriosis del trigo, Zymoseptoria tritici	2,5 - 5 Kg/ha			150 - 400 l/ha	Incluye espelta. En cereales, máximo 4 aplicaciones por año y ciclo de cultivo. Aplicar durante BBCH 29-69.
	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	(Trigo de invierno y primavera y trigo duro). Aplicar durante BBCH 61-77.
Triticale	Roya, Puccinia spp.					
	Septoriosis, Septoria spp.	2,5 - 5 Kg/ha			150 - 400 l/ha	En cereales, máximo 4 aplicaciones por año y ciclo de cultivo. Aplicar durante BBCH 29-69.
	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Aplicar durante BBCH 61-77.
	Roya, Puccinia spp.					

	Septoriosis, Septoria spp.	2,5 - 5 Kg/ha			150 - 400 l/ha	(Uso menor por Jerarquía de cultivos) En cereales, máximo 4 aplicaciones por año y ciclo de cultivo. Aplicar durante BBCH 29-69.
Tritordeum	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Yeros	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Zulla	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Ámbito de Aplicación: Agrario - Tipo de Usuario: Profesional - Sistema de Cultivo: Aire libre - Método de Aplicación: Manual con mochila						
Acedera	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "Otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Adormidera	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Ajedrea	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Albahaca	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Alforfón	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Algarrobas, alverja	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Algodonero	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Almorta	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Alpiste	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Altramuz forrajero	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Altramuz	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Angélica	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Borraja	Podredumbre blanca, Sclerotinia sclerotiorum	5 Kg/ha	2	7 días	150 - 400 l/ha	(Uso menor por jerarquía de cultivos). Aplicar durante BBCH 55-69.
Cacahuete	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Camelina	Fusariosis, Fusarium spp.				100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
	Podredumbre blanca, Sclerotinia sclerotiorum	5 Kg/ha	2	7 días	150 - 400 l/ha	(Uso menor por jerarquía de cultivos). Aplicar durante BBCH 55-69.
Caña de azúcar	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Cáñamo	Fusariosis, Fusarium spp.				100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
	Podredumbre blanca, Sclerotinia sclerotiorum	5 Kg/ha	2	7 días	150 - 400 l/ha	(Uso menor por jerarquía de cultivos). Aplicar durante BBCH 55-69.
Cártamo	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE AGRICULTURA,
PESCA Y ALIMENTACIÓN

ES-01166

MALLEN

SECRETARIA GENERAL DE RECURSOS
AGRARIOS Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD DE
LA PRODUCCIÓN AGROALIMENTARIA Y BIENESTAR
ANIMAL

Cebollino	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Cilantro	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Colza	Fusariosis, Fusarium spp.				100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
	Podredumbre blanca, Sclerotinia sclerotiorum	5 Kg/ha	2	7 días	150 - 400 l/ha	(Uso menor por jerarquía de cultivos). Aplicar durante BBCH 55-69.
Eneldo	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Esparceta	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Estevia	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Estragón	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Garbanzo verde	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Garbanzo	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Guisante para grano	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Guisante proteaginoso /forrajero	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Guisante verde	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Haba forrajera	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Haba para grano	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Haba verde	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Hierba limón	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Hisopo	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Judía forrajera	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Judía para grano	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Judía verde	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Lavandas	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Lenteja verde	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Lenteja	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.

 <div>GOBIERNO DE ESPAÑA</div>		 <div>MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN</div>		ES-01166		MALLÉN		<div>SECRETARIA GENERAL DE RECURSOS AGRARIOS Y SEGURIDAD ALIMENTARIA</div> <div>DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD DE LA PRODUCCIÓN AGROALIMENTARIA Y BIENESTAR ANIMAL</div>	
Levístico	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.			
Lino	Fusariosis, Fusarium spp.				100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.			
	Podredumbre blanca, Sclerotinia sclerotiorum	5 Kg/ha	2	7 días	150 - 400 l/ha	(Uso menor por jerarquía de cultivos). Aplicar durante BBCH 55-69.			
Lotos, cuernecillos	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.			
Maíz dulce	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.			
Mejorana	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.			
Melisa	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.			
Mentas incluida hierbabuena	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.			
Mijo	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.			
Mostaza, mostaza blanca	Fusariosis, Fusarium spp.				100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.			
	Podredumbre blanca, Sclerotinia sclerotiorum	5 Kg/ha	2	7 días	150 - 400 l/ha	(Uso menor por jerarquía de cultivos). Aplicar durante BBCH 55-69.			
Orégano	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.			
Panizo, moha	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.			
Perejil	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.			
Perifollo	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.			
Quinoa	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.			
Raíces de achicoria (industrial)	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.			
Remolacha de mesa	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.			
Remolacha forrajera	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.			
Romero	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.			
Ruda	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.			
Salvia	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.			
Sésamo, ajonjolí	Fusariosis, Fusarium spp.				100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.			
	Podredumbre blanca, Sclerotinia sclerotiorum	5 Kg/ha	2	7 días	150 - 400 l/ha	(Uso menor por jerarquía de cultivos). Aplicar durante BBCH 55-69.			

Soja	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Sorgo	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Tabaco	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Teff	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Tomillo	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Trébol	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Trigo	Roya amarilla del trigo, Puccinia striiformis Roya parda del trigo, Puccinia triticina Septoriosis de las espigas del trigo, Parastagonospora nodorum					
	Septoriosis del trigo, Zymoseptoria tritici	2,5 - 5 Kg/ha			150 - 400 l/ha	Incluye espelta. En cereales, máximo 4 aplicaciones por año y ciclo de cultivo. Aplicar durante BBCH 29-69.
Trigo	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	(Trigo de invierno y primavera y trigo duro). Aplicar durante BBCH 61-77.
	Roya, Puccinia spp.					
Triticale	Septoriosis, Septoria spp.	2,5 - 5 Kg/ha			150 - 400 l/ha	En cereales, máximo 4 aplicaciones por año y ciclo de cultivo. Aplicar durante BBCH 29-69.
	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Aplicar durante BBCH 61-77.
Tritordeum	Roya, Puccinia spp.					
	Septoriosis, Septoria spp.	2,5 - 5 Kg/ha			150 - 400 l/ha	(Uso menor por Jerarquía de cultivos) En cereales, máximo 4 aplicaciones por año y ciclo de cultivo. Aplicar durante BBCH 29-69.
Tritordeum	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Yeros	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Zulla	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Ámbito de Aplicación: Agrario - Tipo de Usuario: Profesional - Sistema de Cultivo: Aire libre - Método de Aplicación: Pulverización normal con tractor						
Acedera	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "Otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Adormidera	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Ajedrea	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Albahaca	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Alforfón	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Algarrobas, alverja	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.



GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

ES-01166

MALLÉN

SECRETARIA GENERAL DE RECURSOS AGRARIOS Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD DE LA PRODUCCIÓN AGROALIMENTARIA Y BIENESTAR ANIMAL

Algodonero	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Almorta	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Alpiste	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Altramuz forrajero	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Altramuz	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Angélica	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Borraja	Podredumbre blanca, Sclerotinia sclerotiorum	5 Kg/ha	2	7 días	150 - 400 l/ha	(Uso menor por jerarquía de cultivos). Aplicar durante BBCH 55-69.
Cacahuete	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Camelina	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
	Podredumbre blanca, Sclerotinia sclerotiorum				150 - 400 l/ha	(Uso menor por jerarquía de cultivos). Aplicar durante BBCH 55-69.
Caña de azúcar	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Cáñamo	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
	Podredumbre blanca, Sclerotinia sclerotiorum				150 - 400 l/ha	(Uso menor por jerarquía de cultivos). Aplicar durante BBCH 55-69.
Cártamo	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Cebollino	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Cilantro	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Colza	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
	Podredumbre blanca, Sclerotinia sclerotiorum				150 - 400 l/ha	(Uso menor por jerarquía de cultivos). Aplicar durante BBCH 55-69.
Eneldo	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Esparceta	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Estevia	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Estragón	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Garbanzo verde	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Garbanzo	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Guisante para grano	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.

Guisante proteaginoso /forrajero	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Guisante verde	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Haba forrajera	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Haba para grano	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Haba verde	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Hierba limón	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Hisopo	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Judía forrajera	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Judía para grano	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Judía verde	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Lavandas	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Lenteja verde	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Lenteja	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Levístico	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Lino	Fusariosis, Fusarium spp.				100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
	Podredumbre blanca, Sclerotinia sclerotiorum	5 Kg/ha	2	7 días	150 - 400 l/ha	(Uso menor por jerarquía de cultivos). Aplicar durante BBCH 55-69.
Lotos, cuernecillos	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Maíz dulce	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Mejorana	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Melisa	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Mentas incluida hierbabuena	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Mijo	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Mostaza, mostaza blanca	Fusariosis, Fusarium spp.				100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
	Podredumbre blanca, Sclerotinia sclerotiorum	5 Kg/ha	2	7 días	150 - 400 l/ha	(Uso menor por jerarquía de cultivos). Aplicar durante BBCH 55-69.

Orégano	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Panizo, moha	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Perejil	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Perifollo	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Quinoa	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Raíces de achicoria (industrial)	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Remolacha de mesa	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Remolacha forrajera	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Romero	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Ruda	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Salvia	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Sésamo, ajonjolí	Fusariosis, Fusarium spp.				100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
	Podredumbre blanca, Sclerotinia sclerotiorum	5 Kg/ha	2	7 días	150 - 400 l/ha	(Uso menor por jerarquía de cultivos). Aplicar durante BBCH 55-69.
Soja	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Sorgo	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Tabaco	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Teff	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Tomillo	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Trébol	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	Uso menor por artículo 51. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Aplicar durante BBCH 61-77.
Trigo	Roya amarilla del trigo, Puccinia striiformis Roya parda del trigo, Puccinia triticina Septoriosis de las espigas del trigo, Parastagonospora nodorum					
	Septoriosis del trigo, Zymoseptoria tritici	2,5 - 5 Kg/ha			150 - 400 l/ha	Incluye espelta. En cereales, máximo 4 aplicaciones por año y ciclo de cultivo. Aplicar durante BBCH 29-69.
	Fusariosis, Fusarium spp.	5 Kg/ha	2	7 días	100 - 400 l/ha	(Trigo de invierno y primavera y trigo duro). Aplicar durante BBCH 61-77.
	Roya, Puccinia spp.					

Gestión de Envases

Conforme a lo establecido en el Real Decreto 1055/2022, de 27 de diciembre, de envases y residuos de envases, en la etiqueta deberá figurar la siguiente frase: Deposite los residuos de envases en los puntos de recogida establecidos por los sistemas de responsabilidad ampliada del productor.



Otras Indicaciones reglamentarias

OBSERVACIONES (esta información no tiene que figurar en la etiqueta)



El producto MALLEN cumple con el artículo 47 del Reglamento (CE) nº 1107/2009 y, por tanto, se puede autorizar como un producto fitosanitario de bajo riesgo, al menos desde el punto de vista de la salud humana.

En cumplimiento del artículo 45 del Reglamento (CE) nº 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2008 sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas (CLP), los usuarios intermedios o importadores de mezclas clasificadas para la salud humana o por sus peligros físicos, deberán enviar la información pertinente para la formulación de medidas preventivas y curativas, en particular para la respuesta sanitaria en caso de urgencia al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (Organismo designado a tal efecto según la Ley 8/2010 de 31 de marzo).

La Orden JUS/288/2021, de 25 de marzo, regula el procedimiento de comunicación de dicha información al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.

Para incluir el teléfono del Servicio de Información Toxicológica en la etiqueta, instrucciones de primeros auxilios, así como en el apartado 1.4 de la Ficha de Datos de Seguridad es obligatorio haber realizado previamente el alta de la ficha toxicológica según el procedimiento mencionado.

Lo que se informa a los efectos dispuestos en el Real Decreto y los Reglamentos antes citados.

(*) Con respecto a los usos menores en esta propuesta de autorización; acedera, adormidera, ajedrea, albahaca, alforfón, algarrobas, alverja, algodónero, almorta, alpiste, altramuz, altramuz forrajero, angélica, cacahuete, camelina, caña de azúcar, cáñamo, cártamo, cebollino, cilantro, colza, eneldo, esparceta, estevia, estragón, garbanzo, garbanzo verde, guisante para grano, guisante proteaginoso /forrajero, guisante verde, haba forrajera, haba para grano, haba verde, hierba limón, hisopo, judía forrajera, judía para grano, judía verde, lavandas, lenteja, lenteja verde, levístico, lino, lotos, cuernecillos, maíz dulce, mejorana, melisa, mentas incluida hierbabuena, mijo, mostaza, mostaza blanca, orégano, panizo, moha, perejil, perifollo, quinoa, raíces de achicoria (industrial), remolacha de mesa, remolacha forrajera, romero, ruda, salvia, sésamo, ajonjolí, soja, sorgo, tabaco, teff, tomillo, trébol, tritordeum, yeros, zulla, tal y como se comenta en el tercer párrafo del artículo 51.5 del reglamento (CE) 1107/2009, “La publicación oficial o, en su caso, la etiqueta incluirá una referencia a la responsabilidad de la persona que utilice el producto fitosanitario en relación con los fallos de eficacia o con la fitotoxicidad del producto para el que se haya concedido el uso menor. La ampliación del uso menor figurará de manera separada en la etiqueta.”

INDICACIONES QUE DEBEN FIGURAR EN LA ETIQUETA:

EUH210: Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.EUH401: A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso.