

Berenjena	Trips	20 - 25 cc/hl	3	7 días	800 - 1000 l/ha	(Uso menor por Jerarquía de cultivos) Dosis máxima: 0,25 l/ha. Se puede utilizar en cultivo protegido.
Berro de agua	Lepidópteros					
	Trips	20 - 25 cc/hl	3	7 días	1000 l/ha	(Uso menor por Jerarquía de cultivos) Dosis máxima: 0,25 l/ha.
Berro, mastuerzo	Lepidópteros					
	Trips	20 - 25 cc/hl	1	--	1000 - 1250 l/ha	(Uso menor por Jerarquía de cultivos) Dosis máxima: 0,25 l/ha.
Calabacín	Lepidópteros					
	Trips	20 - 25 cc/hl	3	7 días	800 - 1000 l/ha	Dosis máxima: 0,25 l/ha. Se puede utilizar en cultivo protegido.
Calabaza	Lepidópteros		2			(Uso menor por Jerarquía de cultivos) Dosis máxima: 0,2 l/ha. Se puede utilizar en cultivo protegido.
						Aplicar durante BBCH 14-89 (antes o después de plena floración).
	Trips	20 - 25 cc/hl	3	7 días	800 - 1000 l/ha	(Uso menor por Jerarquía de cultivos) Dosis máxima: 0,25 l/ha. Se puede utilizar en cultivo protegido.
Cebolla	Trips	0,2 l/ha	2	8 días	500 - 1000 l/ha	
Cebolleta	Coleópteros					
	Lepidópteros	20 - 25 cc/hl	2	8 días	500 - 1000 l/ha	Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver condicionamiento general (*). Dosis máxima: 0,2 l/ha.
Cebollino	Coleópteros					
	Lepidópteros	20 - 25 cc/hl	2	8 días	500 - 1000 l/ha	Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver condicionamiento general (*). Dosis máxima: 0,2 l/ha.
Chalote	Coleópteros					
	Lepidópteros	20 - 25 cc/hl	2	8 días	500 - 1000 l/ha	Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver condicionamiento general (*). Dosis máxima: 0,2 l/ha.
Espinaca	Lepidópteros					
	Trips	20 cc/hl	1	--	1000 - 1000 l/ha	(Uso menor por Jerarquía de cultivos) Dosis máxima: 0,2 l/ha.
Fresal	Lepidópteros					
	Mosca del vinagre de alas manchadas, Drosophila suzukii					
	Trips	20 - 25 cc/hl	3	7 días	800 - 1000 l/ha	Dosis máxima: 0,25 l/ha. Se puede utilizar en cultivo protegido.
Guisante verde	Lepidópteros					
	Trips	20 - 25 cc/hl	1	--	1000 - 1250 l/ha	(Uso menor por Jerarquía de cultivos) Guisantes con y sin vaina Dosis máxima: 0,25 l/ha.
Haba verde	Lepidópteros					
	Trips	20 - 25 cc/hl	3	7 días	1000 - 1250 l/ha	(Uso menor por Jerarquía de cultivos) Dosis máxima: 0,25 l/ha. Se puede utilizar en cultivo protegido.
Hierbas aromáticas y flores comestibles	Lepidópteros					
	Trips	20 - 25 cc/hl	1	--	1000 - 1250 l/ha	Indicado para salvia real, romero, tomillo, albahaca y estragón (Usos menores por Jerarquía de cultivos). Dosis máxima: 0,25 l/ha.
Hortícolas	Coleópteros	0,2 l/ha	1		500 - 1000 l/ha	Indicado en plantas para producción de semillas. Aplicar en pre-floración.
Judía forrajera	Lepidópteros	20 - 25 cc/hl	2	7 días	800 - 1000 l/ha	(Uso menor por Jerarquía de cultivos). Dosis máxima: 0,2 l/ha. Aplicar durante BBCH 15-79 (antes o después de plena floración).

Judía para grano	Lepidópteros	20 - 25 cc/hl	2	7 días	800 - 1000 l/ha	(Uso menor por Jerarquía de cultivos). Dosis máxima: 0,2 l/ha. Aplicar durante BBCH 15-79 (antes o después de plena floración).
Judía verde	Lepidópteros					
	Trips	20 - 25 cc/hl	3	7 días	1000 - 1250 l/ha	(Uso menor por Jerarquía de cultivos). Dosis máxima: 0,25 l/ha. Se puede utilizar en cultivo protegido.
Laurel	Lepidópteros					
	Trips	20 - 25 cc/hl	1	--	1000 - 1250 l/ha	Exclusivamente en cultivos para obtención de hojas de laurel para consumo alimentario. Dosis máxima: 0,25 l/ha.
Lechuga	Lepidópteros					
	Trips	20 - 25 cc/hl	3	7 días	1000 l/ha	Dosis máxima: 0,25 l/ha.
Leguminosas de grano	Apion del guisante, Holotrichapion pisi Curculiónidos, Curculionidae	0,2 l/ha	1	--	500 - 1000 l/ha	Indicado en plantas para producción de semillas. Aplicar en pre-floración.
Leguminosas forrajeras	Apion del guisante, Holotrichapion pisi Curculiónidos, Curculionidae	0,2 l/ha	1	--	500 - 1000 l/ha	Indicado en plantas para producción de semillas. Aplicar en pre-floración.
Maíz dulce	Lepidópteros					
	Piral del maíz, O.nubilalis Taladros del maíz, Sesamia spp.	100 - 150 cc/ha	2	14 días	800 - 1000 l/ha	(Uso menor por Jerarquía de cultivos)
Maíz	Lepidópteros	0,2 l/ha	2	10 días	800 - 1000 l/ha	Aplicar hasta BBCH 59, evitando la floración.
Melón	Lepidópteros		2			Dosis máxima: 0,2 l/ha. Se puede utilizar en cultivo protegido.
	Trips	20 - 25 cc/hl	3	7 días	800 - 1000 l/ha	Aplicar durante BBCH 14-89 (antes o después de plena floración). Dosis máxima: 0,25 l/ha. Se puede utilizar en cultivo protegido.
Mostaza china	Lepidópteros					
	Trips	20 - 25 cc/hl	1	--	1000 - 1250 l/ha	(Uso menor por Jerarquía de cultivos) Dosis máxima: 0,25 l/ha.
Ornamentales herbáceas	Coleópteros	0,2 l/ha			500 - 1000 l/ha	Exclusivamente para cultivos para producción de semillas. Aplicar en pre-floración.
	Lepidópteros					
	Trips	20 - 25 cc/hl	1	--	1000 - 1250 l/ha	Exclusivamente para cultivos para obtención de flores comestibles. Dosis máxima: 0,25 l/ha.
Patata	Escarabajo de la patata, Leptinotarsa decemlineata	50 - 75 cc/ha	3	7 días	800 - 1000 l/ha	
Pepino	Trips	20 - 25 cc/hl	3	7 días	800 - 1000 l/ha	(Uso menor por Jerarquía de cultivos) Dosis máxima: 0,25 l/ha. Se puede utilizar en cultivo protegido.
Perejil	Lepidópteros					
	Trips	20 - 25 cc/hl	1	--	1000 - 1250 l/ha	(Uso menor por Jerarquía de cultivos) Dosis máxima: 0,25 l/ha.
Perifollo	Lepidópteros					
	Trips	20 - 25 cc/hl	1	--	1000 - 1250 l/ha	(Uso menor por Jerarquía de cultivos) Dosis máxima: 0,25 l/ha.
Pimiento	Lepidópteros					
	Trips	20 - 25 cc/hl	3	7 días	800 - 1000 l/ha	Dosis máxima: 0,25 l/ha. Se puede utilizar en cultivo protegido.
Puerro	Trips	0,2 l/ha	2	9 días	500 - 1000 l/ha	(Uso menor por Jerarquía de cultivos)
Remolacha azucarera	Lixus, Lixus spp.	0,2 l/ha	1	--	500 - 1000 l/ha	Indicado en plantas para producción de semillas. Aplicar en pre-floración.

Remolacha de mesa	Lixus, Lixus spp.	0,2 l/ha	1	--	500 - 1000 l/ha	(Uso menor por Jerarquía de cultivos) Indicado en plantas para producción de semillas. Aplicar en pre-floración.
Remolacha forrajera	Lixus, Lixus spp.	0,2 l/ha	1	--	500 - 1000 l/ha	(Uso menor por Jerarquía de cultivos) Indicado en plantas para producción de semillas. Aplicar en pre-floración.
Rúcula	Lepidópteros					
	Trips	20 - 25 cc/hl	1	--	1000 - 1250 l/ha	(Uso menor por Jerarquía de cultivos) Dosis máxima: 0,25 l/ha.
Sandía	Lepidópteros	20 - 25 cc/hl	3	7 días	800 - 1000 l/ha	Dosis máxima: 0,25 l/ha. Se puede utilizar en cultivo protegido. Comenzar los tratamientos antes de la floración si se detecta vuelo de adultos.
Tomate	Lepidópteros					
	Trips, Frankliniella occidentalis	20 - 25 cc/hl	3	7 días	800 - 1000 l/ha	Dosis máxima: 0,25 l/ha. Se puede utilizar en cultivo protegido.
Verdolaga	Lepidópteros					
	Trips	20 - 25 cc/hl	1	--	1000 - 1250 l/ha	(Uso menor por Jerarquía de cultivos) Dosis máxima: 0,25 l/ha.
Ámbito de Aplicación: Agrario - Tipo de Usuario: Profesional - Sistema de Cultivo: Invernadero						
Berenjena	Trips	20 - 25 cc/hl	3	7 días	800 - 1000 l/ha	(Uso menor por Jerarquía de cultivos) Dosis máxima: 0,25 l/ha.
Calabacín	Lepidópteros					
	Trips	20 - 25 cc/hl	3	7 días	800 - 1000 l/ha	Dosis máxima: 0,25 l/ha.
Calabaza	Lepidópteros		2			(Uso menor por Jerarquía de cultivos) Dosis máxima: 0,2 l/ha.
						Aplicar durante BBCH 14-89 (antes o después de plena floración).
	Trips	20 - 25 cc/hl	3	7 días	800 - 1000 l/ha	(Uso menor por Jerarquía de cultivos) Dosis máxima: 0,25 l/ha.
Fresal	Lepidópteros					
	Mosca del vinagre de alas manchadas, Drosophila suzukii					
Fresal	Trips	20 - 25 cc/hl	3	7 días	800 - 1000 l/ha	Dosis máxima: 0,25 l/ha.
	Haba verde	Lepidópteros				
Trips		20 - 25 cc/hl	3	7 días	1000 - 1250 l/ha	(Uso menor por Jerarquía de cultivos) Dosis máxima: 0,25 l/ha.
Judía verde	Lepidópteros					
	Trips	20 - 25 cc/hl	3	7 días	1000 - 1250 l/ha	(Uso menor por Jerarquía de cultivos). Dosis máxima: 0,25 l/ha.
Maíz	Lepidópteros	0,2 l/ha	2	10 días	800 - 1000 l/ha	Indicado en plantas para producción de semillas de maíz. Aplicar hasta BBCH 59, evitando la floración.
Melón	Lepidópteros		2			Dosis máxima: 0,2 l/ha.
	Trips	20 - 25 cc/hl	3	7 días	800 - 1000 l/ha	Aplicar durante BBCH 14-89 (antes o después de plena floración). Dosis máxima: 0,25 l/ha.
Pepino	Trips	20 - 25 cc/hl	3	7 días	800 - 1000 l/ha	(Uso menor por Jerarquía de cultivos) Dosis máxima: 0,25 l/ha.
Pimiento	Lepidópteros					
	Trips	20 - 25 cc/hl	3	7 días	800 - 1000 l/ha	Dosis máxima: 0,25 l/ha.
Sandía	Lepidópteros	20 - 25 cc/hl	3	7 días	800 - 1000 l/ha	Dosis máxima: 0,25 l/ha. Comenzar los tratamientos antes de la floración si se detecta vuelo de adultos.
Tomate	Lepidópteros					
	Trips, Frankliniella occidentalis	20 - 25 cc/hl	3	7 días	800 - 1000 l/ha	Dosis máxima: 0,25 l/ha.

Mitigación de riesgos en la manipulación

SEGURIDAD DEL APLICADOR

El aplicador utilizará durante la mezcla/carga:

- Guantes de protección química.
- Ropa de protección nivel C1 o en su defecto tipo 6.
- Ropa de protección parcial de nivel C3, o en su defecto ropa de protección parcial tipo delantal PB3 o PB4.
- Pantalla facial.
- Calzado de uso profesional de material polimérico.

Durante la aplicación:

- Guantes de protección química.
- Ropa de protección nivel C1 o en su defecto tipo 6.
- Calzado de uso profesional de material polimérico.

Excepción: Aplicación manual (lanza/pistola o mochila) en laurel e invernadero

El aplicador utilizará durante la mezcla/carga:

- Guantes de protección química.
- Ropa de protección nivel C1 o en su defecto tipo 3.
- Pantalla facial.
- EPR tipo FFP1 o P1.
- Calzado de uso profesional de material polimérico.

Durante la aplicación:

- Guantes de protección química.
- Ropa de protección nivel C1 o en su defecto tipo 3.
- Calzado de uso profesional de material polimérico.

SEGURIDAD DEL TRABAJADOR

El trabajador utilizará durante la reentrada al cultivo:

- Guantes de protección química (salvo en la reentrada de leguminosas forrajeras y de grano, judías forrajeras y de grano, mostaza china, maíz, maíz dulce y algodón).
- Ropa de protección nivel C1 o ropa de trabajo.
- Calzado cerrado.

NORMATIVA APLICABLE

- Guantes de protección contra productos químicos conforme a la norma UNE-EN ISO 374-1:2016 y su modificación UNE-EN 374-1:2016/A1:2018. Los guantes deben ser reutilizables al manipular el producto concentrado. Para el contacto con el producto diluido o residuo seco, pueden ser reutilizables o desechables. Deben tener la resistencia mecánica suficiente para evitar la rotura. Si se dañan, deben reemplazarse de inmediato.
- Ropa de protección química tipo 6: frente a salpicaduras de productos líquidos, conforme a norma UNE-EN 13034: 2005 + A1: 2009.
- Ropa de protección nivel C1, C3, tanto de protección completa como parcial, frente a productos fitosanitarios según norma UNE –EN ISO 27065:2017 y su modificación UNE EN ISO 27065: 2017/A1:2019.
- Ropa de protección química tipo 3: protege frente a la penetración de líquidos, de acuerdo a la UNE-EN 14605:2005+A1:2009.
- Calzado de uso profesional, al menos botas tobilleras, de caucho u otro material polimérico (clasificación II).
- Ropa de trabajo adecuada: Mono o chaqueta de manga larga y pantalón largo hechos de algodón (≥ 300 g/m2) o de algodón y al menos un 65% de poliéster (≥ 245 g/m2).
- Pantalla facial, capucha según norma UNE-EN 166:2002.
- Equipo de protección respiratoria: Máscara completa conforme a la norma UNE-EN 136:1998, media máscara conforme UNE EN 140:1999/ AC:2000, con filtro P1 contra partículas conforme a la norma UNE-EN 143:2022 o medias máscaras filtrantes de protección contra partículas FFP1 conforme a la norma EN 149:2001+ A1:2010.

Medidas adicionales de mitigación del riesgo:

- Durante la aplicación con tractor se deberán usar los guantes de protección química únicamente para manipular el equipo de aplicación o superficies contaminadas.
- En la limpieza y mantenimiento del equipo se aplicarán las mismas medidas de protección que en mezcla/carga.
- Evitar el contacto con el follaje húmedo durante la aplicación.
- No entrar en los cultivos tratados hasta que se haya secado la pulverización, y en todo caso, en fresal y ornamentales (ornamentales herbáceas, laurel), al menos durante las primeras 24 horas tras la aplicación.
- Todas las tareas deben ser mecanizadas en los cultivos maíz, maíz dulce y algodón.
- Los guantes de protección química, en el caso del trabajador, serán necesarios en los cultivos indicados cuando se vayan a realizar tareas distintas a las de inspección y riego, y deberán emplearse durante todo el manejo del cultivo tratado.
- Cuando se realice la aplicación mediante lanza no se deberá tratar una extensión superior a 1 ha.

SPo 5: Ventilar las zonas/los invernaderos tratados (bien/durante un tiempo especificado/hasta que se haya secado la pulverización) antes de volver a entrar.



Otras Indicaciones reglamentarias

OBSERVACIONES (esta información no tiene que figurar en la etiqueta)

En cumplimiento del artículo 45 del Reglamento (CE) nº 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2008 sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas (CLP), los usuarios intermedios o importadores de mezclas clasificadas para la salud humana o por sus peligros físicos, deberán enviar la información pertinente para la formulación de medidas preventivas y curativas, en particular para la respuesta sanitaria en caso de urgencia al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (Organismo designado a tal efecto según la Ley 8/2010 de 31 de marzo).

La Orden JUS/288/2021, de 25 de marzo, regula el procedimiento de comunicación de dicha información al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.

Para incluir el teléfono del Servicio de Información Toxicológica en la etiqueta, instrucciones de primeros auxilios, así como en el apartado 1.4 de la Ficha de Datos de Seguridad es obligatorio haber realizado previamente el alta de la ficha toxicológica según el procedimiento mencionado.

Lo que se informa a los efectos dispuestos en el Real Decreto y los Reglamentos antes citados.

INDICACIONES QUE DEBEN FIGURAR EN LA ETIQUETA

Otros componentes además del ingrediente activo técnico:

1,2-Benzisotiazol-3-(2H)-ona (CAS 2634-33-5).

Otras leyendas e indicaciones:

El preparado no se usará en combinación con otros productos.
EUH401: A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso.