

Simiente de colza	Pulguilla de la col, Psylliodes chrysocephala Viruela, sarna de la patata, Rhizoctonia solani	6,6 ml/kg	1	--	Colza de invierno y Colza de verano: Directo: Densidad máxima de siembra: 9 kg de semillas/ha Máx. 56,4 ml de producto/ha = 5,35 x 1E12 UFC/ha. Aplicar en BBCH 00.
	Phoma spp.				Calabacín : Directo: Densidad máxima de siembra: 2,5 kg/ha Máx. 16,5 ml de producto/ha = 1,49 x 1E12 UFC/ha Trasplantado: 2 ciclos de cultivo por año: 8 000 trasplantes / ha Mín. 5 000 semillas / kg de semillas Máx. 21,2 ml/ha (= 2 x 10,6 ml) = 1,91 x 1E12 UFC/ha Dosis: 6,6 ml/kg de semillas Calabaza: Directo: Densidad máxima de siembra: 5 kg/ha Máx. 33,0 ml de producto/ha = 2,97 x 1E12 UFC/ha Dosis: 6,6 ml/kg de semillas Melón: Directo: Densidad máxima de siembra: 2,5 kg/ha Máx. 16,5 ml de producto/ha = 1,49 x 1E12 UFC/ha Trasplantado: 8.000 trasplantes / ha Mín. 22.000 semillas / kg de semillas Máx. 2,4 ml de producto/ha = 2,16 x 1E11 UFC/ha Dosis: 6,6 ml/kg de semillas Pepinillo: Directo: Densidad máxima de siembra: 2,5 kg/ha Máx. 16,5 ml de producto/ha = 1,49 x 1E12 UFC/ha Trasplantado:30 000 trasplantes / ha Mín. 33.000 semillas/kg de semillas Máx. 6,0 ml de producto/ha = 5,4 x 1E11 UFC/ha Dosis: 6,6 ml/kg de semillas Pepino: Directo: Densidad máxima de siembra: 8 kg/ha Máx. 52,8 ml/ha = 4,75 x 1E12 UFC/ha Trasplantado - 3 ciclos de cultivo por año: 30 000 trasplantes / ha Mín. 33 000 semillas / kg de semillas Máx. 18,0 ml/ha (= 3 x 6,0 ml) = 1,62 x 1E12 UFC/ha Dosis: 6,6 ml/kg de semillas Sandía: Directo: Densidad máxima de siembra: 2,5 kg/ha Máx. 16,5 ml de producto/ha = 1,49 x 1E12 UFC/ha Trasplantado: 8.000 trasplantes / ha Mín. 22 000 semillas / kg de semillas Máx. 2,4 ml de producto/ha = 2,16 x 1E11 UFC/ha Dosis: 6,6 ml/kg de semillas. Aplicar en BBCH 00.
Simiente de cucurbitáceas	Viruela, sarna de la patata, Rhizoctonia solani	6,6 ml/kg	1	--	
	Phoma spp.				
Simiente de espinacas	Viruela, sarna de la patata, Rhizoctonia solani	6,6 ml/kg	1	--	Directo: Densidad máxima de siembra: 300 kg/ha Máx. 1980 ml de producto/ha = 1,78 x 1E14 UFC/ha. Aplicar en BBCH 00.

 <div>GOBIERNO DE ESPAÑA</div>	<div>MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN</div>	<div>ES-02061</div> <div>SUSTEED</div>	<div>SECRETARIA GENERAL DE RECURSOS AGRARIOS Y SEGURIDAD ALIMENTARIA</div>
	<div>Viruela, sarna de la patata, Rhizoctonia solani</div>	<div>HORTALIZAS DEL GÉNERO BRASSICA</div> <div>Berza, col y kale:</div> <div>Directo: Densidad máxima de siembra: 2,5 kg/ha</div> <div>Máx. 16,5 ml de producto/ha = 1,49 x 1E12 UFC/ha</div> <div>Trasplantado: 35 000 trasplantes / ha</div> <div>Mín. 180 000 semillas / kg de semillas</div> <div>Máx. 1,3 ml/ha = 1,17 x 1E11 UFC/ha</div> <div>Dosis: 6,6 ml/kg de semillas</div> <div>Brécol:</div> <div>Directo: Densidad máxima de siembra: 2,5 kg/ha</div> <div>Máx. 16,5 ml de producto/ha = 1,49 x 1E12 UFC/ha</div> <div>Trasplantado: 2 ciclos de cultivo por año: 45 000 trasplantes / ha</div> <div>Mín. 150 000 semillas / kg de semillas</div> <div>Máx. 4,0 ml/ha (= 2 x 2,0 ml) = 3,60 x 1E11 UFC/ha</div> <div>Dosis: 6,6 ml/kg de semillas</div> <div>Col de Bruselas</div> <div>Directo: Densidad máxima de siembra: 2,5 kg/ha</div> <div>Máx. 16,5 ml de producto/ha = 1,49 x 1E12 UFC/ha</div> <div>Trasplantado: 38 000 trasplantes / ha</div> <div>Mín. 155 000 semillas / kg de semillas</div> <div>Máx. 1,6 ml/ha = 1,44 x 1E11 UFC/ha</div> <div>Dosis: 6,6 ml/kg de semillas</div> <div>Col de China:</div> <div>Directo: Densidad máxima de siembra: 2,5 kg/ha</div> <div>Máx. 16,5 ml de producto/ha = 1,49 x 1E12 UFC/ha</div> <div>Trasplantado : 5 ciclos de cultivo por año: 65 000 trasplantes / ha</div> <div>Mín. 220 000 semillas / kg de semillas</div> <div>Máx. 10,0 ml/ha (= 5 x 2,0 ml) = 9,00 x 1E11 UFC/ha</div> <div>Dosis: 6,6 ml/kg de semillas</div> <div>Coliflor:</div> <div>Directo: Densidad máxima de siembra: 2,5 kg/ha</div> <div>Máx. 16,5 ml de producto/ha = 1,49 x 1E12 UFC/ha</div> <div>Trasplantado: 2 ciclos de cultivo por año: 26000 trasplantes / ha</div> <div>Mín. 180 000 semillas / kg de semillas</div> <div>Máx. 2,0 ml/ha (= 2 x 1,0 ml) = 1,80 x 1E11 UFC/ha</div> <div>Dosis: 6,6 ml/kg de semillas</div> <div>Repollo:</div> <div>Directo: Densidad máxima de siembra: 2,5 kg/ha</div> <div>Máx. 16,5 ml de producto/ha = 1,49 x 1E12 UFC/ha</div> <div>Trasplantado: 3 ciclos de cultivo por año: 50 000 trasplantes / ha</div> <div>Mín. 155 000 semillas / kg de semillas</div> <div>Máx. 6,3 ml/ha (= 3 x 2,1 ml) = 5,37 x 1E11 UFC/ha</div> <div>Dosis: 6,6 ml/kg de semillas</div> <div>TALLOS JÓVENES</div> <div>Hinojo:</div> <div>Directo: Densidad máxima de siembra: 3,5 kg/ha</div> <div>Máx. 23,1 ml/ha = 2,08 x 1E12</div> <div>Trasplantado: 90 000 trasplantes / ha</div> <div>Mín. 145 000 semillas/kg de semillas</div> <div>Máx. 4,1 ml/ha = 3,69 x 1E11 UFC/ha</div> <div>Dosis: 6,6 ml/kg de semillas</div> <div>Puerro:</div> <div>Directo: Densidad máxima de siembra: 8,3 kg/ha</div> <div>Máx. 54,8 ml/ha = 4,93 x 1E12 UFC/ha</div> <div>Dosis: 6,6 ml/kg de semillas</div> <div>OTRAS SOLANÁCEAS</div> <div>Directo: Densidad máxima de siembra: 0,3 kg/ha</div> <div>Máx. 1,98 ml de producto/ha = 1,78 x 1E11 UFC/ha</div> <div>Trasplantado: 25 000 trasplantes / ha</div> <div>Berenjena:</div> <div>Mín. 110 000 semillas / kg de semillas</div> <div>Máx. 1,5 ml de producto/ha = 1,35 x 1E11 UFC/ha</div> <div>Dosis: 6,6 ml/kg de semillas</div> <div>Pimiento:</div> <div>Mín. 100 000 semillas / kg de semillas</div> <div>Máx. 1,65 ml de producto/ha = 1,49 x 1E11 UFC/ha</div> <div>Dosis: 6,6 ml/kg de semillas.</div> <div>Aplicar en BBCH 00.</div>	<div>DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD DE LA PRODUCCIÓN AGROALIMENTARIA Y BIENESTAR ANIMAL</div>

Pie negro, necrosis del
cuello de las crucíferas,
Plenodomus lingam

HORTALIZAS DEL GÉNERO BRASSICA
Berza, col y kale:
Directo: Densidad máxima de siembra: 2,5 kg/ha
Máx. 16,5 ml de producto/ha = 1,49 x 1E12 UFC/ha
Trasplantado: 35 000 trasplantes / ha
Mín. 180 000 semillas / kg de semillas
Máx. 1,3 ml/ha = 1,17 x 1E11 UFC/ha
Dosis: 6,6 ml/kg de semillas
Brécol:
Directo: Densidad máxima de siembra: 2,5 kg/ha
Máx. 16,5 ml de producto/ha = 1,49 x 1E12 UFC/ha
Trasplantado: 2 ciclos de cultivo por año: 45 000 trasplantes / ha
Mín. 150 000 semillas / kg de semillas
Máx. 4,0 ml/ha (= 2 x 2,0 ml) = 3,60 x 1E11 UFC/ha
Dosis: 6,6 ml/kg de semillas
Col de Bruselas
Directo: Densidad máxima de siembra: 2,5 kg/ha
Máx. 16,5 ml de producto/ha = 1,49 x 1E12 UFC/ha
Trasplantado: 38 000 trasplantes / ha
Mín. 155 000 semillas / kg de semillas
Máx. 1,6 ml/ha = 1,44 x 1E11 UFC/ha
Dosis: 6,6 ml/kg de semillas
Col de China:
Directo: Densidad máxima de siembra: 2,5 kg/ha
Máx. 16,5 ml de producto/ha = 1,49 x 1E12 UFC/ha
Trasplantado : 5 ciclos de cultivo por año: 65 000 trasplantes / ha
Mín. 220 000 semillas / kg de semillas
Máx. 10,0 ml/ha (= 5 x 2,0 ml) = 9,00 x 1E11 UFC/ha
Dosis: 6,6 ml/kg de semillas
Coliflor:
Directo: Densidad máxima de siembra: 2,5 kg/ha
Máx. 16,5 ml de producto/ha = 1,49 x 1E12 UFC/ha
Trasplantado: 2 ciclos de cultivo por año: 26000 trasplantes / ha
Mín. 180 000 semillas / kg de semillas
Máx. 2,0 ml/ha (= 2 x 1,0 ml) = 1,80 x 1E11 UFC/ha
Dosis: 6,6 ml/kg de semillas
Repollo:
Directo: Densidad máxima de siembra: 2,5 kg/ha
Máx. 16,5 ml de producto/ha = 1,49 x 1E12 UFC/ha
Trasplantado: 3 ciclos de cultivo por año: 50 000 trasplantes / ha
Mín. 155 000 semillas / kg de semillas
Máx. 6,3 ml/ha (= 3 x 2,1 ml) = 5,37 x 1E11 UFC/ha
Dosis: 6,6 ml/kg de semillas
OTRAS SOLANÁCEAS
Directo: Densidad máxima de siembra: 0,3 kg/ha
Máx. 1,98 ml de producto/ha = 1,78 x 1E11 UFC/ha
Trasplantado: 25 000 trasplantes / ha
Berenjena:
Mín. 110 000 semillas / kg de semillas
Máx. 1,5 ml de producto/ha = 1,35 x 1E11 UFC/ha
Dosis: 6,6 ml/kg de semillas
Pimiento:
Mín. 100 000 semillas / kg de semillas
Máx. 1,65 ml de producto/ha = 1,49 x 1E11 UFC/ha
Dosis: 6,6 ml/kg de semillas.
Aplicar en BBCH 00.

						<div>HORTALIZAS DEL GÉNERO BRASSICA Berza, col y kale: Directo: Densidad máxima de siembra: 2,5 kg/ha Máx. 16,5 ml de producto/ha = 1,49 x 1E12 UFC/ha Trasplantado: 35 000 trasplantes / ha Mín. 180 000 semillas / kg de semillas Máx. 1,3 ml/ha = 1,17 x 1E11 UFC/ha Dosis: 6,6 ml/kg de semillas Brécol: Directo: Densidad máxima de siembra: 2,5 kg/ha Máx. 16,5 ml de producto/ha = 1,49 x 1E12 UFC/ha Trasplantado: 2 ciclos de cultivo por año: 45 000 trasplantes / ha Mín. 150 000 semillas / kg de semillas Máx. 4,0 ml/ha (= 2 x 2,0 ml) = 3,60 x 1E11 UFC/ha Dosis: 6,6 ml/kg de semillas Col de Bruselas Directo: Densidad máxima de siembra: 2,5 kg/ha Máx. 16,5 ml de producto/ha = 1,49 x 1E12 UFC/ha Trasplantado: 38 000 trasplantes / ha Mín. 155 000 semillas / kg de semillas Máx. 1,6 ml/ha = 1,44 x 1E11 UFC/ha Dosis: 6,6 ml/kg de semillas Col de China: Directo: Densidad máxima de siembra: 2,5 kg/ha Máx. 16,5 ml de producto/ha = 1,49 x 1E12 UFC/ha Trasplantado : 5 ciclos de cultivo por año: 65 000 trasplantes / ha Mín. 220 000 semillas / kg de semillas Máx. 10,0 ml/ha (= 5 x 2,0 ml) = 9,00 x 1E11 UFC/ha Dosis: 6,6 ml/kg de semillas Coliflor: Directo: Densidad máxima de siembra: 2,5 kg/ha Máx. 16,5 ml de producto/ha = 1,49 x 1E12 UFC/ha Trasplantado: 2 ciclos de cultivo por año: 26000 trasplantes / ha Mín. 180 000 semillas / kg de semillas Máx. 2,0 ml/ha (= 2 x 1,0 ml) = 1,80 x 1E11 UFC/ha Dosis: 6,6 ml/kg de semillas Repollo: Directo: Densidad máxima de siembra: 2,5 kg/ha Máx. 16,5 ml de producto/ha = 1,49 x 1E12 UFC/ha Trasplantado: 3 ciclos de cultivo por año: 50 000 trasplantes / ha Mín. 155 000 semillas / kg de semillas Máx. 6,3 ml/ha (= 3 x 2,1 ml) = 5,37 x 1E11 UFC/ha Dosis: 6,6 ml/kg de semillas. Aplicar en BBCH 00.</div>
Simiente de hortícolas	Phoma spp.	6,6 ml/kg	1	--		<div>TALLOS JÓVENES Hinojo: Directo: Densidad máxima de siembra: 3,5 kg/ha Máx. 23,1 ml/ha = 2,08 x 1E12 Trasplantado: 90 000 trasplantes / ha Mín. 145 000 semillas/kg de semillas Máx. 4,1 ml/ha = 3,69 x 1E11 UFC/ha Dosis: 6,6 ml/kg de semillas Puerro: Directo: Densidad máxima de siembra: 8,3 kg/ha Máx. 54,8 ml/ha = 4,93 x 1E12 UFC/ha Dosis: 6,6 ml/kg de semillas. Aplicar en BBCH 00.</div>
Simiente de lechugas	Phoma spp. Viruela, sarna de la patata, Rhizoctonia solani	6,6 ml/kg	1	--		<div>Directo: Densidad máxima de siembra: 3 kg/ha Máx. 19,8 ml de producto/ha = 1,78 x 1E12 UFC/ha Trasplantado - 5 ciclos de cultivo por año (G): 100 000 trasplantes / ha Mín. 700 000 semillas / kg de semillas Máx. 4,5 ml/ha (= 5 x 0,9 ml) = 4,05 x 1E11 UFC/ha Dosis: 6,6 ml/kg de semillas. Aplicar en BBCH 00.</div>
	Phoma spp.					

Simiente de legumbres	Viruela, sarna de la patata, Rhizoctonia solani	6,6 ml/kg	1	--	Legumbres secas (lentejas, garbanzos, judías, altramuз) y Legumbres frescas (judías verdes, judía forrajera, haba verde, guisantes verdes): Directo: Densidad máxima de siembra: 350 kg/ha Máx. 2310 ml de producto/ha = 2,08 x 1E14 UFC/ha Dosis: 6,6 ml/kg de semillas. Aplicar en BBCH 00.
	Phoma spp.				
Simiente de remolacha azucarera	Viruela, sarna de la patata, Rhizoctonia solani	6,6 ml/kg	1	--	Directo: Densidad máxima de siembra: 4 kg/ha Máx. 26,4 ml de producto/ha = 2,38 x 1E12 UFC/ha Dosis: 6,6 ml/kg de semillas. Aplicar en BBCH 00.
	Phoma spp.				
Simiente de soja	Viruela, sarna de la patata, Rhizoctonia solani	6,6 ml/kg	1	--	Directo: Densidad máxima de siembra: 350 kg/ha Máx. 2310 ml de producto/ha = 2,08 x 1E14 UFC/ha Dosis: 6,6 ml/kg de semillas. Aplicar en BBCH 00.
	Viruela, sarna de la patata, Rhizoctonia solani				Se incluye tomate de cáscara o alquequenjes Directo: Densidad máxima de siembra: 0,3 kg/ha Máx. 1,98 ml de producto/ha = 1,78 x 1E11 UFC/ha Trasplantado: 25.000 trasplantes / ha Mín. 275.000 semillas / kg de semillas Máx. 0,6 ml de producto/ha = 5,4 x 1E10 UFC/ha Dosis: 6,6 ml/kg de semillas. Aplicar en BBCH 00.
Simiente de tomates	Phoma spp.	6,6 ml/kg	1	--	Se incluye tomate de cáscara o alquequenjes Directo: Densidad máxima de siembra: 0,3 kg/ha Máx. 1,98 ml de producto/ha = 1,78 x 1E11 UFC/ha Trasplantado: 25.000 trasplantes / ha Mín. 275.000 semillas / kg de semillas Máx. 0,6 ml de producto/ha = 5,4 x 1E10 UFC/ha. Aplicar en BBCH 00.
	Pulguilla de la col, Psylliodes chrysocephala				Exclusivamente simiente de rábano: Directo: Densidad máxima de siembra: 30 kg/ha Máx. 198 ml de producto/ha = 1,78 x 1E13 UFC/ha. Aplicar en BBCH 00.
	Phoma spp.				
Simiente de zanahoria	Viruela, sarna de la patata, Rhizoctonia solani	6,6 ml/kg	1	--	Incluye simiente de zanahoria, rábano y chirivías. Rábano: Directo: Densidad máxima de siembra: 30 kg/ha Máx. 198 ml de producto/ha = 1,78 x 1E13 UFC/ha Zanahoria y chirivías: Directo: Densidad máxima de siembra: 28,6 kg/ha Máx. 188,8 ml/ha = 1,70 x 1013 UFC/ha. Aplicar en BBCH 00.

Plazos de Seguridad (Protección del Consumidor)	
USO	P.S. (días)
Semillas de mostaza, Simiente de cebolla, Simiente de colza, Simiente de cucurbitáceas, Simiente de espinacas, Simiente de hortalıcolas, Simiente de lechugas, Simiente de legumbres, Simiente de remolacha azucarera, Simiente de soja, Simiente de tomates, Simiente de zanahoria	NO PROCEDE

Condiciones Generales de Uso

Producto fungicida/bactericida para el tratamiento directo de semillas.

- El tratamiento se realiza en interior (sala de tratamiento) por aplicación directa a la semilla.

- La posterior siembra se realiza en invernadero (permanente y no permanente) y aire libre, salvo las semillas tratadas contra Rhizoctonia solani cuya siembra se realizará solo en invernadero (permanente y no permanente).

En la etiqueta se darán las indicaciones oportunas para la correcta aplicación del producto.

Clase de Usuario
Uso profesional.



Mitigación de riesgos en la manipulación
<p>SEGURIDAD DEL APLICADOR</p> <p>El aplicador utilizará durante la mezcla/carga y aplicación:</p> <ul style="list-style-type: none">- Protección ocular y/o facial durante la mezcla y carga del producto: gafa de protección o pantalla facial.- Guantes de protección química y frente a microorganismos.- Ropa de protección, al menos de tipo 6B, que protege frente a salpicaduras líquidas de productos químicos y frente a agentes biológicos.- Durante la mezcla y carga se deberá emplear ropa de protección parcial tipo delantal de nivel C3 o equivalente.- Protección respiratoria: mascarilla autofiltrante para partículas, al menos de tipo FFP2 o bien, mascarilla con filtro al menos de tipo P2.- Calzado de uso profesional de material polimérico. <p>SEGURIDAD DEL TRABAJADOR</p> <p>El trabajador utilizará durante la siembra:</p> <ul style="list-style-type: none">- Guantes de protección química y frente a microorganismos.- Ropa de protección nivel C1 o ropa de trabajo.- Calzado cerrado. <p>NORMATIVA APLICABLE</p> <ul style="list-style-type: none">- Guantes de protección contra productos químicos conforme a la norma UNE-EN ISO 374-1:2016 y su modificación UNE-EN ISO 374-1:2016/A1:2018. Los guantes pueden ser reutilizables o desechables y deben tener la resistencia mecánica que requiera la actividad a realizar. En caso de rotura, deberán ser reemplazados inmediatamente.- Ropa de protección tipo 6B: contra salpicaduras de productos líquidos, conforme a norma UNE EN 13034:2005+A1:2009 y norma UNE-EN 14126:2004/AC:2006.- Calzado de uso profesional, al menos botas tobilleras, de caucho u otro material polimérico (clasificación II).- Ropa de trabajo adecuada: Mono o chaqueta de manga larga y pantalón largo hechos de algodón (> 300 g/m2) o de algodón y poliéster (> 200 g/m2).- Protección respiratoria: Mascarillas autofiltrantes contra partículas FFP2 conforme norma UNE-EN 149:2001+A1:2010, o media máscara (norma UNE-EN 140/AC:2000) provista con filtro contra partículas P2 (UNE-EN 143:2022).-Gafa de protección o pantalla facial según norma UNE-EN 166:2002 o UNE-EN ISO 16321-1:2022 durante mezcla/carga. En el caso de poder seleccionar entre gafas de montura integral o pantalla facial, se priorizará el uso de pantalla facial- Ropa de protección C1, tanto de protección completa como parcial, frente a productos fitosanitarios según norma UNE-EN ISO 27065: 2017 y su modificación UNE-EN ISO 27065: 2017/A1:2019.- Ropa de protección parcial de nivel C3 según la norma UNE-EN ISO 27065: 2017 y su modificación UNE-EN ISO 27065: 2017/A1:2019 <p>Medidas adicionales de mitigación del riesgo:</p> <ul style="list-style-type: none">- En la limpieza y mantenimiento del equipo se aplicarán las mismas medidas de protección que en mezcla y carga.



Clasificaciones y Etiquetado	
Clase y categoría de peligro (Humana)	
Pictograma	
Palabra de Advertencia	
Indicaciones de Peligro	
Consejos de Prudencia	P302+P352 -EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua y jabón. P304+P340 -EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. P262 -Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. P261 -Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
Clase y categoría de peligro (Medio Ambiental)	
Pictograma	
Palabra de Advertencia	
Indicaciones de Peligro	
Consejos de Prudencia	



Mitigación de riesgos ambientales

SPe 3: Para proteger los organismos acuáticos, respétese sin sembrar una banda de seguridad de 5m hasta las masas de agua superficial (en el caso de semilla tratada).

Cualquier actividad que se realice con el presente preparado deberá tener en cuenta las condiciones establecidas en los artículos 31, 32 y 33 del Real Decreto 1311/2012, por el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios.



Eliminación del producto y/o caldo

SP1: NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE. (No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales/Evítese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos).



Gestión de Envases

Conforme a lo establecido en el Real Decreto 1055/2022, de 27 de diciembre, de envases y residuos de envases, en la etiqueta deberá figurar la siguiente frase: Deposite los residuos de envases en los puntos de recogida establecidos por los sistemas de responsabilidad ampliada del productor.



Otras Indicaciones reglamentarias

OBSERVACIONES (esta información no tiene que figurar en la etiqueta)

En cumplimiento del artículo 45 del Reglamento (CE) nº 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2008 sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas (CLP), los usuarios intermedios o importadores de mezclas clasificadas para la salud humana o por sus peligros físicos, deberán enviar la información pertinente para la formulación de medidas preventivas y curativas, en particular para la respuesta sanitaria en caso de urgencia al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (Organismo designado a tal efecto según la Ley 8/2010 de 31 de marzo).

La Orden JUS/288/2021, de 25 de marzo, regula el procedimiento de comunicación de dicha información al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.

Para incluir el teléfono del Servicio de Información Toxicológica en la etiqueta, instrucciones de primeros auxilios, así como en el apartado 1.4 de la Ficha de Datos de Seguridad es obligatorio haber realizado previamente el alta de la ficha toxicológica según el procedimiento mencionado.

Lo que se informa a los efectos dispuestos en el Real Decreto y los Reglamentos antes citados

INDICACIONES QUE DEBEN FIGURAR EN LA ETIQUETA

Contiene un microorganismo como sustancia activa. Puede tener potencial de producir reacciones de sensibilización cutánea y/o respiratoria.
EUH210: Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.
EUH401: A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso.

CLASIFICACIÓN DE LA SEMILLA TRATADA

CLASE Y CATEGORÍA DE PELIGRO: --

ELEMENTOS A INCLUIR EN LA ETIQUETA:

1. NOMBRE DEL PRODUCTO FITOSANITARIO CON EL QUE SE HAN TRATADO LAS SEMILLAS: SUSTEED
2. NOMBRE DE LA SUSTANCIA/S CONTENIDA/S EN DICHO PRODUCTO: Bacillus amyloliquefaciens (Cepa QST 713)
3. CONSEJOS DE PRUDENCIA: EUH 401: A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso.
4. OBSERVACIONES: Añadir al etiquetado las medidas de mitigación de riesgos para el uso de semilla tratada establecidas en la autorización del producto, si procede.